














## Результат тестирования

Процент верных ответов	95
Время, фактически затраченное на тест	16:23
Оценка за тестирование	5

[К списку вопросов](#)

### Список вопросов

(условные обозначения:  - верный ответ на вопрос,  - неверный ответ на вопрос,  - ответ на вопрос не получен)

Номер	Ответ	Вопрос
1		СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ
2		ВЫПОЛНЯЯ РАЗРЕЗ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССА КРЫЛОНЕБНОЙ ЯМКИ, МОЖНО ПОВРЕДИТЬ
3		ОДНИМ ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПРЕТ НА
4		НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
5		ДЕФОРМИРУЮЩЕЙ ОСТЕОДИСТРОФИЕЙ НАЗЫВАЮТ
6		К МОНОМОРФНЫМ АДЕНОМАМ НЕ ОТНОСИТСЯ
7		НЕРВЫ И СОСУДЫ ГЛУБОКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ВГЛУБЬ ИДУТ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ
8		В АНАЛИЗЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ КАЗАБАХА-МЕРРИТА ВЫЯВЛЯЕТСЯ
9		ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕАНГИОЭНДОТЕЛИОМЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ В СОСТАВЕ СИНДРОМА КАЗАБАХА-МЕРРИТТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
10		ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
11		АНТАГОНИСТОМ ЛИНКОМИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ
12		ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПОДВИЖНЫЕ ИНТАКТНЫЕ ЗУБЫ В ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ
13		УТРАТА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ СТИМУЛИРУЕТ