

31. Пунктировать вену, пока не появится ощущение пустоты;
 32. Вставить ВКТ в держатель до упора, проколов эластичную мембрану в центре крышки;
 33. Снять или ослабить жгут;
 34. Извлечь ВКТ из держателя, упираясь большим пальцем в его ободок, после прекращения поступления крови;
 35. Повернуть ВКТ на 180 градусов, исключая встряхивание: ВКТ с голубой крышкой повернуть 4-5 раз, другие ВКТ 5-10 раз;
 36. Поместить ВКТ в контейнер для транспортировки биологического материала;
 37. При необходимости набрать кровь в несколько ВКТ, соблюдая порядок по цветовой гамме: 1-красная, 2-голубая, 3-зеленая, 4-сиренивая;
 38. Приложить к месту венепункции антисептическую салфетку;
 39. Извлечь иглу вместе с держателем из вены;
 40. Попросить пациента держать салфетку 2-3 минуты;
 41. Сбросить иглу вместе с держателем в непрекалываемый контейнер для отходов класса «Б»;
 42. Погрузить использованный лоток и жгут в ёмкость с дезинфицирующим средством «для дезинфекции ИМН»;
 43. Выдержать экспозицию согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства;
 44. Протереть купешку (стул) ветошью с дезинфицирующим средством 2-х кратно с интервалом согласно инструкции к используемому средству;
 45. Утилизировать ветошь в отходы класса «Б»;
 46. Снять перчатки безопасным образом;
 47. Провести гигиеническую обработку рук;
 48. Сделать запись о проведенной процедуре.

18. Oct. 2 H.

59

Место печати МО

Подпись общего руководителя

Подпись непосредственного руководителя

Подпись студента Д.Н.