


Незрелая шейка (0-5 баллов по шкале Бишоп)




Недостаточно зрелая шейка (6-7 баллов по шкале Бишоп)



Недостаточно зрелая шейка (6-7 баллов по шкале Бишоп)





(1) (b) (2) (B) (Q) (---

Зрелая шейка матки 8 и более баллов по шкале Бишоп

Комбинация методов Незрелая шейка матки (1-5 баллов по шкале Бишоп) Мифепристон в 9 ч Удаление расширителя в 7 ч утра + расширитель в 19 ч утра МИФЕПРИСТОН 24 ч + РАСШИРИТЕЛЬ 12 ч Родовая Эффект недостаточный, шейка матки недостаточно деятельность зрелая. Повторная оценка клинической ситуации 3релая шейка ДИНОПРОСТОН 6 ч матки Алгоритм Эффект недостаточный, шейка матки недостаточно «Зрелая шейка зрелая. Повторная оценка клинической ситуации матки» Родовая Кесарево сечение деятельность

Список литературы

- 1. «Акушерство» Савельева Г. М., Шалина Р. И., Сичинава Л. Г., Панина О. Б., Курцер М. А.
- 2. «Акушерство» В.Е. Радзинский, А.М. Фукс, 2-е издание, 2021 год.
- 3. Клинические рекомендации «Неудачная попытка стимуляции родов (подготовка шейка матки к родам и родовозбуждение» 2021 г.
- 4. «Опыт индукции родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения Текст научной статьи по специальности» Вученович Юлия Дмитриевна 2019 г.