

**Рецепты на лекарственные средства, используемые в отделении**

<p>1. Rp.: Ceftriaxonu 1,0 D.t.d.N. 10 in flac. S. Две в/м вверемь растворить в 1% релифокаина, 2 раза в день</p>	<p>2. Rp.: Tab Furosemidi 0,04 D.t.d.N. 50 S. По 1/2 таб утром натощак.</p>
<p>3. Rp.: Tab Asparcamu 0,5 D.t.d.N. 10 S. По 1/2 таб 3 раза в день</p>	<p>4. Rp.: Susp. Ibu profeni 2,0-100ml D.S. По 10мл 3 раза в сутки</p>
<p>5. Rp.: Sol. Dexoni 2,0 D.t.d.N. 10 in amp S. 1 раз в день в/м</p>	<p>6. Rp.: Sol. Lasix 2,0 D.t.d.N. 5 in amp S. Две в/м вверемь по 2,0.</p>
<p>7. Rp.: Tab. Umifenoviri D.t.d.N. 10 S. По 1 таблетке 2 раза в день</p>	<p>8. Rp.: Fluconazoli 0,05 D.t.d.N. 4 in caps. S. Внутрь, по 1 капсуле 1 раз в день, независимо от приема еды</p>
<p>9. Rp.: Tab. Domperidoni 0,01 D.t.d.N. 30 S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день, за 15-30 мин до еды</p>	<p>10. Rp.: Tab. Asparcamu 1,0 D.t.d.N. 10 S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды</p>
<p>11. Rp.: Tab. Acetazolamidi 250mg D.t.d.N. 10 S. Внутрь по 1 таблетке утром, независимо от приема пищи</p>	<p>12. Rp.: Sol. Prednisoloni 0,5% - 1ml. D.t.d.N. 30 S. Вводить с 0,9% р-ра хлорида натрия внутри- венно струйно</p>