


Диагностика

А) Мышцы, ассоциированные с каналом, который должен быть активен, не имеют функциональной слабости

В) В индикаторных мышцах не появляется функциональная слабость при терапевтической локализации точки тревоги активного меридиана

Лечение - восстановление активности меридиана, который должен быть активным во время исследования

1. Одновременное раздражение сигнальной точки спаренного меридиана и точки GV 20 постукиванием 2 раза в сек (30-60 раз) до восстановления функциональной слабости мышц ассоциированных с меридианом, который в норме должен быть активным в данное время



Проверка

Через 5 мин повторное тестирование ассоциированных мышц. Если в них вновь исчезли признаки функциональной слабости - причина в патологической активности одного из меридианов

Функциональные нарушения в меридианной системе

Избыточная активность одного и недостаточная активность спаренного меридиана, несоответствующая времени его активности


причины:

меридианные - сдвиг активности всех меридианов по часовому поясу, **эмоциональные** - наличие стрессовой ситуации имеющей определенную эмоциональную окраску в прошлом или настоящем, неадекватно воспринимаемой пациентом.

структурные - дисбаланс внутреннего органа, функциональные блоки суставов, его поддерживающие, особенно на шейном отделе позвоночника, спазм диафрагмы

химические - нарушение обмена аминокислот, жиров, углеводов, поддерживающие патологическую активность меридианов, имеющих точки своего начала или конца на лице, интоксикация, поддерживающая дисфункцию внутреннего органа

нарушение функции нервной системы - патологическая активность примитивных рефлексов у взрослого, повышенная активность симпатической или парасимпатической нервной системы



МО-ПУНКТЫ