

Мышца	Субъективная	Физикация	Орган	Меридиан	Время активности	Нейрологический суб	Нейрососудистое обеспечение	Нейролимфатическое обеспечение	Точка тревоги	Питание	Особенности
Диафрагма 3.33	-	-	-	-	-	-	Три точки: у бровей, лямбды, и примерно на 1.2 см. выше и впереди по отношению к лямбде	По всей длине грудины	-	-	-
Мышца противопоставляющая мизинец	-	-	-	желудка	7-9.00	-	Билатерально над лобной возвышенностью	Передний илр: на симфизе у его нижнего края Задний илр: между остистым отростком L5 и задним гребнем подвздошной кости	-	-	Слабость этой мышцы связана с синдромом горховидно-крючководной костей. Коррекция сублюксации в запястье обычно усиливает эту мышцу.
Малая грудная мышца	-	-	-	-	-	-	-	Передний илр: расположен выше мечевидного отростка	-	цинк	Когда найдена слабость проверить на дисбаланс правый и левый лимфатические протоки
Малоберцовая длинная и короткая мышцы	-	-	Мочевой пузырь	Мочевой пузырь	17-19.00	-	Бугры лобной кости	Передний илр: расположен у нижней рамы симфиза, чуть латеральное его Задний илр: расположен между L5 и задним гребнем подвздошной кости	Расположен вдоль горизонтальной линии прямо над бровями	Тиамин, кальций	-
Передняя большеберцовая мышца	-	-	Мочевой пузырь	Мочевой пузырь	17-19.00	-	На лобной возвышенности	Передний илр: на 0.6 см. над симфизом Задний илр: над пластиной L2	Вдоль горизонтальной линии прямо над бровями	Тиамин, калий, Vita	-