

7. СХЕМА АССОЦИИРОВАННЫХ СВЯЗЕЙ МЫШЦ

Мышца	Субъективная	Функция	Орган	Меридиан	Время активности	Психологический зуб	Нейросоматическое обеспечение	Шейролимфатическое обеспечение	Точка тревоги	Питание	Особенности
Поллопаточная мышца 3,55	T-2	груди	сердце	сердце	11-13.00	2 сверху	Брегма	Передний илр: 2-е межреберное пространство около грудины Задний илр: T-4, T-3 между поперечными отростками.	В области верхней челюсти от нижнего края глазницы к носовому отверстию с обеих сторон	Концентрат сердца или экстракт нуклеопротенина, Vit E, комплекс B, C	
Клювовидная мышца	-	-	легкие	легких	3-5.00	-	Брегма	Передний илр: 2-4 межреберное пространство около грудины Задний илр: между T3,4 около ластин	От скулолобного шва в сторону теменной кости	Концентрат легких или экстракт нуклеопротенина, Vit C, A	
Перелая зубчатая мышца	-	-	легкие	легких	3-5.00	2 сверху	Брегма	Передний илр: в 3, 4, 5 межреберьях ближе к грудины Задний илр: между поперечными отростками T3-4, T4-5, T5-6	Прямо кзади от уха на вертикальной линии пересекающей сквамозный шов	Vit C, A, экстракты легких	
Дельтовидная мышца 1,59	T-3	CS-7 Th1	легкие	легких	3-5.00	3 сверху	Брегма	Передний илр: 3-е межреберное пространство около грудины Задний илр: между T3-4, около лопатки	Область надбровья с обеих сторон	Vit C, экстракт легких, РНК (ЭНКАД, РНК, деринат)	При слабости средней порции дельтовидной мышцы и триггерных точек в верхней порции трапециевидной мышцы, проверить тракции акромиоклавикулярный сустав