


Удобинской
11.09.16

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ХОЛИЦИСТОГРАФИИ.

Проведение холецистографии требует определенной подготовки со стороны пациента.

- Во-первых, необходимо соблюдать диету за 2-3 дня до исследования: отказаться от жирной, острой, копченой пищи, алкоголя.
- Также рекомендуется не есть ничего за 8-10 часов до исследования. Перед исследованием следует принять лекарства, которые назначит врач.
- Важно сообщить врачу обо всех сопутствующих заболеваниях, аллергии на лекарства, а также о беременности или предполагаемой беременности.



ХОЛЕЦИСТОГРАФИЯ – ЭТО

Холецистография — это рентгенологическое исследование, которое проводят в специализированной клинике или в отделе рентгена больницы. Перед исследованием пациент получает внутривенное введение контрастного вещества, после чего начинаются съемки фотографий. Во время исследования пациент лежит на спине, на столе рентгеновского аппарата. Чтобы улучшить качество изображения, на живот накладываются компрессионные листы.

После исследования необходимо подождать некоторое время, чтобы контрастное вещество вышло из организма. Пациент может почувствовать легкую головкружение или неудобство в животе, однако это проходит быстро и без последствий.

КАК ПРОХОДИТ ИССЛЕДОВАНИЕ

Холецистография проходит в специализированном кабинете, где установлено оборудование для проведения данного метода диагностики. Перед началом исследования пациенту вводят контрастное вещество через вену. Затем, пациент должен лечь на спину на рентгеновский стол. Врач поместит на живот пациента датчик, который передаст данные об уровне желчи на компьютер. После этого, пациенту для стимуляции выведения желчи могут ввести внутрь мочевого пузыря специальный препарат через катетер.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Первоначальным противопоказанием для проведения холецистографии является беременность. Этот метод имеет радиоактивную составляющую, которая может негативно повлиять на развитие плода. Поэтому женщинам в период беременности не рекомендуется проходить это исследование.

Также холецистография может быть опасна для пациентов, имеющих аллергическую реакцию на рентген-контрастное вещество, которое используется при проведении исследования.

Кроме того, холецистография может быть противопоказана при явных симптомах и осложнениях холецистита, т.е. воспалительного заболевания желчного пузыря.

Если у пациента имеются другие заболевания, возможно, требующие более деликатного исследования, то врач может рекомендовать другой метод диагностики.

