

*классификация врожденных и
приобретенных деформаций носа*



Нормальная переносица



Низкая переносица



ВИДЫ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ НОСА В МЕДИЦИНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

1. ДИСМОРФОГЕНЕЗ

Состояние, при котором костный и хрящевой скелет носа видоизменены.

2. ПЕРСИСТЕНЦИЯ

Патологические состояния, при которых у новорожденного присутствуют «ненужные» компоненты наружного носа.

3. ДИСТОПИЯ

При данных дефектах наружный нос имеет разнообразные новообразования, которые могут располагаться в различных местах.

ДИСМОРФОГЕНЕЗ

Бывает нескольких видов:

- **Гипогенезия.** Характеризуется недоразвитостью, укороченностью внешних структур носа: спинки, основания, крыльев. Деформации могут затрагивать все либо одну структуру, быть одно- либо двусторонними. В редких случаях может иметь место полное отсутствие вышеуказанных составляющих носа. Подобное состояние в некоторых источниках именуют *агенезией*.
- **Гипергенезия.** Хрящевые либо костные ткани здесь имеют весьма большие размеры. В эту группу деформаций включен широкий, слишком длинный нос, а также обширный кончик носа.
- **Дисгенезия.** Пороки развития сосредотачиваются во фронтальной плоскости. Кривизна носа может иметь различную форму (косоносость, S-образная деформация, боковые хоботки, горбинка на носу и т.д.).

ПЕРСИСТЕНЦИЯ

Эту группу аномалий делят на два вида:

- ***Пороки наружной части носа:*** солитарные новообразования у основания носа, которые содержат жировые железы и волосы; расщелины носа боковые/срединные; раздвоенный кончик носа.
- ***Внутриносовые аномалии:*** разделение — либо полное отделение — носовых раковин друг от друга; атрезия носовых ходов.

ДИСТОПИЯ

К примеру, перегородка носа может быть укомплектована придатком, что будет негативно влиять на носовое дыхание и на функцию обоняния.

Еще один пример –наличие на носовой раковине пузырька с железистым секретом внутри. В будущем, в таких пузырьках может накапливаться гнойный инфильтрат, что приведет к воспалению слизистой оболочки носа.




Рис. 216. Наиболее часто встречающиеся виды врожденных деформаций носа.

Деформация носа:

1. Седловидный нос.

2. Горбатый нос.

3. Широкий нос.

3. Искривление носа.

Дефекты носа:

1. Частичные — основные части носа сохранены и отсутствуют только небольшие его части (крыло, кончик, перегородка).

2. Неполные — некоторые части носа сохранены.

3. Полные — отсутствуют все части носа.

1. Седловидный нос

Имеется западение спинки носа в результате потери и вдавления кост-но-хрящевого остова носа.

2. Горбатый нос

Горб носа образуется в верхнем его отделе за счет появления угла между носовыми костями и четырехугольным хрящом. Приобретенный горб может возникнуть после травмы вследствие неправильного сращения отломков носовых костей.

3. Широкий нос.

Чаще приходится иметь дело с расширением кончика носа. Иногда бывает даже раздвоенный кончик носа. Эта деформация объясняется тем, что между медиальными, ножками крыльных хрящей, которые в норме почти прилегают одна к другой, имеется более выраженное пространство, заполненное соединительной тканью.

4. Искривление носа. Кончик носа и спинка носа смещены в бок по отношению к средней линии лица. У больного имеется отсутствие части носа или всех частей носа.



Норма



С-образная
деформация



С-образная
деформация

