

Группы риска по заболеванию:

1. Дети до 7 лет. Полиомиелит у детей возникает гораздо чаще, чем у взрослых;
 2. Беременные женщины;
 3. Люди с очень ослабленным иммунитетом. Этому могут способствовать разные болезни, а также нарушения на эндокринном уровне, периоды после операций и т.д.;
 4. Люди, страдающие иммунодефицитами.
- Риски заразиться выше в теплый период года: летом либо осенью. Вирус очень живуч, во влажной среде он может жить до 4 месяцев.



Профилактика полиомиелита

1. Главной профилактической мерой является вакцинация детей,

которая проводится в раннем возрасте, а затем повторно.

Российский национальный календарь прививок предусматривает вакцинацию от полиомиелита:

на первом году жизни — трёхкратно (в 3, 4,5, 6 месяцев)

на втором году жизни — двукратно (в 18 и 20 месяцев)

в возрасте 14 лет — однократно.

2. Отказ от купания в грязных, не приспособленных для этого водоемах.

3. Соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук после туалета и




улицы, перед и после приёмом пищи) отказ от потенциально опасных

продуктов. Нежелательным в этом смысле является сырое молоко — в нем нередко встречается возбудитель. Обязательное мытьё фруктов и овощей.

4. Карантинные меры в случае, если в детском коллективе обнаружен ребенок с заболеванием. При этом все предметы и вещи обрабатываются, дезинфицируются.

Профилактика полиомиелита



Подготовил: Ковров В.В.


студент 212гр

Проверила: преподаватель

Лопатина Т.Н.

Красноярск
2022


Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами полиомиелита 1,2 и 3 типов. Характеризуется поражением нервной системы (преимущественно серого вещества спинного мозга), что приводит к параличам, а также воспалительными изменениями слизистой оболочки кишечника и носоглотки, протекающими под «маской» кишечной инфекции или острого респираторного заболевания.



Симптомы заболевания:

Болезнь начинается остро, с высокой температуры, недомогания, отказа от еды, в половине случаев

появляются симптомы поражения верхних дыхательных путей (кашель, насморк) и кишечника (жидкий стул), а через 1-3 дня присоединяются симптомы поражения нервной системы (головная боль, боли в конечностях, спине), появляются парезы и параличи.




Как передаётся полиомиелит?

Механизм передачи инфекции — фекально-оральный. Реализуется через водный, пищевой и бытовой пути передачи, т. е. через загрязнённые руки, пищу и воду. Иногда вирус передаётся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

Человек становится заразным ещё до начала симптомов: в

отделяемом носоглотки вирус появляется через 36 часов после заражения, в кале — через три дня.

Больше всего вирусных частиц выделяется в первую неделю болезни. Из носоглотки вирус попадает в окружающую среду в течение семи дней, из кишечника — до 42-х дней.



Чем опасен полиомиелит?

Полиомиелит — это очень опасное вирусное заболевание. Вирус поражает нервную систему и за считанные часы может привести к параличу (обездвиживанию) большей части тела.

