**Кафедра медицинской и биологической физики
КрасГМУ**

Тема:

Определенный интеграл

Лекция №11

**Для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 30.05.03 –
Медицинская кибернетика**

Автор лекции: доцент, к.ф.-м.н. Шаповалов К.А.

Красноярск, 2020

План

1. Предел интегральных сумм.
2. Свойства определенного интеграла.
3. Формула Ньютона-Лейбница.
4. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.
5. Приложения определенного интеграла.
6. Несобственные интегралы.
7. Методы приближенного вычисления определенных интегралов.

Цель лекции

Дать понятие и свойства определенного интеграла, основные приложения определенного интеграла.

Криволинейная трапеция

Рассмотрим отрезок $[a, b]$ ($a < b$) и заданную на нём непрерывную неотрицательную функцию $f(x)$. Фигура, ограниченная прямыми $x = a$, $x = b$, $y = 0$ и кривой $y = f(x)$ называется **криволинейной трапецией**.

Интегральная сумма

Сумма вида

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = f(\xi_1) \Delta x_1 + f(\xi_2) \Delta x_2 + \dots + f(\xi_n) \Delta x_n$$

где ξ_i – произвольная точка частичного

отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$,

называется **интегральной суммой**

функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Интегральная сумма (геометрический смысл)

Сумма I_n равна сумме площадей прямоугольников с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$. Будем Δx_i стремиться к нулю. Если при этом величина I_n стремится к определенному пределу, то этот предел S называется площадью криволинейной трапеции.

$$S = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Определенный интеграл

Пусть функция $y=f(x)$ определена на отрезке $[a,b]$ и на этом отрезке произвольно выбраны не совпадающие друг с другом точки $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ так, что $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$ выбрано разбиение этого отрезка на n частей. В каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ произвольным образом выбрана точка $\xi_i, i=1, 2, \dots, n$.

Определенным интегралом от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ называется предел I_n интегральных сумм функции $f(x)$ при условии, что длина наибольшего частичного отрезка Δx_i стремится к нулю.

$$S = \int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Числа a и b называются соответственно нижним и верхним пределами интегрирования.

Определенный интеграл

Очевидно, геометрический смысл определенного интеграла - это площадь *криволинейной трапеции*, ограниченной:

1. графиком функции $f(x)$,
2. двумя прямыми ($x=a$, $x=b$), проведенными параллельно оси Oy в точках a и b оси абсцисс,
3. осью абсцисс ($y=0$).

Свойства определенного интеграла

Теорема 1. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$, тогда

1. Если пределы интегрирования меняем местами $a < b$, то меняем знак:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

2. Одинаковые пределы $a = b$:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

3.
$$\int_a^b B \cdot f(x) dx = B \cdot \int_a^b f(x) dx$$

, где B - постоянная величина.

4.
$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Свойства определенного интеграла

Теорема 2. Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Но ограниченность функции не является достаточным условием для ее интегрируемости (например, функция Дирихле).

Теорема 3. Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема на этом отрезке.

Теорема 4. Функция $f(x)$, ограниченная на $[a, b]$ и имеющая конечное число точек разрыва (кусочно-непрерывная) является интегрируемой.

Свойства определенного интеграла

Теорема 5. Если на отрезке $[a, b]$, функции $f(x)$ и $g(x)$

удовлетворяют условию $f(x) \leq g(x)$, то:
$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

Теорема 6. Если m и M – наименьшее и наибольшее значения (точные грани) функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, и $a \leq b$ то:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

Свойства определенного интеграла

Теорема 7. (первая формула среднего).

Если на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ непрерывна и имеет точные грани m и M , то на этом отрезке найдется такое число, удовлетворяющее неравенствам $m \leq \mu \leq M$ или точка $\xi \in [a, b]$ такая, что $f(\xi) = \mu$, что

$$\int_a^b f(x) dx = \mu(b-a) = f(\xi)(b-a)$$

Теорема 8. Для любых трех чисел $a < c < b$ справедливо

равенство:

если эти интегралы существуют

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Свойства определенного интеграла

Теорема 9. (вторая формула среднего, формула Бонне).
Если на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема, а $g(x)$ монотонна, отрезке найдется такое число, $\xi \in [a, b]$, что

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx$$

Интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x)$

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана интегрируемая функция $f(x)$,

Пусть $x \in [a, b]$, будем в интеграле $\int_a^b f(x) dx$ менять верхний предел b , как переменную x , тогда получим функцию $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(x) dx$$

$$\Phi(a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\Phi(b) = \int_a^b f(x) dx$$

Интеграл с переменным верхним пределом

пределом

Если $f(x) > 0$, то значение функции $\Phi(x)$ численно равно площади криволинейной трапеции

Интеграл с переменным верхним пределом

Теорема 10. Если функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $[a, b]$, то интеграл с переменным верхним пределом

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

имеет производную, равную значению подынтегральной функции при верхнем пределе, т. е. $\Phi'(x) = f(x)$.

Следовательно, $\Phi(x)$ есть первообразная функции $f(x)$.

Интеграл с переменным верхним пределом

пределом

Замечание.

Интегралы с переменным верхним пределом часто используют для определения новых функций, которые не выражаются через элементарные функции. Например,

Интеграл Пуассона:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

или интеграл Френеля:

$$C(x) = \int_0^x \cos\left(\frac{\pi}{2} t^2\right) dt$$

или эллиптический интеграл 1 рода:

$$F(\theta, k) = \int_0^{\theta} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

Формула Ньютона-Лейбница

Если непрерывная функция $f(x)$ имеет первообразную $F(x)$, то для нахождения определенного интеграла используют формулу Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Примеры использования формулы Ньютона-Лейбница

1. $f(x)=1$

$$\int_a^b dx = b - a$$

2. $f(x)=\cos x$

$$\int_a^b \cos x dx = \sin x \Big|_a^b = \sin b - \sin a$$

3. $f(x)=1/x$

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

Замена переменных в определенном интеграле

Пусть подынтегральная функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Если $x = \varphi(t)$ и

1. $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b, a \leq \varphi(t) \leq b$

2. $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ непрерывны на отрезке $[\alpha, \beta]$

3. $f(\varphi(t))$ определена и непрерывна на отрезке $[\alpha, \beta]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Замена переменных в определенном интеграле

Например

$$\int_1^2 \ln x \frac{dx}{x} = \left| \begin{array}{l} t(x) = \ln x \\ t(1) = 0 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} dt = \frac{dx}{x} \\ t(2) = \ln 2 \end{array} \right| = \int_0^{\ln 2} t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\ln 2} = \frac{1}{2} \ln^2 2$$

Формула интегрирования по частям для определенного интеграла

Пусть $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемые функции на отрезке $[a, b]$ тогда

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx \quad \text{ИЛИ}$$

$$\int_a^b u dv = u \cdot v \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Формула интегрирования по частям для определенного интеграла

Пример.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos x dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = \sin x \end{array} \right| = [x \sin x] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx =$$

$$= \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$$

Приложения определенного интеграла

Площадь S фигуры в прямоугольных координатах

Площадь S фигуры, ограниченной двумя графиками неотрицательных функций $f(x)$ и $g(x)$, равна

где $f(x) > g(x)$.

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Следует учитывать возможные пересечения графиков!!!

Площадь S фигуры в прямоугольных координатах (отрицательные функции)

Если функция $f(x) \leq 0$ на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq 0$$

тогда площадь криволинейной трапеции S :

$$S = -\int_a^b f(x) dx$$

инвариантность

площади относительно

перемещений:

Площадь S фигуры в прямоугольных координатах

Найдем площадь фигуры, ограниченной линиями
 $y = \sqrt{x}$, $y=0$, $x=1$, $x=9$

$$\int_1^9 \sqrt{x} dx = \frac{2x^{3/2}}{3} \Big|_1^9 = \frac{2}{3} \left(9^{3/2} - 1^{3/2} \right) = \frac{52}{3} \approx 17,333$$

Площадь S фигуры в прямоугольных координатах

Найдем площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sqrt{x}$, $y = x$

Сначала находим координаты точек пересечения графиков функций.

Для этого решим систему:

$$\begin{cases} y = x \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$$

Приравняем $x = \sqrt{x}$. Возводя обе части в квадрат, получим квадратное уравнение $x^2 - x = 0$. Поэтому, преобразуя как $x(x-1) = 0$, будем иметь два корня $x_1 = 0$, $x_2 = 1$. Ясно, что на промежутке от 0 до 1 значения $\sqrt{x}$ всегда превышают x .

Площадь S фигуры в прямоугольных координатах

Таким образом, задача сводится к нахождению интеграла.

$$\int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} 1^{3/2} - \frac{1^2}{2} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

Площадь S фигуры в прямоугольных координатах

Вычислить площадь сегмента, отсекаемого прямой $y = -x$ от параболы $(x-1)^2 = -y+1$.

Найдем точки пересечения параболы и прямой:

$$-x = 2x - x^2 \quad \longrightarrow \quad 3x - x^2 = 0 \quad \longrightarrow \quad x_1 = 0, x_2 = 3.$$

$$\begin{cases} y = -x \\ y = 2x - x^2 \end{cases}$$

Так как на отрезке $[0, 3]$ разность функций $2x - x^2 - (-x) \geq 0$ положительна, то

$$\int_0^3 (2x - x^2 - (-x)) dx = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left. \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = \frac{9}{2} = 4,5$$

Площадь криволинейного сектора в полярных координатах

Пусть кривая задана в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.

Плоскую фигуру, ограниченную кривой АВ и двумя полярными радиусами, составляющими с полярной осью углы α и β , будем называть криволинейным сектором

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$$

Площадь криволинейного сектора в полярных координатах

Вычислить площадь фигуры, ограниченной полярной осью и первым витком спирали Архимеда $\rho(\varphi) = a\varphi$, где a — положительное число.

$$S = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \varphi^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \frac{\varphi^3}{3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{4\pi^3 a^2}{3}$$

Заметим, что точка C отстоит от полюса O на расстоянии $\rho = 2\pi a$. Поэтому круг радиуса OC имеет площадь $\pi \cdot OC^2 = 4\pi^3 a^2$, т.е. в 3 раза больше.

Площадь криволинейного сектора в полярных координатах

Найти площадь трилистника $\rho(\varphi) = a \cdot \cos(3\varphi)$. Из рисунка можно заключить, что достаточно вычислить площадь части трилистника, отвечающей изменению φ от 0 до $\pi/6$, и полученный результат умножить на шесть.

$$S = \frac{6a^2}{2} \int_0^{\pi/6} \cos^2 3\varphi d\varphi = 3a^2 \int_0^{\pi/6} \frac{1 + \cos 6\varphi}{2} d\varphi = 3a^2 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sin 6\varphi}{12} \right) \Big|_0^{\pi/6} = \frac{\pi a^2}{4}$$

Объем тела с известной площадью сечения

сечения

Объем тела с известной площадью сечения $S(x)$.
Элемент объема $dV = S(x)dx$. Объем тела

$$V = \int_a^b S(x)dx$$

Объем тела вращения вокруг оси Ox кривой $f(x)$. Здесь $S(x) = \pi f^2(x)$, тогда

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$$

Объем тела с известной площадью сечения

Вычислить объем шара радиуса R .

Шар радиуса R получается вращением

полуокружности $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ вокруг оси Ox

Используя симметрию шара относительно оси Oy ,

находим

$$V = \pi \int_{-R}^R f^2(x) dx = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Несобственные интегралы

1. Определим несобственный интеграл как

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx = F(b \rightarrow \infty) - F(a)$$

Если предел существует, то интеграл «сходится», если нет, то «расходится».

2. Если подынтегральная функция имеет точку разрыва при $x = b$, то несобственный интеграл определим так

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx = F(x \rightarrow b) - F(a)$$

Несобственные интегралы

Пример 1.

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg}(x+1) \Big|_0^b =$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} (\operatorname{arctg}(b+1) - \operatorname{arctg} 1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Пример 2.

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2-x}} = \lim_{b \rightarrow 2-0} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt{2-x}} = - \lim_{b \rightarrow 2-0} 2\sqrt{2-x} \Big|_0^b =$$

$$= - \lim_{b \rightarrow 2-0} (2\sqrt{2-b} - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$$

Несобственные интегралы

Пример 3.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow -0} \int_{-1}^b \frac{dx}{x^2} + \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow -0} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-1}^b + \lim_{a \rightarrow +0} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_a^1 =$$

$$= \lim_{b \rightarrow -0} \left(-\frac{1}{b} - 1 \right) + \lim_{a \rightarrow +0} \left(-1 + \frac{1}{a} \right) = \infty$$

Методы приближенного вычисления определенных интегралов

1. Метод прямоугольников

Разобьем отрезок $[a, b]$ на n равных частей с длиной $h=(b-a)/n$ с помощью точек

$a=x_0 < x_1 < \dots < x_{2n}=b$. Обозначим среднюю точку сегмента x_{2k-1} $[x_{2k-2}, x_{2k}]$.

Приближенно заменяем интеграл суммой площадей, указанных на рисунке

прямоугольников высоты $f(x_{2k-1})$ и ширины h .

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} [f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{2n-1})] + R$$

$$R = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\xi)$$

где R - остаточный член, $f''(\xi)$ - вторая производная, ξ - точка на отрезке $[a, b]$

Методы приближенного вычисления определенных интегралов

2. Метод трапеций

Разобьем отрезок $[a, b]$ на n равных частей с длиной $h=(b-a)/n$ с помощью точек

$a=x_0 < x_1 < \dots < x_{2n}=b$. Приближенно заменяем интеграл суммой площадей, указанных на чертеже прямолинейных трапеций высотой h .

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2n} \{ [f(x_0) + f(x_1)] + [f(x_1) + f(x_2)] + \dots + [f(x_{n-1}) + f(x_n)] \} + R =$$

$$= \frac{b-a}{2n} \left\{ f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right\} + R$$

$$R = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi)$$

, где R - остаточный член,
 ξ - точка на отрезке $[a, b]$

Методы приближенного вычисления определенных интегралов

3. Метод парабол или Симпсона

Вычислим площадь, ограниченную дугой параболы проходящей через точки

M_0, M_1, M_2 с ординатами y_0, y_1, y_2 .

Уравнения для определения A, B, C

следующие:

$$\begin{cases} y_0 = C \\ y_1 = A \frac{h^2}{4} + B \frac{h}{2} + C \\ y_2 = Ah^2 + Bh + C \end{cases}$$

Площадь под параболой равна

$$\int_0^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{Ah^3}{3} + \frac{Bh^2}{2} + Ch = \frac{h}{6} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

Методы приближенного вычисления определенных интегралов

3. Метод парабол или Симпсона

Разобьем отрезок $[a, b]$ на n равных частей с длиной $h=(b-a)/n$ с помощью точек $a=x_0 < x_1 < \dots < x_{2n}=b$. Приблизительно заменяем интеграл суммой площадей, заштрихованных на рисунке фигур, лежащих под парабололами.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6n} \{ [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \dots + [f(x_{2n-2}) + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})] \} + R =$$

$$= \frac{b-a}{6n} \left\{ f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{2k+1}) \right\} + R$$

$$R = -\frac{(b-a)^5}{2880n^4} f^{(4)}(\xi)$$

где $f^{(4)}(\xi)$ – четвертая производная, ξ - точка на отрезке $[a, b]$

Заключение

Рассмотрены понятие и свойства
определенного интеграла, а также основные
приложения определенного интеграла.

Литература

основная

1. Математика: учеб. для студентов фармацевт. и мед. вузов/ Е.В. Греков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

дополнительная

1. Высшая математика /К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукоусев - М.: Флинта, 2010.

2. Математика в примерах и задачах: учебное пособие /Л.Н.Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В.Никонова и др.- М.: ИНФРА-М, 2010.

электронные ресурсы

1. ЭБС КрасГМУ (<http://www.krasgmu.ru>)

2. Ресурсы Интернет

Благодарю за внимание !