



ГРАММИДИН

БАЗОВЫЙ ТРЕНИНГ ПО ПРОДУКТУ

Леся Анфиногенова, групп-продакт менеджер




Заболевания горла


- ✓ 78% жителей нашей страны периодически страдают от инфекционных заболеваний горла
- ✓ Самые распространенные заболевания горла – фарингит и тонзиллит/тонзиллофарингит
- ✓ Тонзиллит (ангина) случается чаще осенью-зимой и весной
- ✓ Фарингит - чаще зимой, в период пика простудных заболеваний
- ✓ За последние несколько лет отмечается рост заболеваемости ангиной и фарингитом летом



Боль в горле у взрослых



Боль в горле у детей 4-12 лет



Самые частые факторы риска

- ✓ общее или местное переохлаждение
- ✓ ослабление иммунитета
- ✓ переутомление
- ✓ перенапряжение связок
- ✓ инфекционные заболевания

Другие факторы риска

- ✓ Плохая экология
- ✓ Курение и злоупотребление алкоголем
- ✓ Иммунодефициты
- ✓ Заболевания почек и системы крови
- ✓ Затрудненное носовое дыхание
- ✓ Аллергические заболевания
- ✓ Эндокринные расстройства
- ✓ Гиповитаминозы
- ✓ Сахарный диабет



Этиологические факторы

Фарингит:

- ✓ Риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, вирус гриппа и парагриппа
- ✓ Бактерии
- ✓ Грибы

Ангина (тонзиллофарингит):

- ✓ БГСА (!), стафилококки или стафилококк + другие стрептококки, вирусы

Общие симптомы

проявляются пятью хорошо известными признаками воспаления:

- ✓ Боль (Dolor) – боль при глотании и першение
- ✓ Краснота (Rubor) – «красное горло»
- ✓ Жар (Calor) – местное повышение температуры в горле
- ✓ Опухание (Tumor) - набухание миндалин и слизистой оболочки
- ✓ Нарушение функции (Functio laesa) - трудность глотания и разговора

Боль в горле значительно ухудшает качество жизни больного

Тонзиллит/тонзиллофарингит



Острый тонзиллит (ангина)

острое инфекционное заболевание с характерным очагом воспаления лимфоидных образованиях глоточного кольца (миндалины)

- ✓ Чаще возбудителями являются бактерии
- ✓ Местные (боль, першение) и общие (интоксикация, слабость) симптомы - проявления бактериальной инфекции
- ✓ Осложнения возможны при любом течении заболевания, а не только при явно тяжелом


Хронический тонзиллит

- ✓ Длительно протекающий воспалительный процесс в небных миндалинах и периодическими обострениями
- ✓ Причина – дисбаланс микрофлоры и ухудшение защитных функций организма

β-гемолитический стрептококк группы А

Пиогенный стрептококк

Streptococcus pyogenes



Стрептококковым тонзиллитом чаще всего болеют дети в возрасте 5-15 лет. Дети младше 3-х лет и взрослые старше 18 лет болеют очень редко.

Возможные осложнения тонзиллофарингита



инфицирование β -гемолитическим стрептококком группы А



Распространение инфекционного процесса на другие органы и ткани, выработка антител тропных к тканям миокарда, почек, лимфатических узлов и т.д.



Острая
ревматическая
лихорадка

Острый
постстрептококковый
гломерулонефрит

Паратонзиллярный абсцесс,
абсцесс окологлоточного
пространства, флегмона шеи

Ревматическая
болезнь сердца

БГСА или нет?

Шкала Мак-Айзека

- ✓ температура больше 38 градусов – 1 балл;
- ✓ отсутствие кашля – 1 балл;
- ✓ увеличение и болезненность шейных лимфоузлов – 1 балл;
- ✓ увеличение небных миндалин и налеты на них – 1 балл;
- ✓ возраст 3-14 лет – 1 балл, 15-18 лет – 0 баллов.



Результат от 2 баллов – необходимость экспресс-теста на БГСА или культурального исследования (посева)

Фарингит



Острый фарингит – инфекционное воспаление мягких тканей глотки (чаще всего поражаются и глотка и гортань)

- ✓ Изначально в 70% случаев возбудители – вирусы, до 30% возбудитель – бактерии, реже - грибы
- ✓ Вирусное инфицирование является лишь первой фазой заболевания, оно прокладывает путь для бактериальной инфекции
- ✓ Выраженные общие симптомы (высокая температура, интоксикация, слабость) могут быть проявлениями бактериальной инфекции

Потребитель предпочитает лечить боль в горле при помощи лекарственных средств



«Заболевание вовремя не начала лечить. началось осложнение. обратилась к врачу. считаю лекарственные средства более эффективными при такой проблеме, а народные средства можно применять в комплексе. отдельное применение народных средств не приведут к выздоровлению»


- ✓ Ключевым драйвером выбора медикаментозного способа лечения является восприятие его более высокой эффективности по сравнению с другими методами лечения (народная медицина и физиотерапия), а также рекомендация врача

Характеристики боли в горле


Характер боли в горле



Тип боли в горле



Связь боли в горле с простудой, ГРИППом, ОРВИ



- ✓ Наиболее распространенным проявлением боли в горле является боль и дискомфорт при глотании, и першение. Острая, режущая, жгучая боль – наименее часто встречающееся явление
- ✓ Половина пациентов описывает боль как постоянную, треть – как пульсирующую
- ✓ В половине случаев боль в горле является одним из симптомов простуды, ГРИППа, ОРВИ, в половине – единственным симптомом

Применение препаратов от боли в горле

Использование форм препаратов





Схема приема препаратов




- ✓ Приверженцами определенной формы выпуска препаратов являются 54% пациентов (27% - используют преимущественно спреи, 27% - преимущественно таблеточные формы). 45% в равной степени используют обе формы, выбирая ту или иную в зависимости от ситуации (удобство применения) и силы боли
- ✓ 54% респондентов принимают лекарство сразу после появления боли в горле и несколько дней после для «закрепления результата» и только 26% принимают полным курсом.
- ✓ 20% принимают препараты разово

Комбинированное использование препаратов


Схема приема

Одновременно



Последовательно: сначала один препарат, потом второй

Причины совмещения




Из них:

Увеличение эффективности – 6%;
В зависимости от места (дом/ работа) – 4%;
Закончился имеющийся препарат – 3%;
Ограничение по количеству приема – 2%;
Назначение врача – 2%

- ✓ При совмещении разных препаратов для лечения 60% пациентов применяю средства последовательно, 40% - одновременно
- ✓ Пациенты убеждены в том, что спреи и таблетки по-разному справляются с разными видами боли – это основной драйвер применения нескольких препаратов в рамках одного случая заболевания

Длительность лечения боли в горле

Начало приема лекарств
после появления боли в



Облегчение боли в горле
после начала лечения




Полное избавление от боли
в горле после начала




Факторы выбора препаратов от боли в горле

82% Эффективность




37% Безопасность



31%

Приемлемая цена

92% Другие факторы



- ✓ Эффективность является основным фактором выбора для абсолютного большинства респондентов. Приоритетной характеристикой эффективности пациенты называют **способность препарата быстро облегчить боль**
- ✓ Вторым по важности критерием является **удобная форма выпуска / простота в применении**
- ✓ **Доступность в продаже** является третьим фактором выбора препарата, что является показателем низкой лояльности потребителей в категории препаратов для лечения боли в горле

Врач, провизор

Что нужно от «Идеального препарата»?

- Широкий спектр действия
- Отсутствие токсического эффекта, отсутствие системного действия
- Низкая аллергенность
- Отсутствие раздражающего действия на слизистую
- Удобный режим приема, гарантирующий комплаентность пациента

Самое главное – уверенность в эффективном и безопасном лечении

Мы разработали идеальный препарат для
лечения больного горла



Эффективность, проверенная временем

- ✓ Грамицидин открыт в 1943 году отечественными учеными М. Бражниковой и Г. Гаузе
- ✓ В 1944 году был передан английским химикам для изучения. Над проектом работала студентка-химик Маргарет Тэтчер
- ✓ Антибиотик получил Государственную «Сталинскую» премию в 1946 году по предложению Н.Н.Бурденко
- ✓ Один из самых успешных оригинальных советских препаратов
- ✓ Много лет был ключевым антибиотиком для лечения инфекций мягких тканей и кожи



Граммидин: состав и формы выпуска



- ✓ Грамицидин С – 3 мг, антибиотик
- ✓ Цетилпиридиния
- ✓ хлорид – 1 мг, антисептик

- ✓ Грамицидин С – 3 мг, антибиотик
- ✓ Цетилпиридиния хлорид – 1 мг, антисептик
- ✓ Оксibuпрокаин – 0,2 мг, анестетик

- ✓ Грамицидин С – 1,5 мг, антибиотик
- ✓ Цетилпиридиния хлорид – 1 мг, антисептик

Эволюция линейки Граммидин

Ребрендинг 2004



Февраль 2006



Появление формы
Граммидин® с анестетиком

Октябрь 2009



Новая формула, разработанная швейцарской
компанией Vifor

2013 год




Граммидин® детский

Граммидин




- ✓ уникальный комбинированный препарат для лечения боли в горле
- ✓ максимально быстро и безопасно устраняет причину заболевания у взрослых и детей с 4-х лет
- ✓ 1 упаковки достаточно для курса лечения

Грамицидин С




Bacillus brevis



- ✓ Грамицидин С – циклодекапептидный антибиотик –
- ✓ синтезируется спорообразующей почвенной бактерией *Bacillus brevis*.
- ✓ Молекула состоит из остатков L-пролина, L-валина, L-орнитина, L-лейцина, D-фенилаланина
- ✓ Состоит из двух соединенных одинаковых пентапептидов по типу «голова-хвост»
- ✓ Мембранотропный антибиотик- йонофор

Механизм действия Грамицидина С



- ✓ Разрушает клеточную мембрану, приводит к осмотической неустойчивости и гибели микробной клетки

Особенности Грамицидина С


- ✓ Широкий «терапевтический спектр»
бактерициден в отношении 99%
возбудителей заболеваний горла
- ✓ В ЖКТ всасывается менее 10% и поэтому
почти не проникает в кровь
- ✓ Побочные эффекты минимальны

Не вызывает
резистентности
микроорганизмов

Цетилпиридиния хлорид - антисептик


- ✓ Действует как поверхностно-активный катион
- ✓ Деполяризует цитоплазматическую мембрану микробов, т.о. увеличивая ее проницаемость
- ✓ Действует бактериостатически на грамположительные бактерии, грамотрицательные бактерии, уничтожает липофильные вирусы
- ✓ Оказывает фунгицидное действие на *Candida albicans*

Блокирует развитие
осложненной
инфекции



Оксибупрокаин - анестетик

- ✓ Инновационный компонент
- ✓ Высокая способность к проникновению в ткани при местном применении
- ✓ Высокая безопасность
- ✓ Низкая аллергенность и токсичность (в сравнении с лидокаином)



Разрешен к
применению у детей
с 4 лет

Режим приема препарата

Граммидин нео и с анестетиком нео

- ✓ Дозировка для взрослых и для детей с 12 лет: по 1 таблетке 3-4 раза в день
- ✓ Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день

Граммидин детский

- ✓ Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 4 раза в день
- ✓ Дозировка для взрослых и для детей с 12 лет: по 2 таблетки 4 раза в день

Сравнительное исследование (взрослые)




VALENTA


Открытое, сравнительное, рандомизированное, многоцентровое клиническое исследование эффективности и безопасности применения препаратов
Граммидин Нео, Стрепсилс плюс, Фарингосепт, Фалиминт

- Кол-во пациентов: 120 человек от 18 до 60 лет
- Симптом: боль в горле на фоне простудных заболеваний
- Курс лечения: 5 дней
- Руководитель: Г.Д. Тарасова

**% пациентов, у которых перестала
выделяться патогенная и условно-
патогенная микрофлора**



**Выздоровление (%) пациентов к
моменту завершения исследования**




**Граммидин Нео показал самую
высокую **эффективность****

Сравнительное исследование (дети)


Открытое сравнительное клиническое исследование
эффективности и безопасности применения препаратов Грамминдин Нео и Лизобакт

- Кол-во пациентов: 90 детей в возрасте 4-9 лет
- Симптом: боль в горле на фоне острого и хронического фарингита, ринофарингита, на фоне ОРВИ
- Курс лечения: Грамминдин Нео – 6 дней; Лизобакт – 8 дней
- Руководители: Е.Ю.Радциг, М.Р.Богомильский

Продолжительность жалоб (в сутках)



Сроки купирования симптомокомплекса «боль в горле»




Грамминдин Нео
на сутки быстрее
купирует боль в горле

Сравнительное исследование (дети)

Граммидин Нео
в 3 раза эффективнее
Лизобакта

Доля детей с исчезновением всех местных признаков острого воспаления



Доказано:
Высокий профиль
безопасности

Рекомендация для пациентов

- ✓ «У меня болит горло»
- ✓ «У меня першит горло»
- ✓ «У меня воспалилось горло»
- ✓ «Я сиплю»
- ✓ «У меня ангина»
- ✓ «потерял голос»
- ✓ «У моего ребенка болит горло» (от 4 лет)

Граммидин



При любых проявлениях заболевания горла и на любой стадии—
Граммидин




VALENTA

Грамминдин®
детский



Боль в горле у детей



- ✓ Чаще всего на боль в горле жалуются дети старше 4 лет и подростки
- ✓ В среднем каждый 10-й пациент на приеме у врача-педиатра – это пациент с болью в горле, во время эпидемии острого респираторного заболевания (ОРЗ) таких пациентов становится гораздо больше



- ✓ Практически ни одна из острых респираторных инфекций у ребенка не обходится без воспалительных явлений со стороны слизистой оболочки глотки. При этом основными клиническими признаками являются боль, першение или дискомфорт

Особенности боли в горле у детей

- ✓ Около 70% случаев боли в горле у детей приходится на острый фарингит
- ✓ Для детей младше 14 лет велика вероятность тонзиллофарингита БГСА-этиологии
- ✓ Причиной боли в горле у детей может быть стекание отделяемого из носа по задней стенке глотки при остром аденоидите
- ✓ Острый фарингит/тонзиллофарингит может быть первым проявлением некоторых инфекционных заболеваний (корь, скарлатина, краснуха, инфекционный мононуклеоз)

Требования к топическим антимикробным препаратам у детей

- ✓ широкий спектр антимикробного действия
- ✓ отсутствие токсического эффекта и низкая скорость абсорбции со слизистых оболочек
- ✓ низкая аллергенность
- ✓ отсутствие раздражающего действия

Что еще важно для ребенка при выборе лекарственной формы?

- ✓ Вкусовые качества препарата чрезвычайно важны!
- ✓ Спреи не всегда удобно применять у детей, а полоскания рекомендуются только с 8–10-летнего возраста, когда ребенок научится самостоятельно выполнять данную процедуру
- ✓ Лекарственная форма «таблетка для рассасывания» обеспечивает максимальное время нахождения в ротовой полости, а значит — концентрацию действующих веществ на слизистой оболочке
- ✓ Таблетки для рассасывания комфортны в применении у маленьких пациентов
- ✓ Препарат в лекарственной форме для рассасывания, помимо прямого антибактериального действия, также обеспечивает увеличение выработки слюны и дополнительную санацию полости рта и горла

Эффективность лекарственной формы «таблетки для рассасывания»

- ✓ При применении таблеток для рассасывания создается большая концентрация лекарственного вещества в тканях глотки и на более длительное время, чем при использовании растворов для полоскания и спреев
- ✓ Применение таблеток для рассасывания оказывает положительное эмоциональное воздействие на пациентов

Граммидин® детский

Состав:

Граммидин С 1,5 мг

Цетилпиридиния хлорид 1 мг

Способ применения :

От 4 до 12 лет: 1 таблетка 4 раза в день

Старше 12 лет: по 2 таблетки 4 раза в день

Показания:

Фарингит, тонзиллит, пародонтит,
гингивит, стоматит

Со вкусом малины!




VALENTA

Болевые ощущения в горле на момент начала терапии наблюдались у абсолютного большинства (95%) пациентов. На 4-й день лечения – только у 31% (снижение в 3 раза). По окончании лечения боль в горле не отмечалась



* $p < 0,001$

К 4-му дню терапии Граммидином детским количество случаев умеренно-выраженного першения в горле сократилось в 28 раз, сильно-выраженного – до нуля. К окончанию лечения были только слабо-выраженные симптомы у 1,6% (1 пациента)



$p < 0,001$

Чувство саднения в горле уже на втором посещении отмечались в 4 раза реже, причем сильно выраженное исчезало совсем, умеренно – встречалось в 7,5 раз реже, слабо – в 2,2 раза реже. К окончанию лечения саднения не отмечалось ни у одного пациента



Умеренно-выраженная сухость в горле на 4-й день терапии отмечалась в 16 раз реже, сильно выраженная – полностью исчезала. К окончанию лечения сухости в горле не наблюдалось ни у одного пациента



Данные фарингоскопии

- ✓ Доля пациентов с отсутствием признаков гиперемии слизистой оболочки глотки достоверно увеличилась ко второму ($p=0,002$) и третьему визитам ($p<0,001$) и составила 18,0 и 96,7% соответственно.
- ✓ Доля пациентов с отсутствием признаков отека слизистой оболочки глотки достоверно увеличилась ко второму ($p<0,001$) и третьему визитам ($p<0,001$) и составила 41,0 и 98,4% соответственно.
- ✓ Доля пациентов с отсутствием лимфоидных гранул задней стенки глотки и боковых столбов достоверно увеличилась ко второму ($p<0,001$) и третьему визитам ($p<0,001$) и составила 60,7 и 91,8% соответственно.
- ✓ Исчезновение всех оцениваемых признаков острого воспаления по данным фарингоскопии на 4-5 и 7-8 дни от начала лечения отмечено у 14,8 и 90,2% пациентов.

Достижения бренда

Граммидин - №2 в сегменте средств от боли в горле в таблетках в упаковках...



БРЕНД	ОБЪЕМ ПРОДАЖ, УП			ДОЛЯ % УП		
	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016
[-] Вся Россия	57 156 546	59 415 716	51 362 058	100,0%	100,0%	100,0%
⊕ СТРЕПСИЛС	13 483 607	13 629 096	11 085 931	23,6%	22,9%	21,6%
⊕ ГРАММИДИН	7 353 306	9 447 055	8 576 455	12,9%	15,9%	16,7%
⊕ ФАРИНГОСЕПТ	7 706 592	7 880 536	6 979 019	13,5%	13,3%	13,6%
⊕ ЛИЗОБАКТ	7 027 822	7 022 063	5 756 240	12,3%	11,8%	11,2%
⊕ ГЕКСОРАЛ ТАБС	1 923 797	3 044 304	2 821 056	3,4%	5,1%	5,5%
⊕ ИМУДОН	2 390 461	2 767 631	2 614 256	4,2%	4,7%	5,1%
⊕ АДЖИСЕПТ	2 651 505	2 490 098	2 249 306	4,6%	4,2%	4,4%
⊕ АНТИ-АНГИН	2 167 140	1 848 428	2 127 960	3,8%	3,1%	4,1%
⊕ СЕПТОЛЕТЕ	2 728 694	2 267 007	1 977 495	4,8%	3,8%	3,9%
⊕ ФАЛИМИНТ	1 950 860	1 722 148	1 369 326	3,4%	2,9%	2,7%
⊕ ЛАРИПРОНТ	1 029 751	1 121 429	863 742	1,8%	1,9%	1,7%
⊕ СУПРИМА	728 927	331 674	860 171	1,3%	0,6%	1,7%
⊕ ТОНЗИЛГОН	676 142	730 770	652 099	1,2%	1,2%	1,3%
⊕ ГЕКСАЛИЗ	449 127	493 838	624 534	0,8%	0,8%	1,2%
⊕ НЕО-АНГИН	483 275	633 724	611 336	0,8%	1,1%	1,2%
⊕ ТАНТУМ	634 450	784 496	399 885	1,1%	1,3%	0,8%
⊕ ГРАМИЦИДИН	334 083	392 607	393 906	0,6%	0,7%	0,8%

...и в денежном выражении

БРЕНД	ОБЪЕМ ПРОДАЖ, РУБ			ДОЛЯ % РУБ		
	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016
 Вся Россия	6 677 956 982	8 648 963 496	9 155 009 147	100,0%	100,0%	100,0%
 СТРЕПСИЛС	1 608 730 626	2 022 514 559	2 033 267 326	24,1%	23,4%	22,2%
 ГРАММИДИН	1 004 207 091	1 449 528 008	1 584 522 121	15,0%	16,8%	17,3%
 ЛИЗОБАКТ	791 629 088	1 288 037 587	1 481 468 726	11,9%	14,9%	16,2%
 ИМУДОН	897 794 108	1 076 360 553	1 102 996 631	13,4%	12,4%	12,0%
 ФАРИНГОСЕПТ	551 076 442	678 894 901	767 576 799	8,3%	7,8%	8,4%
 ГЕКСОРАЛ ТАБС	180 678 268	317 845 516	348 270 141	2,7%	3,7%	3,8%
 АНТИ-АНГИН	201 231 426	195 264 059	260 150 394	3,0%	2,3%	2,8%
 СЕПТОЛЕТЕ	252 448 649	243 739 772	258 062 539	3,8%	2,8%	2,8%
 ФАЛИМИНТ	229 391 060	251 573 279	234 372 893	3,4%	2,9%	2,6%
 АДЖИСЕПТ	121 434 378	137 884 231	175 531 500	1,8%	1,6%	1,9%
 ТОНЗИЛГОН	136 094 207	158 327 242	164 359 720	2,0%	1,8%	1,8%
 ЛАРИПРОНТ	114 919 876	144 164 174	158 748 096	1,7%	1,7%	1,7%
 ГЕКСАЛИЗ	69 692 206	85 661 381	124 510 380	1,0%	1,0%	1,4%
 ТАНТУМ	108 734 680	165 862 326	119 060 077	1,6%	1,9%	1,3%
 СУПРИМА	35 911 790	26 811 191	63 922 889	0,5%	0,3%	0,7%
 НЕО-АНГИН	38 821 840	56 579 965	61 998 911	0,6%	0,7%	0,7%
 ГРАМИЦИДИН	29 750 188	42 014 676	47 903 928	0,4%	0,5%	0,5%
 ДОКТОР ТАЙСС	60 139 225	49 458 086	36 438 951	0,9%	0,6%	0,4%

В сегменте таблетки+спреи Граммидин №3 в упаковках..

БРЕНД	ОБЪЕМ ПРОДАЖ, УП			ДОЛЯ % УП		
	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016
 Вся Россия	93 139 912	94 906 653	81 549 726	100,0%	100,0%	100,0%
 СТРЕПСИЛС	13 924 709	14 285 388	11 552 785	15,0%	15,1%	14,2%
 ИНГАЛИПТ	9 516 304	9 803 531	9 679 090	10,2%	10,3%	11,9%
 ГРАММИДИН	7 353 306	9 447 055	8 576 455	7,9%	10,0%	10,5%
 ФАРИНГОСЕПТ	7 706 592	7 880 536	6 979 019	8,3%	8,3%	8,6%
 ГЕКСОРАЛ	7 172 031	6 659 869	5 919 661	7,7%	7,0%	7,3%
 ЛИЗОБАКТ	7 027 822	7 022 063	5 756 240	7,5%	7,4%	7,1%
 ТАНТУМ	7 419 556	7 637 048	5 070 167	8,0%	8,0%	6,2%
 КАМЕТОН	4 114 309	3 757 423	3 300 715	4,4%	4,0%	4,0%
 ГЕКСОРАЛ ТАБС	1 923 797	3 044 304	2 821 056	2,1%	3,2%	3,5%
 ИМУДОН	2 390 461	2 767 631	2 614 256	2,6%	2,9%	3,2%
 БИОПАРОКС	2 766 799	2 909 275	2 560 824	3,0%	3,1%	3,1%
 АНТИ-АНГИН	2 512 756	2 213 671	2 510 160	2,7%	2,3%	3,1%
 АДЖИСЕПТ	2 651 505	2 490 098	2 249 306	2,8%	2,6%	2,8%
 СЕПТОЛЕТЕ	2 728 694	2 267 007	1 977 495	2,9%	2,4%	2,4%
 ФАЛИМИНТ	1 950 860	1 722 148	1 369 326	2,1%	1,8%	1,7%
 ЛЮГОЛЬ	2 084 957	1 940 369	1 272 078	2,2%	2,0%	1,6%
 ЛАРИПРОНТ	1 029 751	1 121 429	863 742	1,1%	1,2%	1,1%

...и №2 в денежном выражении


БРЕНД	ОБЪЕМ ПРОДАЖ, РУБ			ДОЛЯ % РУБ		
	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016	МАТ фев 2014	МАТ фев 2015	МАТ фев 2016
[-] Вся Россия	11 857 705 731	14 224 414 016	14 324 253 541	100,0%	100,0%	100,0%
+ СТРЕПСИЛС	1 725 636 995	2 206 596 045	2 199 273 219	14,6%	15,5%	15,4%
+ ГРАММИДИН	1 004 207 091	1 449 528 008	1 584 522 121	8,5%	10,2%	11,1%
+ ЛИЗОБАКТ	791 629 088	1 288 037 587	1 481 468 726	6,7%	9,1%	10,3%
+ ТАНТУМ	1 260 257 464	1 560 498 790	1 418 504 663	10,6%	11,0%	9,9%
+ ГЕКСОРАЛ	1 278 030 528	1 344 774 016	1 290 974 429	10,8%	9,5%	9,0%
+ БИОПАРОКС	1 009 521 928	1 177 342 351	1 106 268 273	8,5%	8,3%	7,7%
+ ИМУДОН	897 794 108	1 076 360 553	1 102 996 631	7,6%	7,6%	7,7%
+ ФАРИНГОСЕПТ	551 076 442	678 894 901	767 576 799	4,6%	4,8%	5,4%
+ ИНГАЛИПТ	801 557 223	622 870 875	541 175 669	6,8%	4,4%	3,8%
+ ГЕКСОРАЛ ТАБС	180 678 268	317 845 516	348 270 141	1,5%	2,2%	2,4%
+ АНТИ-АНГИН	253 446 362	257 524 286	338 303 717	2,1%	1,8%	2,4%
+ СЕПТОЛЕТЕ	252 448 649	243 739 772	258 062 539	2,1%	1,7%	1,8%
+ ФАЛИМИНТ	229 391 060	251 573 279	234 372 893	1,9%	1,8%	1,6%
+ АДЖИСЕПТ	121 434 378	137 884 231	175 531 500	1,0%	1,0%	1,2%
+ СТОПАНГИН	278 524 469	256 827 077	174 379 645	2,3%	1,8%	1,2%
+ КАМЕТОН	180 246 769	180 923 234	171 383 717	1,5%	1,3%	1,2%
+ ТОНЗИЛГОН	136 094 207	158 327 242	164 359 720	1,1%	1,1%	1,1%
+ ЛАРИПРОНТ	114 919 876	144 164 174	158 748 096	1,0%	1,0%	1,1%

Пациент с болью в горле, удовлетворенность лечением




Знание и использование бренда


Знание бренда



Использование бренда




Вклад каналов в продажи бренда




Провизоры: «Часто рекомендую данное ЛС»

66,8%



Провизоры: работа на переключение




Выписка терапевтами*




* Comcon, Prindex,

Выписка средств для лечения инфекционно-воспалительной патологии глотки, педиатры (ЛФ таблетки)




✓ Педиатры – наиболее значимая ЦА для Граммидина

Динамика доли выписывающих Граммидин педиатров по SKU



✓ Доля педиатров, выписывающих Граммидин, выросла за счет Граммидина детского

Выписка средств для лечения инфекционно-воспалительной патологии глотки, ЛОР-врачи (ЛФ таблетки)



✓ Граммидин уступает в выписке препаратам, используемым для лечения хронической инфекционной патологии

Ведущие диагнозы в назначениях оториноларингологов средств при инфекционно-воспалительной патологии ЛОР-органов: Граммидин и категория (таблетки)



- ✓ Назначения в категории: острая патология 50%, хроническая – 50%
- ✓ Назначения Граммидина: острая патология 59%, хроническая – 41%

Конечный потребитель

Конечный потребитель

Интернет

- Максимальный охват, с минимальная стоимость контакта
- Таргетирование на ЦА
- Адаптивное распределение бюджета между тактиками в режиме реального времени

Увеличение бюджета на потребительские акции в контрактных АС

Развитие в педиатрии

- Усиление региональной лекционной активности
- Инвестиции в исследования с Граммидином детским
- Визиты в формате приоритета в течение 2016 г

Усиление позиций в аптеке

- Трейд-маркетинг нон-стоп
- Визиты в аптеки в формате приоритета в период сезона
- Образовательные мероприятия с первостольниками

Врачи


Аптеки

Конечный потребитель: активность в Интернете




Примеры присутствия в Интернете

Брендинг с таргетированием на ЦА



Он-лайн видео с таргетированием на ЦА



Он-лайн радио, баннерная реклама



Аптечные сети

Стандартные контрактные условия

- 2-х недельный ТЗ
- Выкладка 3 SKU категории
- 100% присутствие во всех контрактных сетях SKU Грамминдин детский
- Централизованное обучение, ФК

Дополнительные активности

- Ценовые акции
- Дублирование выкладки в прикассовой зоне
- Товар дня

Трейд-маркетинговая активность 2016



Граммидин: конференции 2016



Конгресс
педиатров
октябрь

Актуальные вопросы
оториноларингологии (Медкон)

Актуальные вопросы
оториноларингологии
(Медкон)

Региональные мероприятия
компании Валента

Региональные мероприятия
компании Валента

Тьюторские лекции в
детских п-ках

Тьюторские лекции
в детских п-ках

Собственные образовательные мероприятия с педиатрами и
работниками аптек

Аптека



- Сохранение позиции №1 в рекомендациях
- Предупреждение переключений с Граммидина
- Создание условий для переключения на Граммидин

Граммидин® ЛЕГКО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- 30 секунд - начало действия при боли в горле!
- При боли, першении, сухости, боли при глотании^{1,2}
- Подходит детям с 4-х лет и беременным^{3,4}

Граммидин, Граммидин 30, Граммидин 60

В VALENTA Действительно лечит больное горло

Граммидин® ГРАМОТНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- Назначается терапевтами, ларингологами, оториноларингологами¹
- Действует на причину и симптомы болезни^{1,2}
- Входит в стандарты медицинской помощи при остром тонзиллите⁴

Граммидин, Граммидин 30, Граммидин 60

В VALENTA Действительно лечит больное горло

Граммидин® ЛЕГКО И ГРАМОТНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- 30 секунд - начало действия при боли в горле!
- Выгодно 1 упаковка на курс лечения
- Безопасно
- Комплексное лечение
- Надежно Назначается врачами и включен в стандарты медицинской помощи при остром тонзиллите¹

Граммидин, Граммидин 30, Граммидин 60

В VALENTA Действительно лечит больное горло

Максимальная отдача от каждой покрываемой аптеки!



- 1 Постоянный 2-х недельный запас
- 2 Выкладка 3 SKU общим блоком
- 3 100% дистрибуция в покрываемой базе
- 4 Качественный дитейлинг
- 5 Трейдмаркетинг нон-стоп

Портрет пациента



- ✓ Посетитель аптеки с жалобами на боль/першение/осиплость в горле, взрослый или ребенок с 4 лет

Ключевое сообщение



Граммидин.
Действительно лечит
больное горло

Фармкружок

Граммидин®

БОЛЬ В ГОРЛЕ: ЧТО НУЖНО ПАЦИЕНТУ?

- Реальное у
- Быстрое об
- Безопасное
- Хорошие ор
- боли в горл
- Удобный ре

БЫСТРОЕ ВО

Граммидин®

• ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С 4 ЛЕТ

- Действ
- Предот
- Быстро
- Благоп
- Хорош



Граммидин®

Препарат с уникальным составом
и механизмом действия

Грамицидин С
Местный антибиотик

Цетилпиридиния хлорид
Антисептик

Оксибупрокаин
Анестетик

Обладает широким
спектром действия,
разрушает мембрану
микробной клетки,



- ✓ Не вызывает антибио-
тикорезистентности
- ✓ Не обладает систем-

Граммидин®

ЛЕГКО И ГРАМОТНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

1

Безопасно

2

30 секунд
начало действия
при боли в горле

3

Выгодно
1 упаковка
на курс
лечения

4

Комплексное
лечение

вирусы
бактерии
грибы

5

Надежно

Назначается
врачами и включен в
стандарты медицинской
помощи при остром
тонзиллите!



Действительно лечит больное горло

Педиатр

- Формирование практики назначений
- Количественные цели на визите



Цель: рост назначений Граммидина педиатрами!

1

Представление выгод препарата Граммидин детский для врача, формирование практики назначений

2

Постановка цели назначений Граммидина не менее 10 в месяц на 1 посещаемого доктора

3

Переключение пациентов с препаратов-конкурентов (Лизобакта, Имудона, Фарингосепта) на Граммидин

Портрет пациента



- ✓ Пациент с инфекционно-воспалительной патологией горла в возрасте от 4 лет

Ключевое сообщение



Граммидин детский. Уникальный препарат для комплексной местной терапии заболеваний горла

ЛОР-врач

- Увеличение доли назначений
- Количественные цели на визите

Граммидин® УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

ЭФФЕКТИВЕН

- Активен в отношении большинства патогенов: бактерий, вирусов, грибов

Эффективность доказана исследованиями

БЕЗОПАСЕН

- Не вызывает резистенции
- Не всасывается из желудочно-кишечного тракта и не проникает в системный кровоток
- Не вызывает дисбиоза при длительном применении

Содержит грамицидин, цетилпиридиний, оксibuпрокаин

Граммидин® УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

Оказывает выраженный противомикробный эффект, хорошо проникает в биопленки

Ликвидирует боль, симптомы фарингеальной парестезии, нормализует фарингоскопическую картину

Входит в стандарты медицинской помощи при остром тонзиллите и перитонзиллярном абсцессе

Применяется у взрослых и детей с 4 лет

Граммидин® УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

Граммидин С циклодексапентидный антибиотик

Демонстрирует высокую эффективность в отношении респираторных патогенов

Микроорганизм	МПК (мкг/мл)	МПК ⁵⁰ (мкг/мл)	МПК ⁹⁰ (мкг/мл)	Средняя МПК
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1 – 2	1	1	0,93
<i>Streptococcus pyogenes</i> (Группа А)	0,25 – 1	0,25	1	0,31
<i>Staphylococcus aureus</i>	0,125 – 1	0,5	0,5	0,41
<i>Moraxella catarrhalis</i>	<0,008 – 0,25	0,125	0,25	0,1
<i>Haemophilus influenzae</i>	0,25 – 1	0,5	1	0,57

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Применяется у взрослых и детей с 4 лет

Граммидин® УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

Цетилпиридиний – антисептик

- Оказывает быстрый и выраженный противомикробный эффект, хорошо проникает в биопленки
- Остаточная антибактериальная активность после однократного применения сохраняется более 1,5 часов
- Сурфактант, способствует эффективному очищению слизистых
- Проникает во все отделы ротовой полости, обеспечивая её эффективную санацию
- Способствует синтезу цитокинов, что обеспечивает опосредованный местный противовирусный эффект

Оксибупрокаин – анестетик

- Быстрое наступление обезболивания (30 сек)
- Хорошо изучен, применяется более 40 лет
- Обладает низкой токсичностью
- Имеет собственный противомикробный эффект в отношении ряда микроорганизмов (синегнойная палочка, стафилококки, грибы рода Candida)

Применяется у взрослых и детей с 4 лет

Цель: рост назначений Граммидина на 1 посещаемого ЛОР-врача

1

Формирование базы хороших прескрайберов

2

Постановка цели назначений Граммидина не менее 8 в месяц на 1 посещаемого доктора

3

Переключение пациентов с препаратов-конкурентов (Лизобакта, Имудона) на Граммидин

Портрет пациента




- ✓ Пациент с инфекционно-воспалительной патологией горла (фарингит, тонзиллит, тонзиллофарингит)

Ключевое сообщение



Граммидин. Уникальный препарат для
комплексной местной терапии
воспалительных заболеваний горла

Конкурентный анализ



Особенности разных лекарственных форм

Форма	Плюсы	Минусы
Растворы 	☐ Тщательная обработка очага инфекции ☐ Дополнительное увлажнение слизистой	☐ Неудобство применения ☐ Небольшое количество доз во флаконе ☐ Относительно высокая стоимость ☐ Содержат концентрированный этанол
Спреи 	☐ Удобно применять ☐ Дополнительное увлажнение слизистой	☐ Обработка очага инфекции не так эффективна, как при рассасывании таблеток ☐ Относительно высокая стоимость ☐ Содержание специальных вспомогательных веществ
Леденцы 	☐ Привлекательный сладкий вкус ☐ Большой выбор ароматов ☐ Приятны в применении	☐ Часто содержат искусственные красители и ароматизаторы ☐ Травмируют слизистую оболочку острыми краями, образующимися при рассасывании
Таблетки 	☐ Комфортное применение ☐ Часто комбинированный состав	☐ Вкусовые качества не являются универсальными и нейтральными

СТРЕПСИЛС, ПРОФИЛЬ БРЕНДА



- ✓ №1 в руб/уп
- ✓ Рекитт Бенкизер (Великобритания)
- ✓ Состав: амилметакрезол, дихлорбензиловый спирт (классические SKU), флурбипрофен (Стрепсилс Интенсив)
- ✓ Ключевые SKU –мед-лимон №24, ментол-эвкалипт №24, с вит. С и Стрепсилс Интенсив №24 (56% продаж)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- ✓ Препарат «на любой вкус» для облегчения боли в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки

СЛОГАН

- ✓ Поручите Стрепсилс лечение боли в горле!

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Высокий уровень знания со стороны конечного потребителя
- ✓ Массивная медийная поддержка в периоды высокого сезона
- ✓ Широкая линейка (40 SKU) и значительные инвестиции в трейд-маркетинг для формирования большого «пятна» на полках аптек

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Большое количество SKU в линейке приводит к каннибализации
- ✓ Жесткая привязка ценообразования к валютному курсу

Стрепсилс



- ✓ Содержит в составе слабые антисептики
- ✓ Содержит в составе искусственные красители
- ✓ При применении травмирует небо и слизистую рта сколами
- ✓ Обезболивающий компонент содержит только Стрепсилс плюс (лидокаин)
- ✓ Детская форма по составу не отличается от «взрослой»
- ✓ У детей – таблетка может залипать на нёбе
- ✓ Стрепсилс Интенсив – нет антимикробного действия, ограничения по возрасту, много противопоказаний

Граммидин vs Стрепсилс

- ✓ Высокоэффективный универсальный препарат для этиопатогенетического лечения заболеваний горла
- ✓ Высокий профиль безопасности, отсутствие сахара, искусственных красителей и ароматизаторов: позволяют рекомендовать Граммидин детям с 4 лет
- ✓ Оксибупрокаин безопаснее лидокаина
- ✓ Более широкий спектр действия и надежное уничтожение причины заболевания
- ✓ Более высокая эффективность Граммидина в сравнении со Стрепсилсом клинически доказана

ФАРИНГОСЕПТ, ПРОФИЛЬ ПРОДУКТА



- ✓ №5 в руб, №3 в уп
- ✓ Ранбакси (Индия/Румыния)
- ✓ Состав: амбазон (антисептик)
- ✓ 4 SKU в линейке

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- ✓ Проверенный поколениями «семейный» препарат для лечения боли в горле, который борется с симптомами и действует на причину заболевания

СЛОГАН

- ✓ Фарингосепт заботится о вашем горле уже 25 лет

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Старый препарат, имеет стойкий пласт консервативных потребителей
- ✓ Рекламная поддержка на региональном ТВ
- ✓ Активно выписывается терапевтами и педиатрами (детям с 3 лет)
- ✓ Относительно низкая цена на полке (130-150 руб)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Отсутствие серьезной трейд-маркетинговой поддержки
- ✓ Отсутствие «медицинских» информационных поводов для продвижения у врачей

Фарингосепт



- ✓ Не содержит обезболивающего компонента
- ✓ Слабый антисептик
- ✓ Только бактериостатическое действие
- ✓ На курс нужно 2 упаковки
- ✓ После применения нельзя есть и пить 3 часа!

Граммидин vs Фарингосепт

- ✓ Полный курс лечения, предусмотренный в одной упаковке Граммидина, и удобная схема приема обеспечивают правильное и эффективное лечение
- ✓ Курсовая стоимость Граммидина сравнима с курсовой стоимостью Фарингосепта, а эффективность Граммидина значительно выше
- ✓ При сильной боли в горле можно рекомендовать Граммидин с анестетиком

ЛИЗОБАКТ, ПРОФИЛЬ ПРОДУКТА



- ✓ №3 в руб, № 4 в уп
- ✓ Босналек (Босния и Герцеговина)
- ✓ Состав: лизоцим + пиридоксин
- ✓ SKU, зарегистрированное в РФ – таблетки для рассасывания, 30 таблеток в упаковке

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- ✓ Естественный иммуномодулятор с антисептическим действием для лечения больного горла у взрослых, детей с 3 лет и беременных женщин

СЛОГАН

- ✓ Лизобакт. Лечит горло естественно!

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Серьезное медицинское продвижение с многолетней историей, №1 по выписке у педиатров и терапевтов, №2- у ЛОР-врачей в сегменте средств от боли в горле в таблетках
- ✓ Медийная поддержка, выход с новым креативом в начале 15 г.
- ✓ Высокий профиль безопасности, разрешен к применению у детей с 3 лет и беременных

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Слабая доказательная база по эффективности при боли в горле
- ✓ «Хаотичное» присутствие на ТВ
- ✓ «Хаотичная» ценовая политика

Лизобакт

- ✓ Изначально «стоматологический» препарат
- ✓ В показаниях отсутствуют ангины, фарингиты, тонзиллиты
- ✓ Не содержит обезболивающего компонента
- ✓ Длительный курс лечения препаратом – 8 дней
- ✓ На курс лечения нужно 2-3 упаковки
- ✓ Достаточно высокая цена



Граммидин vs Лизобакт

- ✓ Граммидин также имеет высокий профиль безопасности, подтвержденный в клинических исследованиях.
- ✓ По результатам сравнительного исследования Граммидина и Лизобакта, Граммидин не уступает Лизобакту по безопасности, и рекомендован к широкому клиническому применению у детей 4-9 лет.
- ✓ Согласно результатам клинических исследований, Граммидин быстрее Лизобакта справляется с болью в горле и обладает более выраженным saniрующим эффектом

ИМУДОН, ПРОФИЛЬ БРЕНДА



- ✓ №4 в руб, №6 в уп
- ✓ Эббот (США)
- ✓ Состав: лизаты бактерий
- ✓ 2 SKU в линейке (№24 и №40)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- ✓ Действует на бактерии, вирусы и грибы за счет активации местного иммунитета

СЛОГАН

- ✓ Имудон – трижды здоровое горло

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Рекламная поддержка на национальном ТВ
- ✓ Серьезное медицинское продвижение, активно выписывается терапевтами, педиатрами (детям с 3 лет) и ЛОР-врачами

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ Высокая цена на полке - 560 руб за №40, 405 руб за №24
- ✓ Исторически «стоматологический» препарат, нет серьезной доказательной базы как препарата при боли в горле

Имудон

- ✓ Не устраняет причины заболевания, не действует непосредственно на возбудителя
- ✓ В большей степени «стоматологический» препарат и средство для лечения хронических заболеваний полости рта и горла (в составе комплексной терапии)
- ✓ Частый прием препарата - 8 таб в сутки
- ✓ Продолжительность курса лечения – не менее 10 дней
- ✓ Высокая цена – как на полке, так и курса лечения



Граммидин vs Имудон

- ✓ Граммидин также имеет высокий профиль безопасности, подтвержденный в клинических исследованиях, разрешен детям с 4 лет
- ✓ Граммидин действует непосредственно на причину заболевания
- ✓ Курс лечения Граммидином – 1 упаковка

Гексорал табс и табс классик

Действующее вещество

- ✓ Гексорал табс - Хлоргексидин+бензокаин
- ✓ Гексорал табс классик -
Амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт

Сильные стороны

- ✓ Владелец РУ компания с мировым именем Джонсон&Джонсон
- ✓ Хорошая медийная поддержка, широкая линейка дает хорошее «пятно» на полке

Слабые стороны

- ✓ Гексорал табс обладает мощным антисептическим действием в отношении нормальной микрофлоры полости рта, что может привести к дисбиозу полости рта
- ✓ Хлоргексидин может вызывать потемнение зубов, образование зубного камня, стоматит, увеличение околоушных слюнных желез
- ✓ Бензокаин - может вызывать метгемоглобинемию
- ✓ Вызывает изменение вкусовой чувствительности
- ✓ Гексорал табс классик производится в Индии, лишь «ослабляет», но не лечит боль в горле



Граммидин vs Гексорал

- ✓ Граммидин также имеет широкий спектр действия, но при этом он тропен только к мембране патогенных и условно-патогенных возбудителей, и не оказывает негативного влияния на микрофлору полости рта и горла
- ✓ Граммидин содержит в своем составе более безопасные компоненты
- ✓ В линейке есть специальная детская форма
- ✓ Курс лечения – 1 упаковка

Септолете

Действующее вещество

- ✓ Цетилпиридиний (Септолете Нео)
- ✓ Цетилпиридиний+бензокаин (Септолете плюс)
- ✓ Цетилпиридиний + бензидамин (Септолете Тотал)

Лекарственная форма

- ✓ Пастилки

Сильные стороны

- ✓ Производитель – европейская компания
- ✓ Активная работа МП в аптеках
- ✓ Широкая линейка вкусов, хорошее пятно на полке

Слабые стороны

- ✓ Частый прием препарата (8 таблеток в день), упаковки хватает на 3 дня приема
- ✓ Бензокаин - может вызывать метгемоглобинемию
- ✓ Монокомпонентный состав у Септолете Нео
- ✓ Малтитол и маннитол, входящие в состав, могут вызвать диарею при превышении рекомендованных доз, особенно у детей
- ✓ Септолете Тотал – с 18 лет



Аджисепт

Действующее вещество

- ✓ Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт

Лекарственная форма

- ✓ Таблетки

Сильные стороны

- ✓ Состав аналогичен Стрепсилсу вплоть до дозировки

Слабые стороны

- ✓ Содержит в составе слабые антисептики
- ✓ Частый прием препарата (8 таблеток в день)
- ✓ Упаковки хватает на 2-3 дня приема
- ✓ Не содержит обезболивающего компонента
- ✓ Производится в Индии



Анти-ангин формула

Действующее вещество

- ✓ Хлоргексидин + Тетракаин+ вит С

Лекарственная форма:

- ✓ Таблетки, пастилки

Сильные стороны

- ✓ Европейский производитель

Слабые стороны

- ✓ Упаковки хватает на 2 -3 дня приема
- ✓ Содержит в составе искусственные красители
- ✓ При применении травмирует небо и слизистую рта сколами (пастилки)
- ✓ Содержит хлоргексидин, применение которого сопряжено с множеством рисков
- ✓ Возраст приема – с 5 лет
- ✓ Интенсивное потребление вызывает повреждение зубной эмали



Фалиминт

Действующее вещество

- ✓ Ацетиламинонитропропоксибензол
(антисептик)

Лекарственная форма:

- ✓ Драже

Сильные стороны:

- ✓ Производитель – европейская компания
- ✓ Старый, «раскрученный» бренд

Слабые стороны:

- ✓ Монокомпонентный состав – слабый антисептик
- ✓ Основное действие – противокашлевое
- ✓ Частый прием препарата (10 таблеток в день)
- ✓ Упаковки хватает на 2 дня



Стопангин 2А

Действующее вещество

- ✓ Тиротрицин + Бензокаин

Лекарственная форма

- ✓ Таблетки

Сильные стороны:

- ✓ Прямое антибактериальное действие (тиротрицин состоит из смеси грамицидинов)

Слабые стороны

- ✓ Не содержит антисептика, не обладает противовирусным и фунгицидным действиями
- ✓ В тиротрицине содержится 30% активного Грамицидина, но дозировки 3-4мг грамицидина в сутки недостаточно
- ✓ Возраст применения - с 18 лет, запрет на применение при планировании беременности пациентам обоего пола
- ✓ Тиротрицин обладает повышенной токсичностью в сравнении с Грамицидином С
- ✓ Бензокаин –риск метгемоглобинемии



Грамицидин С

Действующее вещество

- ✓ Грамицидин С 1,5мг

Лекарственная форма

- ✓ Таблетки

Сильные стороны

- ✓ Прямое антибактериальное действие
- ✓ Относительно низкая цена

Слабые стороны

- ✓ Не содержит антисептика, не обеспечивает фунгицидное и антисептическое действие
- ✓ Не содержит анестетика
- ✓ Неприятный вкус
- ✓ Прием до 8 таблеток в сутки, на курс лечения необходимо 2 упаковки



Тантум Верде

Действующее вещество

- ✓ бензидамин (НПВС)

Лекарственная форма

- ✓ Аэрозоль, раствор для полоскания, таблетки

Сильные стороны

- ✓ Массивная рекламная поддержка (ТВ, пресса, радио)
- ✓ обладает обезболивающим, антимикробным и противогрибковым действием
- ✓ Врачебная выписка
- ✓ Низкий детский возраст (таблетки с 3 лет) и применение при беременности

Слабые стороны

- ✓ Неприятный вкус препарата
- ✓ Вызывает длительное онемение слизистой
- ✓ Достаточно высокая цена препарата (около 400 руб на полке)



Возражения

Содержит антибиотик – рекомендую только при сильной боли

- ✓ Грамицидин С – антибиотик, действующий только местно в полости рта и горла, практически не всасывается в ЖКТ и не обладает системным побочным действием.
- ✓ Высокий профиль безопасности Граммидина доказан клиническими исследованиями, в том числе проведенными среди детей 4-9 лет.
- ✓ Есть детская форма препарата

Содержит антибиотик – есть риск развития резистентности

- ✓ Грамицидин – антибиотик местного действия, который успешно используется в медицине с 1943 года. За это время не было зафиксировано развития к нему резистентности.
- ✓ Граммидин не вызывает привыкания также за счет низких суточных дозировок и короткого курса приема.

Содержит антибиотик - вызывает кандидоз полости рта

- ✓ Цетилпиридиния хлорид, входящий в состав всех лекарственных форм Граммидина, предотвращает развитие кандидоза за счет фунгицидного действия

Не помогает

Возможно, есть причины неэффективной терапии:

- ✓ Лечение заболевания, требующего также применения системной антибиотикотерапии (например, БГСА-инфекция)
- ✓ Лечение хронического тонзиллита
- ✓ Несоблюдение курса приема (время от времени или в течение 2х дней)
- ✓ Прием пищи и жидкости сразу после рассасывания таблетки

FAB

Провизор

Свойство: Уникальный состав и механизм действия, синергично действующие компоненты, быстрота развития эффекта...

Преимущество: обеспечивают быстрое избавление от симптомов и причины заболевания...

Выгода: провизор может быть уверен в грамотном выборе, и рекомендовать Граммидин, не задумываясь

Провизор

Свойство: Быстрый и надежный результат лечения, короткий курс приема, средняя цена...

Преимущество: дают возможность пациенту купить 1 упаковку по справедливой стоимости, а первостольнику – продать не самый дешевый препарат ...

Выгода: что делает Граммидин выгодным для пациента и аптеки

Педиатр

Свойство: Благодаря уникальной комбинации грамицидина С и цетилпиридиния, компоненты которой работают синергично...

Преимущество: Граммидин обладает комплексным эффектом при инфекционно-воспалительных заболеваниях горла...

Выгода: что позволяет назначать терапию эмпирически

Педиатр

Свойство: Благодаря уникальной комбинации грамицидина С и цетилпиридиния и специально разработанной ЛФ...

Преимущество: Граммидин детский отвечает всем требованиям к топическим антимикробным препаратам для детей...

Выгода: что позволяет назначать терапию эмпирически с уверенностью в эффективности и безопасности препарата.

Лор

Свойство: Граммидин имеет уникальный состав

(антибиотик+антисептик+анестетик)...

Преимущество: компоненты которого действуют синергично на причину и симптомы заболевания...

Выгода: что позволяет назначать топическую терапию эмпирически

ЛОР

Свойство: Благодаря особому строению молекулы (циклодекапептидный антибиотик) компонент Граммидина- грамицидин С проявляет высокую активность в отношении респираторных патогенов без развития резистентности...

Преимущество: Граммидин отличается высокой эффективностью и безопасностью...

Выгода: что позволяет назначать терапию эмпирически с низким риском рецидивов и развития осложнений

ЛОР

Свойство: Цетилпиридиний – это антисептик с комплексным действием (бактерии, вирусы, грибы) со свойствами сурфактанта

Преимущество: поэтому он хорошо проникает во все отделы ротовой полости и горла, обеспечивая эффективную санацию слизистой оболочки...

Выгода: что дает уверенность в эффективности лечения

ЛОР

Свойство: Благодаря фармакокинетическим и фармакодинамическим свойствам компонентов Граммидина...

Преимущество: действующие вещества не всасываются в системный кровоток, а работают в очаге инфекции и воспаления, не вызывают резистентности, дисбиоза полости рта даже при длительном применении...

Выгода: что позволяет назначать его с уверенностью в безопасности среди разных возрастных групп

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!