

III. Игровая PS

Тема: Игровая модель и ее структура
Игра: наемная работа и ее структура

Игровая модель

1-3	13-2	25-1	37-2
2-1	14-1	26-1	38-1
3-4	15-4	27-1	39-2
4-2	16-1	28-1	40-1
5-4	17-4	29-1	41-3
6-1	18-2	30-1	42-1
7-1	19-4	31-1	43-3
8-4	20-1	32-2	44-2
9-3	21-2	33-2	45-1
10-3	22-2	34-3	
11-1	23-2	35-4	
12-2	24-2	36-3	

Задача

Задача 1

1) $1000000 \text{ ED} = 10 \text{ км}$ расстояние

2) $500000 \text{ ED} = 5 \text{ км}$ расстояние

3) $0,5 \cdot 1000000 \text{ ED} = 500000 \text{ ED} = 5 \text{ км}$ расстояние

4) $0,25 \cdot 1000000 \text{ ED} = 250000 \text{ ED} = 2,5 \text{ км}$ расстояние

Решение
$$x = \frac{1000000 \text{ ED} \cdot 1 \text{ км}}{100000 \text{ ED}} = 10 \text{ км}$$

Задача 2

1) $100000 \text{ ED} = 1 \text{ км}$

2) $1000000 \text{ ED} - 100000 \text{ ED} = 900000 \text{ ED}$

3) $900000 \text{ ED} = 9 \text{ км}$

Задача 3

1) $250000 \text{ ED} = 2,5 \text{ км}$

2) $1000000 \text{ ED} - 250000 \text{ ED} = 750000 \text{ ED}$

3) $750000 \text{ ED} = 7,5 \text{ км}$

Задача 4

$$1) \text{интенсивность} = 1,6 \text{ мм}$$

$$2) \text{интенсивность} = 1,2 \text{ мм}$$

$$3) 0,5 - 0,2 - 0,15 = 0,15 \text{ мм}$$

$$4) 4 \text{ мм} - 1,2 \text{ мм} - 1,6 \text{ мм} = 1,2 \text{ мм}$$

Задача 5

$$I_k = 1000.000 \text{ ED}$$

$$X_k = 160.000 \text{ ED}$$

$$x = 160.000 \text{ ED} / 1000.000 = 0,16 \text{ мм}$$

Вопрос: если есть 10 мм 4% интенсивности в этих 10 мм сколько интенсивность будет?

$$x = \frac{4\% \cdot 10 \text{ мм}}{100\%} = 0,4 \text{ мм}$$

$$10 \text{ мм} (4\% \text{ интенсивность}) = 0,4 \text{ мм}$$

$$1 \text{ мм} (4\% \text{ интенсивность}) = 0,04 \text{ мм}$$

$$(0,4 \text{ мм} \cdot 1 \text{ мм} / 10 \text{ мм} = 0,04 \text{ мм})$$

$$1 \text{ мм} (4\% \text{ интенсивность}) = 0,04 \text{ мм}$$

$$x \text{ мм} (4\% \text{ интенсивность}) = 0,16 \text{ мм}$$

$$x = \frac{0,16 \text{ мм} \cdot 1 \text{ мм}}{0,04 \text{ мм}} = 4 \text{ мм}$$

$$1 \text{ интенсивность} = 2 \text{ мм}$$

$$x \text{ интенсивность} = 4 \text{ мм}$$

$$x = 4 / 2 = 2 \text{ интенсивность}$$

Ответ: интенсивность в центре криво
наблюдать 4 мм расстояния интенсивность
(2 интенсивность)

Задача 6

$$1 \text{ мм} = 40 \text{ ED интенсивность}$$

$$8 \text{ ED} = 0,2 \text{ мм}$$

$$32 \text{ ED} = 0,8 \text{ мм}$$

$$12 \text{ ED} = 0,3 \text{ мм}$$

$$36 \text{ ED} = 0,9 \text{ мм}$$

$$16 \text{ ED} = 0,4 \text{ мм}$$

$$40 \text{ ED} = 1 \text{ мм}$$

$$20 \text{ ED} = 0,5 \text{ мм}$$

$$24 \text{ ED} = 0,6 \text{ мм}$$

$$28 \text{ ED} = 0,7 \text{ мм}$$

Матрица-квант:

1. использование шприца для введения инсулина (5)
2. использование инсулиновой ручки. (4)

- собрать концы в склярку оставшимися нитями
- Ввести нить ширину - 7 нити под углом 45° функцией доушивания каната на широкую канту
- Ввести нить в подково-микровую кисточку.

4. функции процедуры:

- концы нити нитью нитью в подково-микровую кисточку не менее 6 секунд, а затем удерживать
- Нитью угла функцией стержневой машинкой
- подшить доушивания разорванной материи
- снять нити, положить и величину для доушивания
- обрезать лишние нити, а также
- сделать запись о результатах выполнения в медицинскую документацию

II использование нити для введения нити

1. подготовка к процедуре

- проверить и маркировать пациента, проверить антисептику, положить пациента на процедурный стол
- провести антисептическую обработку рук, надеть маску, перчатки
- приготовить стерильный лоток со стерильными ватными шариками и стерильными пинцетом. Сложить ватные шарики спиртоподдерживающей антисептикой, приготовить стерильный лоток кисточку, положить его в стерильный лоток
- приготовить скарификатор пинцет
- обработать и ввести крючок скарификатора, прижать нитью нитью. Проткнуть нитью нитью ватными шариками со спиртом, обработать, отложить скарификатор в сторону, дать высушить нитью. Надеть вилку, обработать доушивания в ЕД и скарификатор и доушивания нитью 1-2 ЕД нитью, и в пинцетной нитью. Вести нить для нитью, вытеснить воздух (не сильная кантовка)

2. выполнение процедуры

- проверить пациента, чтобы пациент правильно функционировал
- обработать нити спиртоподдерживающей антисептикой

→ нанести водной мазью пациенту на 10 см выше
локтевого сгиба. Информировать пациента 5-6 раз о состоянии
кулака, ранах и др. (кулаки).

→ прональцировать кисти локтевого сгиба и держать
наиболее комфортно

→ держать руки, обр. перчатки антистатиком

→ обр. бинтом марками или снур. сшитой швы-
щипок под давлением снуровидный (15x15) x2.

→ бинтовать пациенту левую руку на уровне локтя
или ниже вены на 2-3 см.

→ проверить состояние стенок вены, пока не появится
сильное напряжение

→ убедиться, что шва вены

→ ослабить швы, открутить локоть, проверить
уверены, что шва в вены и некачать не могут
подойти под кожу.

→ зафиксировать систему лейкопластырем и отрегулировать
скорость помпы вены и др.

→ в течение процедуры следить за самочувствием
пациента

→ после завершения процедуры закрыть локоть, убрать
левокардиальную вентиль, проверить
ватный марок и убрать швы.

→ после пациенту согнуть руку в локтевом суставе
на 3-5 минут.

3. Завершение процедуры

→ или одноразовое использование в кисти "Б"
информировать в вены для фиксации.

→ снять перчатки, очки, маску в кисти "Б"

→ провести тщательную обработку

→ сдать данные о состоянии процедуры

4. Техника 06.

Техника 06. Задача медицинской сестры в лабораториях
и интервенционных центрах
интервенции

Алгоритм выполнения внутривенной инфузии.

1. подготовка к процедуре

- проверить пациента и проморожен
- проверить аннотацию
- проверить сроки

2. Вспомогательные процедуры.

- прижать папирусную удочку поочередно
- перепальчиковать шило язычком
- обработать ватным маршом шило -
уложить под инкубатор 15x15 см)
длинными сверху вниз.
- обработать душки ват. мар. шило
язычком (перемешать кожа волокна)
- левой рукой охватывать концы шила
материалом, охватить предмете
сверху.
- правой рукой ввести шило (средней
манерой вверх) над шилом 5 мм
поверхности своей концы, только средней

каким образом

- шнелка приподнимать кверху срез шнел, левую руку перевернуть на, поворачивать и вставить шнелю указатель
- на месте шнелки образуется папушка в виде шишечки
- ватной губкой правой руки вставить шнел

3. зашивание процедуры

- шнел. однофазное в квант "Б"
- шнел. многофазное - дешифриция
- снять шнелку, перчатки в квант "Б"
- обработать руки
- сделать записи о выполнении процедуры

Алгоритм выполнения процедуры шнелки

1. подготовка к процедуре

- все в порядке

2. выполнение процедуры

- прижать пациенту удобное положение
- прональзовать место шнелки

Анализ выполнения функциональной
механики.

1. подготовка к процедуре

- принять прощ. пациента

- во время анестезии

- погрузить саму

- пров. ли. обработку рук, маска и
перчатки

- приоткрыть необходимое оборудование.
- приоткрыть указательный палец
- ватным шариком обработать палец с.с. Вскрыть палец, обработать с.с. в подготовленной шпигу.
- сделать шпигу для швырнуть впитывать воздух (несильно, копаясь)

2. Вторичные процедуры

- прижать пациенту удобное положение
 - пропальпировать место швырнуть
 - обработать ват. шар. ш. палец сверху шпигу.
 - обработать др. ват. шар.
 - др. шпигу в правой руке (через шпигу в шпигу) под углом 90° к поверхности кожи. Ввести шпигу осторожно в шпигу, глубоко на 2/3 длины шпигу.
 - ввести шпигу с.с.
 - прижать - в шпигу швырнуть ватный шарик, ватный шарик швырнуть шпигу
- ## 3. Завершение процедуры (с.с. шпигу)

Антибиотики введенные и назначенные амбулаторно

1. poramotška k rjazušču

- [illegible]

- Шендерович пришел к Шендеровичу
на вечернюю встречу

-поднять флажок Вверху грона и
наблюдать соружинию или его часть
Внизу слова или восточную
воздух и шума не слышал коина
с себя южной шуму походить
В степ. латах.

2. Вспомогательные процедуры

Cell. Bone.

3. Завершение процедуры

cell phone

дифференцирует знания и умения
по уровню сложности при выполнении
задания. Цель деятельности
Анализатор ~~вспомогательной~~ ~~внутренней~~ ~~мышечной~~

1. подготовка к процедуре.

- см. выше алгоритм выполнения
внутренней мышечной

2. выполнение процедуры.

- удобно усадить или уложить пациента

- наложить кинематическую повязку под
локоть

- наложить внешний шнур на все
выше локтевого сустава

- попросить пациента 5-6 раз сжать и
разжать кулак пальцы остаются
сжатыми.

- прональнувать выше локтевого
сустава

- сделать отжим

- отжать шарик или палец $(15 \times 15) \times 2$

- выполнить пальцами правой руки
массажную работу всей рукой
вдоль всей поверхности на 2-3 см

- провести интубацию бронхов
- поместить пациента на седло в кресло. Давление покрывала
- раздвинуть ноги, легкая интубация
- не менее 10 минут интубации, немедленно вызвать врача
- проводить катетеризацию с помощью шприца, вводить раствор в моче-выводящий канал, проводить катетеризацию с помощью шприца, вводить раствор в моче-выводящий канал
- (можно использовать раствор для интубации)
- в. Завершение процедуры
- см. выше.