Почему хирурги-эндокринологи недовольны радиологами: результаты до- и послеоперационного УЗИ

Часть 1

Выполнила: ординатор 1 года обучения
специальности УЗД
Вторушина Екатерина
Викторовна

Актуальность

- Дифференцированный рак щитовидной железы (ДРЩЖ) – 90% всех видов РЩЖ;
- Наиболее часто встречающаяся форма ДРЩЖ – папиллярный рак;
- Метастатическое поражение лимфатических узлов – встречается у 30-80% пациентов с ДРЩЖ (в зависимости от метода диагностики) и является фактором риска рецидивов РЩЖ;
- Большая часть рецидивов происходит в течении первых 5 лет после операции;

Актуальность

- Физикальное обследование – низкая чувствительность при обнаружении небольших л/узлов;
- УЗИ – наиболее чувствительный метод обнаружения метастатических л/узлов и рекомендовано American Thyroid Association (ATA) и National Comprehensive Cancer Network (NCCN), как стандартный предоперационный метод диагностики;

Актуальность

- Ультразвуковое исследование щитовидной железы (ЩЖ) на до- и послеоперационном этапе выполняется врачами-радиологами;
- Однако наблюдается растущая тенденция отказа от проведения УЗИ врачом-радиологом в пользу проведения УЗИ хирургом-эндокринологом;

Актуальность

- Оптимальное лечение рака щитовидной железы в значительной степени зависит от точной диагностики стадии рака щитовидной железы на момент обращения пациентов в медицинское учреждение;
- Диагностические ошибки предоперационного УЗИ приводят к нерадикальности хирургического лечения, высокой частоте рецидивов и прогрессированию рака щитовидной железы;

Цель

- Оценить диагностическую значимость предоперационного ультразвукового исследования у пациентов с раком щитовидной железы

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень IA

Границы:

Верхняя – нижняя челюсть;

Нижняя – подъязычная кость;

Передне-медиальная – переднее брюшко двубрюшной мышцы;

Заднебоковая – переднее брюшко двубрюшной мышцы

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень IV

Границы:

Верхняя – нижняя челюсть;

Нижняя – подъязычная кость;

Передне-медиальная – переднее брюшко двубрюшной мышцы;

Заднебоковая – шилоподъязычная мышца

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень IIA

Границы:

Верхняя – основание черепа;

Нижняя – горизонтальная линия, проведенная вдоль нижнего края тела подъязычной кости;

Передне-медиальная – шилоподъязычная мышца;

Заднебоковая – добавочный нерв

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень IIB

Границы:

Верхняя – основание черепа;

Нижняя – горизонтальная линия, проведенная вдоль нижнего края тела подъязычной кости;

Передне-медиальная – добавочный нерв;

Заднебоковая – задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сенсорные ветви шейного сплетения

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень III

Границы:

Верхняя – горизонтальная линия, проведенная вдоль нижнего края тела подъязычной кости;

Нижняя – горизонтальная линия, проведенная вдоль нижнего края перстневидного хряща;

Передне-медиальная – передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы;

Заднебоковая – задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сенсорные ветви шейного сплетения

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень IV

Границы:

Верхняя – горизонтальная линия, проведенная вдоль нижнего края перстневидного хряща;

Нижняя – ключица;

Передне-медиальная – передний край грудиноподъязычной мышцы;

Заднебоковая – задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сенсорные ветви шейного сплетения

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень VA

Границы:

Верхняя – угол в месте пересечения грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц;

Заднебоковая – трапециевидная мышца;

Нижняя – горизонтальная линия, проведенная на уровне нижнего края перстневидного хряща;

Передне-медиальная – задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сенсорные ветви шейного сплетения

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень VB

Границы:

Верхняя –
горизонтальная линия,
проведенная на уровне
нижнего края
перстневидного хряща;

Заднебоковая –
трапецевидная мышца;

Передне-медиальная – задний край грудино-ключично-сосцевидной
мышцы, сенсорные ветви шейного сплетения;

Нижняя – ключица;

Уровни лимфатических узлов шеи

Уровень VI

Границы:

Верхняя –
подъязычная кость;

Заднебоковая –
общая сонная
артерия;

Передне-медиальная – общая сонная артерия;

Нижняя – яремная вырезка грудины

Границы:

Верхняя –
подъязычная кость;

**Заднебоковая и
Передне-
медиальная** – общая
сонная артерия;

Нижняя – яремная
вырезка грудины

Метастатическое поражение
лимфатических узлов чаще на VI уровне

Виды оперативных вмешательств при заболеваниях щитовидной железы

Субтотальная резекция щитовидной железы	Удаление почти всей щитовидной железы с оставлением небольшого участка ее ткани у одного из верхних полюсов или у трахеи	При опухоли размером >4 см или при опухоли с выраженной экстратиреоидной инвазией, клинически выраженными метастазами или отдаленными метастазами, при наличии в анамнезе облучения головы и шеи и/или имеется семейный анамнез РЦЖ
Полная тиреоидэктомия	Удаление всей щитовидной железы	

Виды оперативных вмешательств при заболеваниях щитовидной железы

Лобэктомия*	Хирургическое удаление одной доли щитовидной железы	При опухоли размером <1 см Без экстратиреоидной инвазии (определяемой клинически или по данным УЗИ) и/или метастатических лимфатических узлов
Гемитиреоидэктомия	Хирургическое удаление одной доли щитовидной железы с перешейком	

* С 2015 г. в обновленных рекомендациях АТА - лобэктомия также может рассматриваться у пациента с опухолью размером от 1 до 4 см без экстратиреоидной инвазии и/или метастатических лимфатических узлов

Лимфодиссекция (иссечение л/узлов):

- **Радикальная шейная лимфодиссекция:** стандартная классическая операция, направленная на удаление лимфатических узлов шеи на уровне I-V от основания черепа до уровня ключицы*;

* Для обеспечения должной радикальности операции одновременно иссекают также грудино-ключично-сосцевидную мышцу, резецируют внутреннюю яремную вену, добавочный нерв и поднижнечелюстную железу

- **Расширенная радикальная шейная лимфодиссекция:** в дополнение к описанной выше операции удаляют также лимфатические узлы VI уровня и нелимфоидные образования, такие как сонная артерия, подъязычный и блуждающий нервы;

Лимфодиссекция (иссечение л/узлов):

- **Модификационная радикальная шейная лимфодиссекция:** удаление лимфатических узлов I-V уровней с сохранением одного или более нелимфоидного образования, в частности добавочного нерва и внутренней яремной вен;
- **Селективная шейная лимфодиссекция:** сохраняют регионарные лимфатические узлы одного или более уровня и нелимфоидные образования.

Например, селективная шейная лимфодиссекция (VI)

Ультразвуковая диагностика щитовидной железы

- Рекомендуется выполнять УЗИ щитовидной железы и шейных л/узлов высокочастотным линейным датчиком (предпочтительнее 12-15 МГц);
- Иногда (при больших размерах железы) можно использовать более низкую частоту линейного датчика (от 5 МГц) или конвексный датчик;
- Стандартным является положение лежа на спине с подложенным под плечевой пояс валиком и выгнутой шеей;

Ультразвуковая диагностика щитовидной железы

- Обе доли и перешеек ЩЖ исследуют в продольном и поперечном сечениях, измеряя размеры и оценивая структуру;
- Центральные лимфатические узлы (уровень VI) визуализируются от подъязычной кости и до яремной вырезки;
- Регионарные лимфатические узлы (уровни II-V) – от угла нижней челюсти до ключицы, следуя вдоль сосудисто-нервного пучка;

Предоперационное УЗИ шеи

!!! У всех пациентов (как с уже известным, так и с предполагаемым диагнозом – РЩЖ) – при проведении предоперационного ультразвукового исследования необходимо оценить не только щитовидную железу, но и шейные лимфатические узлы:

Диагностические ошибки предоперационного УЗИ приводят к нерадикальности хирургического лечения, высокой частоте рецидива и прогрессированию рака щитовидной железы

Рекомендации для проведения ТАБ

	SRU 2005 (см)	ATA 2015 (см)	Риск малигнизации (%) (ATA 2015)
Узел с микрокальцинатами	≥1,0	≥1,0	> 70-90
Солидный узел			
Гипоэхогенный с подозрительными признаками	≥1,5	≥1,0	> 70-90
Гипоэхогенный без подозрительных признаков	≥1,5	≥1,0	10-20
Изо- или гиперэхогенный	≥1,5	≥1,5	5-10
Кистозно-солидный узел			
Подозрительные признаки солидного компонента	≥2,0	≥1,0	> 70-90
Без подозрительных признаков	≥2,0	≥1,5	5-10
Губчатый узел без подозрительных признаков	...	≥2,0	< 3

Диагностическая значимость УЗ-признаков злокачественности узлов в ЩЖ

По данным систематического обзора и метаанализа:

	Чувствительность (Se), %	Специфичность (Sp), %
Микрокальцинаты	89	95
Гипоэхогенный узел	73	56
«Выше/чем/шире»	53	93
Солидный узел	87	56
Инфильтрация окружающих тканей	59	79

Ультразвуковое исследование щитовидной железы – папиллярный рак

Женщина, 42 года. В левой доле ЩЖ визуализируется гипоэхогенный узел с микрокальцинатами и преобладанием переднезаднего размера узла над шириной

ТАБ: папиллярный рак щитовидной железы

Ультразвуковое исследование щитовидной железы – папиллярный рак

Женщина, 31 год. В правой доле ЩЖ визуализируется изоэхогенный солидный узел с микрокальцинатами;

Размеры узла – 3 см;

ЦДК: пери- и интранодулярная васкуляризация;

ТАБ: папиллярный рак щитовидной железы

Выводы

Врачи-УЗД играют важную роль в предоперационной диагностике ДРЦЖ, поскольку точная диагностика стадии и степени распространения рака очень важна при планировании оптимального объема оперативного вмешательства

Список использованных источников

1. Kumbhar SS, O'Malley RB, Robinson TJ, et al. Why thyroid surgeons are frustrated with radiologists: lessons learned from pre- and postoperative US. Radiographics 2016; 36:2141–53.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!