

1. Эффективность первого этапа диспансеризации на педиатрическом участке можно оценить по
 - о снижению детской смертности
 - о снижению острой заболеваемости
 - о отсутствию отрицательной динамики по группам здоровья
 - о числу детей, отнесенных к первой группе здоровья
2. Для прогнозирования нарушений темпов развития и закладки тканей и органов плода критическими считаются сроки беременности
 - о 8-12 недель
 - о 14-16 недель
 - о 20-25 недель
 - о 28-32 недели
3. Возраст, для которого характерна в норме частота пульса 135-140 ударов в минуту
 - о новорожденный
 - о 1 год
 - о 2 года
 - о 5 лет
4. Критерий, который является ведущим для отнесения ребенка к III группе здоровья
 - о уровень резистентности
 - о уровень физического и нервно-психического развития
 - о уровень функций и поведение
 - о наличие или отсутствие хронических заболеваний
5. В каких случаях в гимнастический комплекс для здоровых детей раннего возраста можно включать упражнение "приседание из положения стоя"
 - о по достижении 10 месяцев
 - о умение сидеть на корточках
 - о уравновешенный тонус сгибателей и разгибателей
 - о самостоятельная ходьба
6. Ранняя неонатальная смертность от перинатальной смертности составляет
 - о 30%
 - о 40%
 - о 50%
 - о 60%
 - о 70%
7. О развитии ребенка 3 месяцев нельзя сделать заключение по
 - о развитию зрительных ориентировочных реакций
 - о развитию эмоционально-положительных реакций
 - о развитию общих движений
 - о развитию движений рук (умение брать игрушку)
8. Наиболее желательный прирост пульса в основной части урока по физической культуре по отношению к его исходной величине для детей основной медицинской группы
 - о свыше 100%
 - о 80-100%
 - о 50-80%
 - о 30-50%
9. При соответствующих воздействиях дефицит массы тела у ребенка с гипотрофией II степени может восстановиться
 - о через 2 месяца
 - о через 5-6 месяцев
 - о через 8 месяцев
- о через 12 месяцев
10. Трава, относящаяся к горечам
 - о мать-и-мачеха
 - о пустырник
 - о мята
 - о зверобой
11. Показатель, говорящий о завершении адаптации ребенка к детскому учреждению
 - о нормализация сна
 - о нормализация аппетита
 - о общение со взрослыми
 - о общение с детьми
12. Интервалы между кормлениями и частота кормления зависят
 - о от смены процессов торможения и возбуждения пищевого центра
 - о беспокойства ребенка
 - о продолжительности нахождения пищи в желудке
 - о объема желудка
13. Жир женского молока в отличие от жира коровьего молока не содержит
 - о полиненасыщенных жирных кислот в 1.5-2 раза больше
 - о большого количества низких насыщенных жирных кислот
 - о большой концентрации простагландинов, фосфатов
 - о липазы
14. Суточный объем пищи для детей с 10-го по 29-й день жизни составляет
 - о 1/4 от массы тела
 - о 1/5 от массы тела
 - о 1/6 от массы тела
 - о 1/7 от массы тела
15. Суточная потребность в белке у детей 1-4 месяцев жизни при смешанном вскармливании составляет
 - о 2-2,5 г/кг
 - о 3-3,5 г/кг
 - о 3,5-4,0 г/кг
 - о до 2,4 г/кг
16. Пюре фруктовое рекомендуется вводить в питание ребенка с
 - о 1,5-2 месяца
 - о 4 месяцев
 - о 3-3,5 месяцев
 - о 3 месяцев
17. Прикорм вводится на неадаптированных смесях
 - о в сроки по видам прикорма с использованием неадаптированных смесей
 - о раньше на 2-3 недели при смешанном и искусственном вскармливании
 - о позже на 2-3 недели при смешанном и искусственном вскармливании
 - о раньше на 2 месяца при смешанном и искусственном вскармливании
18. Нецелесообразно готовить кашу ребенку 5 месяцев
 - о на половинном молоке
 - о на цельном молоке
 - о на овощном отваре пополам с молоком
 - о на 2/3 разведения молока
19. К основным принципам режима питания у детей не относится
 - о прием пищи по желанию ребенка
 - о прием пищи в течение суток с определенными интервалами и кратностью

- о учет энергозатрат организма
- о чередование продуктов
- 20. К алиментарной белковой недостаточности и избыточности углеводов не приводит
 - о нерациональное использование белка в энергетических целях
 - о плохое усвоение пищевых веществ
 - о задержка в организме жидкости
 - о недостаточное и избыточное содержание в рационе продуктов - носителей углеводов
- 21. Сахарная ценность пищевого рациона состоит
 - о из углеводов + 25% белка
 - о из углеводов + 50% белка
 - о из углеводов + 25% жира
 - о из углеводов + 50% жира
- 22. Для синдрома Шершевского - Тернера не характерно
 - о мужской кариотип по данным анализа на хроматин
 - о аменорея
 - о высокий рост
 - о пороки развития сердечно-сосудистой системы
 - о крыловидная складка шеи
- 23. Иммунологический ответ после антигенной стимуляции формируется
 - о через 49-96 ч
 - о через 2 суток
 - о на 5-7-й день
 - о через 14 дней
- 24. Для псевдоаллергической реакции характерно
 - о высокая концентрация иммуноглобулина Е в крови
 - о повышенное содержание гистамина в крови и в моче
 - о эозинофилия
 - о ложноположительные кожные аллергоподобные
- 25. Выраженным либераторным эффектом не обладает
 - о клубника
 - о молоко
 - о шоколад
 - о яйца
- 26. Из всех форм бронхиальной астмы реже встречается у детей
 - о атопическая
 - о инфекционно-аллергическая
 - о астма напряжения
 - о аспириновая астма
- 27. Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране
 - о уровень рождаемости
 - о уровень смертности
 - о количество врачей на душу населения
 - о младенческая смертность
- 28. Особенности слюнных желез к моменту рождения
 - о морфологически сформированы, но секреторная функция низкая
 - о морфологически и функционально незрелые
 - о морфологически и функционально зрелые
 - о морфологически не сформированы и секреторная достаточно развита
 - о обильное слюноотечение
- 29. наиболее опасно заболевание женщины краснухой на
 - о на 1-м месяце беременности
 - о на 4-м месяце беременности
- о на 8-м месяце беременности
- о на любом сроке беременности
- 30. У женщин с диабетом беременных чаще всего рождаются дети
 - о с внутриутробной гипотрофией
 - о с макросомией
 - о маленькие к сроку
 - о все ответы правильные
- 31. В условиях внутриутробной гипоксии кровотоков через аранциев проток у плода
 - о не меняется
 - о прекращается
 - о увеличивается
 - о уменьшается
- 32. Полностью эпителизируется пупочная ранка в норме
 - о к концу 1-й недели жизни
 - о к концу 2-й недели жизни
 - о к концу 1-го месяца жизни
 - о на 2-м месяце жизни
- 33. Не оправданная рекомендация кормящей женщине при снижении лактации
 - о более редкое прикладывание к груди
 - о прием фитопрепаратов, стимулирующих лактацию
 - о докорм ребенка молочной смесью
 - о более частое прикладывание к груди
 - о прием дополнительного количества жидкости
- 34. Самым тяжелым осложнением при желтушной форме гемолитической болезни новорожденных является
 - о анемия
 - о поражение печени
 - о поражение ЦНС
 - о сердечная недостаточность
- 35. Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется
 - о дефект межжелудочковой перегородки
 - о тетрада Фалло
 - о транспозиция магистральных сосудов
 - о открытый артериальный проток
- 36. При фиброэластозе чаще всего поражается
 - о левый желудочек
 - о левое предсердие
 - о правый желудочек
 - о правое предсердие
- 37. Потребность в жирах доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании составляет
 - о 2-3 г/кг в сутки
 - о 6,5 г/кг в сутки
 - о 7-8 г/кг в сутки
 - о 9-10 г/кг в сутки
- 38. Появление у ребенка мочи цвета малинового сиропа свидетельствует
 - о о макрогематурии
 - о о гемоглобинурии
 - о о билирубинемии
 - о о мочекишлом инфаркте
- 39. Ребенок самостоятельно ходит, говорит отдельные слова (более 20 слов), понимает обращенную к нему речь, выполняет простые задания. ориентировочный возраст ребенка
 - о 10 месяцев
 - о 1 год
 - о 1 год 6 месяцев
 - о 2 года
 - о 2 года 6 месяцев
- 40. Чаще других приводит к смерти

- недоношенных детей в перинатальном периоде**
- о слабость родовых сил
 - о быстрые роды
 - о преждевременная отслойка плаценты
 - о гестоз 2-й половины беременности
- 41. Профилактику билирубиновой энцефалопатии при конъюгационной желтухе у недоношенных детей из группы высокого риска следует начинать**
- о с первого дня жизни
 - о со второго дня жизни
 - о на высоте желтухи
 - о в любом сроке при появлении признаков билирубиновой интоксикации
- 42. Гипертермия у недоношенных детей чаще наблюдается**
- о при пневмонии
 - о при сепсисе
 - о при энтероколите
 - о при менингите
- 43. Для гиалиновых мембран у новорожденных не типичен**
- о цианоз
 - о тахипноэ
 - о отсутствие дыхательной недостаточности
 - о ацидоз
 - о втяжение грудной клетки
- 44. Для врожденного гипотиреоза не характерно**
- о макроглоссия
 - о пролонгированная желтуха
 - о склонность к гипотермии
 - о преждевременное закрытие большого родничка (тахикардия)
 - о запор
- 45. Внутривенный холестаз развивается в результате угнетения ферментов (оксидаз)**
- о стероидными гормонами
 - о вирусами (при ОРВИ)
 - о фенотербалом
 - о сульфатом магния
 - о кортизоном
- 46. Цитомегаловирусная инфекция вызывает пневмонию**
- о деструктивную
 - о сегментарную
 - о интерстициальную
 - о бронхопневмонию
 - о ателектатическую
- 47. К признакам железодефицитной анемии не относится**
- о повышение билирубина крови
 - о гипохромия эритроцитов
 - о тромбоцитоз
 - о уменьшение связанного железа в сыворотке
 - о уменьшение количества эритроцитов
- 48. Препаратом выбора при остром развитии приступа судорог является**
- о пипольфен
 - о фенотербитал внутривенно
 - о 25% сульфат магния
 - о дроперидол
 - о седуксен
- 49. Основным показателем гипотонической гипергидратации является**
- о гипертензия (А5)
 - о устойчивое повышение ЦВД
- о отек легких
 - о периферические отеки
 - о гиперэлектролитемия
- 50. При текущем пиелонефрите наиболее четко верифицирует развитие хронической почечной недостаточности**
- о полиурия
 - о субфебрилитет
 - о мышечная гипотония
 - о никтурия
 - о поллакиурия
- 51. Искривления конечностей не наблюдается**
- о при фосфат-диабете
 - о при почечно-тубулярном ацидозе
 - о при глюкозурии
- 52. Для лечения бронхообструктивного синдрома при пищевой аллергии противопоказаны**
- о интал
 - о β 2-адреномиметики
 - о ксантиновые препараты
 - о β-адреноблокаторы
 - о антихолинергические
- 53. Развитие сосудистой недостаточности типично**
- о для стафилококковой пневмонии
 - о для пневмоцистной пневмонии
 - о для пневмококковой пневмонии
 - о для микоплазменной пневмонии
- 54. Для лечения "домашних" пневмоний показан**
- о гентамицин
 - о ампициллин
 - о эритромицин
 - о метранидазол
- 55. Оценка ясельной зрелости ребенка проводится до поступления в ясли не позже, чем за**
- о 4 мес.
 - о 3 мес.
 - о 1 мес.
 - о 2 недели
 - о 10 дней
- 56. Для лечения бронхиальной астмы в межприступном периоде не является ведущим назначением**
- о репаратов кальция
 - о неспецифической гипосенсибилизации
 - о специфической гипосенсибилизации
 - о мембраностабилизаторов
- 57. При эозинофильном легочном инфильтрате у ребенка старшего возраста чаще обнаруживаются**
- о мелкопузырчатые влажные хрипы
 - о крепитация
 - о рассеянные влажные и сухие хрипы
 - о отсутствие перкуторных и аускультативных изменений
- 58. Для аллергического фаринготрахеита характерны**
- о кашель с прозрачной слизистой мокротой
 - о кашель с гнойной мокротой
 - о наличие свистящих сухих хрипов
 - о лейкоцитоз со сдвигом влево
- 59. Активность лимфоцитов и плазматических клеток подавляет**
- о супрастин
 - о метилпреднизолон (урбазон)
 - о дигоксин
 - о трентал
- 60. При дефекте межжелудочковой перегородки**

- о максимум шума определяется на верхушке сердца
 - о на легочной артерии
 - о на груди
 - о на верхней трети грудины
- 61. Наибольшее диагностическое значение при системной красной волчанке имеют
 - о иммуноглобулины М
 - о иммуноглобулины А
 - о АСЛ-О
 - о антитела к двухспиральной ДНК
- 62. У мальчика 10 лет боль и припухлость коленных и голеностопных суставов, температура 38 С. Левая граница сердца увеличена на 2 см. Тоны сердца приглушены. Неделю назад перенес ангину. Ваш предварительный диагноз
 - о постинфекционный миокардит
 - о ревматизм
 - о ревматоидный артрит
 - о септический кардит
- 63. При ревматическом эндокардите чаще наблюдается поражение
 - о аортального клапана
 - о двухстворчатого клапана
 - о трехстворчатого клапана
 - о легочной артерии
- 64. Ребенок лечился в стационаре в течение 2 месяцев. Активность ревматизма стихла. После выписки ему необходимо рекомендовать
 - о аспирин (1/2 возрастной дозы) и бициллин-5
 - о бициллин-3
 - о пенициллин
 - о эритромицин
 - о преднизолон
- 65. К группе нестероидных противовоспалительных препаратов не относится
 - о ацетилсалициловая кислота
 - о диклофенак
 - о индоцид
 - о преднизолон
- 66. Для гиперкоагуляции крови не характерно
 - о тромбоциты 450 000
 - о фибриноген 600 г/л
 - о гематокрит 50%
 - о гемоглобин 100 г/л
- 67. При отеке легких нецелесообразно
 - о назначение кислорода, насыщенного парами спирта
 - о наложение жгутов на конечности
 - о введение максимальных доз строфантина
 - о применение преднизолона
- 68. Ребенка с гипертензией необязательно консультировать
 - о у эндокринолога
 - о у невропатолога
 - о у окулиста
 - о у гинеколога
- 69. Для суправентрикулярной формы пароксизмальной тахикардии характерными ЭКГ-признаками являются
 - о ритм 130 в минуту, регулярный, суправентрикулярный (узкий) комплекс QRS
 - о ритм 160 в минуту, регулярный, резко деформированный комплекс QRS
 - о ритм 150 в минуту, нерегулярный, узкий комплекс QRS
- о ритм более 180 в минуту, регулярный, суправентрикулярный комплекс QRS
- 70. При полной атриовентрикулярной (поперечной) блокаде могут наблюдаться приступы
 - о резкого цианоза
 - о потери сознания
 - о сердцебиения
 - о одышно-цианотические
- 71. При поствирусном миокардите следует назначить
 - о кофеин
 - о кордиамин
 - о дигоксин
 - о индерал (анаприлин)
- 72. Систолический шум с максимумом на верхушке сердца чаще всего связан с патологией
 - о аортального клапана
 - о митрального клапана
 - о трехстворчатого клапана
 - о легочной артерии
- 73. В норме зубец Р у детей в III отведении не должен быть
 - о положительным
 - о отрицательным
 - о изоэлектричен (отсутствует)
 - о двухфазным
- 74. Внутриутробно отсутствует
 - о овальное окно
 - о отверстие в межжелудочковой перегородке
 - о артериальный проток
 - о артериальный проток
- 75. Амилоидоз чаще развивается
 - о при ревматизме
 - о при ревматоидном артрите
 - о при склеродермии
 - о при гломерулонефрите
- 76. Для дерматомиозита наиболее характерно
 - о плевропневмония
 - о артрит
 - о отек Квинке
 - о кальциноз
- 77. При тетраде Фалло не наблюдается
 - о декстрапозиция аорты
 - о стеноз легочной артерии
 - о стеноз аорты
 - о гипертрофия стенки правого желудочка
- 78. Для эзофагита характерно
 - о боли за грудиной (изжога)
 - о метеоризм
 - о жидкий стул
 - о запоры
- 79. Ахалазия сопровождается
 - о рвотой непереваренной пищей
 - о рвотой с примесью желчи
 - о срыгиванием через 1 ч после еды
 - о рвотой переваренной пищей
- 80. Наиболее информативным исследованием при гастрите является
 - о морфологическое
 - о рентгеноконтрастное
 - о УЗИ
 - о иридодиагностика
- 81. Целесообразнее использовать при холепатиях
 - о тонирующие безалкогольные напитки
 - о щелочные минеральные воды высокой минерализации
 - о солянокислые столовые минеральные воды
 - о щелочные минеральные воды средней и

- слабой минерализации
82. О наличии гепатоцитоза не свидетельствует
- о гипертрансаминаземии
 - о повышение содержания желчных кислот в сыворотке крови
 - о радиоизотопные исследования
 - о непрямая гипербилирубинемия
83. Для профилактики рецидивов заболеваний гепатобилиарной системы целесообразно назначить
- о малокалорийный стол
 - о стол с избытком животного белка
 - о печеночный стол постоянно
 - о печеночный стол с периодическими "зигзагами"
84. Основной функцией тонкой кишки является
- о всасывание
 - о двигательная
 - о выделительная
 - о поддержание зубиоза
85. Формирование каловых масс в толстой кишке связано с
- о всасыванием жидкости
 - о протеолизом белков
 - о биоценозом
 - о гидролизом жиров
86. Принцип диетотерапии в группе риска по колитам заключается в назначении
- о желчегонной диеты
 - о механически щадящей диеты
 - о диеты, регулирующей ритм дефекации
 - о антацидной диеты
87. Непосредственно влияет на деятельность почечных канальцев
- о альдостерон
 - о тироксин
 - о инсулин
 - о гонадотропин
88. Экскреция оксалатов, уратов в моче определяется обычно
- о в суточной моче
 - о в утренней порции
 - о в трехчасовой моче
 - о в средней порции
89. Показаниями к проведению рентгеноконтрастного исследования мочевой системы являются
- о признаки соединительнотканной дисплазии
 - о аномалия развития уrogenитальной области
 - о недоношенность
 - о симптомы интоксикации
90. К ведущим симптомам нефротической формы гломерулонефрита не относится
- о отечный синдром
 - о абдоминальный синдром
 - о протеинурия более 3 г/л
 - о олигурия
91. У больного с гломерулонефритом при анасарке и угрозе отека легкого целесообразно применять
- о верошпирон
 - о верошпирон в сочетании с гипотиазидом
 - о лазикс
 - о урегит
92. К признакам, подтверждающим диагноз "диабетическая кетоацидотическая кома" не относится
- о бессознательного состояния
 - о шумного Куссмаулевского дыхания
 - о сухой кожи
 - о обилия хрипов в легких
93. Мальчик 8 лет потерял сознание 1 час назад. Отмечаются дыхание Куссмауля, гиперемия щек, сухость кожи. Глазные яблоки мягкие, печень - 3 см, запах ацетона. В течение 3 недель жажда, частые мочеиспускания; похудание. Ваш предварительный диагноз
- о сахарный диабет
 - о несахарный диабет
 - о диабетическая кетоацидотическая кома
 - о менингит
94. К мероприятиям, обеспечивающим профилактику инфекционных заболеваний в ДДУ, относится
- о работа фильтра
 - о прием детей с ринитом легкой степени тяжести
 - о отсутствие изолятора в ДДУ
 - о проведение текущей дезинфекции один раз в сутки
 - о работа бассейна
95. Генерализованное увеличение лимфоузлов не характерно
- о для инфекционного мононуклеоза
 - о для болезни кошачьих царапин
 - о для хронического тонзиллита
 - о для синдрома недостаточности антителообразования
96. Микроциркуляцию не улучшает
- о трентал
 - о тиклид
 - о гентамицин
 - о эуфиллин
97. При аутоиммунных гемолитических анемиях у детей не определяются
- о неполные тепловые агглютинины
 - о полные холодовые агглютинины
 - о двухфазные гемолизины
 - о тепловые гемолизины
98. При лечении талассемии противопоказан
- о препарат железа
 - о средства, улучшающие микроциркуляцию
 - о десферал
 - о кислород
99. К клиническим признакам дефицита железа не относится
- о бледность слизистых оболочек
 - о систолический шум
 - о спленомегалия (у ребенка старше 1 год)
 - о дистрофические изменения кожи, волос, ногтей, зубов
100. Абсолютная нейтропения не связана
- о с гиперспленизмом
 - о с гипопродукцией
 - о с иммунными процессами
 - о с острой кровопотерей
101. К системе амбулаторно-поликлинической помощи детям в городе не относятся
- о специализированная детская поликлиника
 - о детская городская поликлиника
 - о фельдшерско-акушерский пункт
 - о (медсанчасть)
 - о диспансер
 - о специализированный консультативно-диагностический центр
102. Сроки беременности при которых произошло повреждение плода, если ребенок родился с признаками физиологической незрелости

- ☐ 8-12 недель
 - ☐ 14-16 недель
 - ☐ 20-25 недель
 - ☐ 28-32 недели
103. Выберите средневозрастную норму частоты дыхания ребенка 3 лет
- ☐ 25-35 в минуту
 - ☐ 40-60 в минуту
 - ☐ 18-20 в минуту
 - ☐ 16-18 в минуту
104. Критерием для отнесения ребенка ко IIБ группе здоровья не является
- ☐ наличие хронических заболеваний
 - ☐ отклонения в физическом или нервно-психическом развитии
 - ☐ уровень резистентности
 - ☐ уровень основных функций и поведение
 - ☐ наличие отклонений в онтогенезе
105. В занятия гимнастикой с детьми раннего возраста обязательно вводятся гимнастические пособия
- ☐ с 6 месяцев
 - ☐ на втором году
 - ☐ с 4 месяцев
 - ☐ с 10 месяцев
106. Часть младенческой смертности, которая образуется за счет неонатальной смертности, составляет
- ☐ 23-30%
 - ☐ 40-50%
 - ☐ 60-70%
 - ☐ 80-90%
107. Показателем нормального развития ребенка 1 месяца не является
- ☐ слежение взглядом за движущимся предметом
 - ☐ зрительное сосредоточение
 - ☐ слуховое сосредоточение
 - ☐ появление улыбки в ответ на общение
 - ☐ приподнимание головы, лежа на животе
108. Моторная плотность урока физической культуры для учащихся общеобразовательной школы, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе, должна составлять
- ☐ 40-50%
 - ☐ 50-60%
 - ☐ 60-80%
 - ☐ 80-90%
109. Исключите реакцию, не характерную для функциональных проб, у физически неподготовленных детей
- ☐ нормостеническая
 - ☐ астеническая
 - ☐ дистоническая
110. Процессы накопления массы тела преобладают в
- ☐ грудном возрасте
 - ☐ преддошкольный возраст
 - ☐ дошкольный возраст
 - ☐ школьный возраст
111. Для скрининговой диагностики леворукости необязательны
- ☐ определение ведущей руки с помощью батареи тестов, включающих выполнение различных повседневных действий в быту, игре, учебе
 - ☐ выявление ведущего глаза и уха
 - ☐ моторные пробы
- ☐ обследование у невропатолога
112. Кормление ребенка грудью не затруднено при наличии
- ☐ незаращения губы и твердого неба
 - ☐ прогнатизма
 - ☐ жидкого стула
 - ☐ молочницы
113. Показаниями для госпитализации детей с острой пневмонией являются
- ☐ дети подросткового возраста
 - ☐ новорожденные дети
 - ☐ дети школьного возраста
 - ☐ необходимость терапии кислородом
 - ☐ необходимость проведения инъекций
114. Объемный метод расчета питания детей в возрасте от 2 до 4 месяцев составляет
- ☐ 1/5 от массы тела
 - ☐ 1/6 от массы тела
 - ☐ 1/7 от массы тела
 - ☐ 1/8 от массы тела
115. Суточная потребность в белке у детей 1-4 месяцев жизни при естественном вскармливании составляет
- ☐ 2,2 г/кг
 - ☐ 3,5 г/кг
 - ☐ 4 г/кг
 - ☐ 3 г/кг
116. К пищевым корригирующим добавкам не относится
- ☐ отвары овощных и фруктовых
 - ☐ фруктовое пюре
 - ☐ творог
 - ☐ овощное пюре
117. Прикорм ребенку в возрасте 4 месяцев нельзя вводить
- ☐ при остром заболевании
 - ☐ при анемии
 - ☐ при рахите
 - ☐ при упорных срыгиваниях
118. Печень Можно давать ребенку
- ☐ с 6 месяцев
 - ☐ с 3-3,5 месяцев
 - ☐ с 4,5-5 месяцев
 - ☐ с 7,5-8 месяцев
119. Характер кулинарной обработки пищи для детей различного возраста не зависит
- ☐ от аппетита
 - ☐ от объема желудка
 - ☐ от количества и типа ферментов желудочно-кишечного тракта
 - ☐ от активности ферментов желудочно-кишечного тракта
120. В меню с позиции профилактики пищевых отравлений Не рекомендуется включать
- ☐ макароны с сыром
 - ☐ творожную запеканку
 - ☐ омлет
 - ☐ макароны по-флотски
121. В рацион питания ребенка с диабетической комой после прекращения рвоты, тошноты не включают
- ☐ сладкое питье
 - ☐ соки
 - ☐ жидкие каши
 - ☐ отвар из сухофруктов
122. Для адреногенитального синдрома у мальчиков на 1-м году жизни характерно
- ☐ замедление роста
 - ☐ задержка окостенения (костный возраст)

- отстает от паспортного)
- о увеличение полового члена
- о дефекты психического развития
- о хориоретинит
- 123. К факторам неспецифической защиты не относятся**
 - о фагоцитоз
 - о лизоцим
 - о интерферон
 - о лимфоциты
- 124. Ягоды, не рекомендуемые при пищевой аллергии**
 - о черника
 - о клубника
 - о слива
 - о крыжовник
- 125. Какие продукты реже всего способствуют развитию пищевой аллергии**
 - о молоко
 - о куриное яйцо
 - о рыба
 - о хлеб, овес
- 126. Продолжительность периода определения толерантности к пище при гипотрофии 1 степени составляет**
 - о 1-2 дня
 - о 3-7 дней
 - о 10 дней
 - о 14 дней
 - о 30 дней
- 127. Наиболее опасный источник вирусной инфекции в родильном доме**
 - о больные ОРВИ беременные или родильницы
 - о больной ОРВИ персонал
 - о больные дети в инкубационном периоде
 - о больные дети со стертыми формами заболевания
- 128. Желудок ребенка при искусственном вскармливании освобождается за**
 - о 2-3 часа
 - о 2,5-3,5 часа
 - о 3-4 часа
 - о 5-6 часов
 - о 1 час
- 129. Чаще всего наблюдается конъюнктивит**
 - о при токсоплазмозе
 - о при микоплазмозе
 - о при хламидиозе
 - о при цитомегалии
- 130. Главная опасность заболевания беременной женщины миксовирусными инфекциями (гриппом, свинкой, корью) заключается**
 - о в увеличении риска самопроизвольного выкидыша и антенатальной гибели плода
 - о в развитии синдрома задержки внутриутробного развития плода
 - о в повышении вероятности формирования у плода врожденных пороков развития
 - о в рождении ребенка с внутриутробной вирусной инфекцией
- 131. Потребность плода в железе значительно возрастает**
 - о с 12 недель
 - о с 20 недель
 - о с 28 недель
 - о с 36 недель
- 132. Организм новорожденного ребенка не может вырабатывать в достаточном количестве Иммуноглобулины класса**

- о IgA
- о IgM
- о IgG (IgE)
- о IgE
- 133. Ведущим физиологическим механизмом очищения дыхательных путей у новорожденных является**
 - о кашель
 - о чиханье
 - о "пассивный" транспорт содержимого верхних дыхательных путей мерцательным эпителием
 - о все перечисленные
- 134. Самая частая причина анемии при рождении**
 - о кровопотеря или гемолиз
 - о наследственный микросфероцитоз
 - о дефицит эритроцитарных ферментов
 - о наследственная гипопластическая анемия
- 135. Развитие кожных геморрагических проявлений при сепсисе объясняется**
 - о сенсбилизацией организма ребенка
 - о развитием ангиитов и тромбозов
 - о нерациональной антибактериальной терапией
 - о повышенной ломкостью сосудов
- 136. Нивелирование психоэмоционального стресса к концу первой учебной четверти свидетельствует о**
 - о неблагоприятной адаптации
 - о благоприятной адаптации
 - о среднеблагоприятной адаптации
 - о тяжелой адаптации
 - о условно-благоприятной адаптации
- 137. При каком виде вскармливания наиболее рано проявляются признаки врожденного гипотиреоза**
 - о грудном
 - о раннем искусственном
 - о смешанном
 - о исключительно грудном
- 138. Множественный гемангиоматоз со склонностью к кровотечениям при нормальном количестве тромбоцитов в крови свидетельствует**
 - о о синдроме Вискотта - Олдрича
 - о о тромбоцитопенической пурпуре
 - о о синдроме Рендю - Ослера
 - о о синдроме Казабаха - Мерритта
- 139. Судорожный синдром у недоношенных детей чаще других вызывает**
 - о внутричерепная родовая травма
 - о асфиксия
 - о перинатальное поражение ЦНС
 - о обменные нарушения (гипогликемия, гипокальциемия)
- 140. Наиболее частая причина поражения ЦНС у недоношенных новорожденных**
 - о пренатальная патология
 - о родовая травма
 - о обменные нарушения
 - о внутриутробная инфекция
- 141. Среди локальных гнойных заболеваний у недоношенных детей чаще всего встречается**
 - о везикулопустулез
 - о флегмона
 - о омфалит
 - о пиелонефрит
- 142. У недоношенных детей чаще встречается пневмония**
 - о Очаговая (ранние бактериальные)
 - о интерстициальная

- о крупноочаговая
 - о сливная
- 143. Наиболее характерным признаком острого периода врожденного токсоплазмоза является**
- о микроцефалия
 - о атрофия зрительного нерва
 - о гепатомегалия
 - о обнаружение антител против токсоплазмы в составе IgM
 - о высокий титр антител в IgG
- 144. Неотложную терапию проводят при варианте адреногенитального синдрома**
- о с потерей солей
 - о без потери солей
 - о с признаками ранней маскулинизации (у девочек)
 - о с признаками преждевременного полового созревания (у мальчиков)
 - о от ранней диагностики и лечения зависит витальный прогноз всех вариантов АГС
- 145. Белково-клеточная диссоциация в ликворе больного менингоэнцефалитом чаще имеет место в случае этиологии**
- о цитомегаловирусной
 - о энтеровирусной
 - о токсоплазмозной
 - о рубеолярной
 - о листереллезной
- 146. Какова причина уменьшения частоты обструктивного бронхита с возрастом ребенка**
- о увеличение силы дыхательной мускулатуры
 - о уменьшение бактериальной аллергии
 - о увеличение просвета бронхов
 - о уменьшение реактивности лимфатической ткани
- 147. Коагулопатия с одновременным удлинением времени свертывания и кровотечения имеет место**
- о при гемофилии А
 - о при недостаточности VII фактора
 - о при недостаточности XIII фактора
 - о при афибриногемии
 - о при каждом из перечисленных заболеваний
- 148. Устранить депрессию дыхания при передозировке барбитуратов можно с помощью**
- о промедола
 - о дроперидола
 - о бемегида
 - о ГОМКа
 - о индерала
- 149. Для гемолитикоуремического синдрома не типично**
- о анемия
 - о олигурия
 - о тромбоцитопения
 - о повышение конъюгированного билирубина в сыворотке
 - о протеинурия
- 150. Полиурия является ведущим симптомом в раннем периоде развития**
- о синдром де Тони - Дебре - Фанкони
 - о ксантинурия при В6-зависимых состояниях
 - о несахарный диабет
 - о фосфат-диабет
 - о гипервитаминоз D
- 151. Термин "экссудативно-катаральный диатез" следует использовать**
- о в качестве диагноза кожного заболевания
 - о для констатации предрасположенности ребенка к экссудативно-катаральному типу воспаления
 - о для обозначения типа конституции
 - о для обозначения семейной предрасположенности к аллергии
 - о термин устарел и его не следует использовать в практике педиатра
- 152. Доза эуфиллина должна быть уменьшена**
- о при обструктивном синдроме у ребенка с экссудативным типом конституции
 - о при отеке Квинке и крапивнице у ребенка с лимфатизмом
 - о ребенку с острым инфекционным токсикозом
 - о при заболеваниях печени и сердечной недостаточности
 - о при астматическом статусе
- 153. Развитие пиоторакса в первые 2-3 дня от начала заболевания типично**
- о для пневмококковой пневмонии
 - о для пневмоцистной пневмонии
 - о для микоплазменной пневмонии
 - о для стафилококковой пневмонии
- 154. Для лечения пневмококковой пневмонии Нецелесообразен**
- о гентамицин
 - о ампициллин
 - о пенициллин
 - о олеандомицин
- 155. К направлениям деятельности поликлиники не относятся**
- о профилактическое
 - о лечебное
 - о лечебно-профилактическое в дошкольных учреждениях, школах
 - о повышение квалификации врачей и среднего персонала
 - о проведение санитарно-эпидемиологического надзора
- 156. Действие интала обусловлено**
- о противовоспалительными свойствами
 - о нормализацией мембранного обмена тучных клеток
 - о блокированием b-рецепторов
 - о улучшением дренажа бронхов
- 157. Эозинофильный легочный инфильтрат с эозинофилией не наблюдается при**
- о малярии (глистной инвазии)
 - о токсакарроза
 - о бронхиальной астмы
 - о респираторных аллергозов
- 158. При аллергическом фаринготрахеите (рините) обосновано назначение**
- о Кортикостероидов
 - о препаратов, подавляющих кашлевой рефлекс
 - о антибиотиков
 - о глюконата кальция
- 159. Выделение гепарина подавляет**
- о витамин К
 - о курантил
 - о дексаметазон
 - о трентал
- 160. Частые пневмонии не наблюдаются при**
- о атриовентрикулярной коммуникации
 - о дефекта межжелудочковой перегородки
 - о тетрады Фалло
 - о межпредсердного дефекта
- 161. При системной красной волчанке**

- наибольшую диагностическую значимость имеет
- о повышение иммуноглобулинов
 - о диспротеинемия
 - о LE-клетки
 - о увеличение СОЭ
162. Для диагностики ревматизма по Киселю - Джонсу - Нестерову основным критерием является
- о повышение титра АСЛ-О
 - о абдоминальный синдром
 - о полиартрит
 - о снижение зубца Т на ЭКГ
163. Основной причиной формирования приобретенных пороков сердца у детей является
- о фиброэластоз
 - о системная красная волчанка
 - о ревматизм
 - о септический эндокардит
164. За осуществление реабилитации детей, перенесших атаку ревматизма, в поликлинике отвечает
- о физиотерапевт
 - о участковый педиатр
 - о ЛОР-специалист
 - о врач ЛФК
165. Аминохинолиновые препараты не применяются в случае
- о пузырно-мочеточникового рефлюкса
 - о ревматоидного артрита
 - о гломерулонефрита
 - о ревматизма
166. Агрегацию тромбоцитов не уменьшает
- о продектина
 - о эуфиллина
 - о строфантина
 - о дипиридамола
167. Ортостатический коллапс может вызвать
- о дибазол
 - о резерпин
 - о папаверин
 - о анаприлин
168. При неотложном состоянии у ребенка наибольшее диагностическое значение имеет
- о фонокардиограмма
 - о эхокардиограмма
 - о ЭКГ
 - о реокардиограмма
169. Для желудочковой формы пароксизмальной тахикардии характерными ЭКГ-признаками являются
- о ритм 130 в минуту, регулярный, узкий комплекс QRS
 - о ритм более 180 в минуту, регулярный, суправентрикулярный комплекс QRS
 - о ритм 160 в минуту, регулярный, резко деформированный комплекс QRS
 - о ритм 150 в минуту, нерегулярный, узкий комплекс QRS
170. В случае приступа Морганьи - Эдемса - Стокса при атриовентрикулярной блокаде к средствам неотложной терапии не относится
- о строфантин
 - о атропин
 - о адреналин
 - о закрытый массаж сердца
171. В диагностике поствирусного миокардита наибольшее значение имеет
- о рентгенограмма сердца
 - о ФКГ
 - о реограмма
 - о исследование внешнего дыхания
172. На электрокардиограмме в большей степени отражается содержание
- о калия
 - о кальция
 - о натрия
 - о магния
173. В норме у грудных детей на ЭКГ преобладают потенциалы
- о правого желудочка
 - о левого желудочка
 - о увеличены потенциалы как левого, так и правого желудочков
174. Для дифференциальной диагностики поражения коленного сустава ревматоидной и туберкулезной природы наиболее информативно
- о высокое СОЭ
 - о рентгенологические данные
 - о определение иммуноглобулинов
 - о утолщение костальной плевры
175. Для периодической болезни не характерно
- о суставной синдром
 - о боли в животе
 - о периодическая лихорадка
 - о кардит
176. Лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, полиартрит наиболее характерны
- о для ревматизма
 - о для ревматоидного артрита
 - о для инфекционного мононуклеоза
 - о для узелкового периартериита
177. Конъюнктивит часто наблюдается
- о при ревматоидном артрите
 - о при синдроме Рейтера
 - о при ревматизме
 - о при склеродермии
178. Ребенку с рецидивирующей рвотой необходимо провести в первую очередь
- о ирригоскопию
 - о холецистографию
 - о рентгеноскопию желудка с водно-сифонной пробой
 - о рентгеноскопию грудной клетки
179. Боли за грудиной связаны
- о с гиперацидностью
 - о с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите
 - о с метеоризмом
 - о с повышением внутрибрюшного давления
180. Развитие пилороспазма у детей старшего возраста возможно
- о при рецидивирующих язвах привратника
 - о при гастрите
 - о при дуодените
 - о при дуоденогастральных рефлюксах
181. Для синдрома внутрипеченочного холестаза не характерен признак
- о гипертрансаминаземии
 - о гипербилирубинемии
 - о уробилинурии
 - о повышения желчных кислот в сыворотке крови
182. Для хронического гепатита не характерно
- о гипертрансаминаземия
 - о наличие австралийского антигена

- о гиперхолестеремия
 - о повышение холестерина
- 183. При заболеваниях гепатобилиарной системы рекомендуется прием пищи**

- о 3 раза в день
- о 4-5 раз в день
- о часто дробно
- о 4-5 раз в день с обязательным присутствием желчегонных продуктов

184. Для лечения острого и хронического панкреатита нельзя использовать

- о стугерон, циннаризин
- о морфий
- о пищеварительные ферменты
- о спазмолитические и холинолитические препараты (но-шпа, папаверин, платифиллин)

185. Показатели копрограммы, несвязанные с патологией толстой кишки

- о мышечные волокна
- о слизь
- о лейкоциты
- о эритроциты

186. Физиотерапевтическая профилактика утраты рефлекса на дефекацию заключается в назначении

- о электрофореза
- о контактного тепла
- о кишечного душа с минеральной водой
- о субкавальных ванн

187. Интервал между введением иммуноглобулина и последующей плановой прививкой составляет

- о 6 недель
- о 1 месяц
- о 3 месяца
- о 6 месяцев
- о 2 месяцев

188. Повышение мочевой кислоты в крови может свидетельствовать

- о нарушении обмена кальция
- о нарушении обмена щавелевой кислоты
- о об atopическом дерматите
- о нарушении обмена пуринов

189. Гломерулонефрит является заболеванием

- о иммунокомплексным
- о неиммунным
- о микробно-воспалительным
- о инфекционным

190. Гиперулобулинемия характерна

- о для гломерулонефрита, нефротической формы
- о для волчаночного нефрита
- о для гломерулонефрита, смешанной формы
- о для острого нефрита

191. Мальчику 6 лет, у которого появились отеки век, голеней, мало мочится целесообразно назначить диету

- о стол гипохлоридный
- о фруктово-сахарный
- о стол вегетарианский
- о стол без соли, мяса

192. При врожденном нелеченном первичном гипотиреозе не наблюдается

- о полиурия
- о пастозность тканей
- о крупный язык
- о сухость кожи

193. Для больного сахарным диабетом не характерно

- о жажда

- о полиурия
- о экзофтальм
- о расчесы на коже

194. Для больного сахарным диабетом не характерно

- о жажда
- о учащенное мочеиспускание
- о похудание
- о плаксивость

195. Лимфоцитоз не связан

- о с бактериальной инфекцией
- о с гематоонкологическим заболеванием
- о с вирусной инфекцией
- о с типом конституции

196. Не сопровождается эозинофилией

- о энтеробиоз
- о описторхоз
- о фасциолез
- о стронгилоидоз

197. К основным причинам дефицита железа не относится

- о алиментарные
- о неонатальные
- о кровопотери
- о гемолиз

198. К методам лечения парциальной красноклеточной аплазии не относится

- о преднизолонотерапия
- о спленэктомия
- о цитостатическая терапия
- о иммуностимуляторы

199. Новорожденные 1 группы здоровья наблюдаются на 1 месяце жизни

- о 1 раз
- о 2 раза
- о 3 раза
- о 4 раза
- о 5 раз

200. При гемофилии наиболее информативно

- о определение плазменных факторов свертывания
- о определение времени кровотечения
- о определение времени свертывания
- о подсчет тромбоцитов

201. Показатель рождаемости считается низким, если он равен

- о 11-15 на 1000 населения (6-10)
- о 16-20 на 1000 населения
- о 21-25 на 1000 населения
- о 26-30 на 1000 населения

202. Действие повреждающих факторов может обусловить постнатальную гипоксию ребенка на сроке беременности

- о 8-12 недель
- о 14-16 недель
- о 20-25 недель
- о 28-32 недели

203. Уровень резистентности организма ребенка определяется

- о кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру
- о кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру
- о тяжестью острых заболеваний
- о длительностью и тяжестью заболеваний

204. Группа здоровья ребенка 1 года 10 месяцев с

- о врожденным артрогриппозом
 - о третья
 - о четвертая
 - о вторая
 - о пятая
205. В комплекс занятий гимнастикой и массажем с детьми раннего возраста обязательно вводятся упражнения под счет
- о с рождения
 - о с 6 месяцев
 - о с 4 месяцев
 - о с 12 месяцев
206. Частота смертности детей на втором году жизни в сравнении с первым снижается
- о в 2-3 раза
 - о в 4-6 раз
 - о в 7-8 раз
 - о в 9-10 раз
207. Показатель, не относящийся к характеристике нормального психомоторного развития ребенка 3 месяцев
- о упор ног
 - о длительное лежание на животе с опорой на предплечья обеих рук и с высоко поднятой головой
 - о комплекс оживления
 - о певучее гуление
208. Длительное стояние детей на "линейке" в школе и в других случаях прежде всего нецелесообразно потому, что это может быть причиной
- о опущения почек
 - о ортостатических обмороков
 - о гастроптоза
 - о нагрузки на позвоночник
209. Классический синдром переносимости новорожденного не включает
- о мацерации кожи в области стоп и ладоней
 - о отсутствие казеозной смазки
 - о удлинение ногтей
 - о отек подкожной клетчатки
210. Группа здоровья ребенка, который имеет сниженную длину тела. Масса абсолютно соответствует длине
- о первая
 - о вторая
 - о третья
 - о четвертая
211. Диурез это
- о оценка соотношения выпитой и выделенной жидкости за сутки
 - о оценка выделенной жидкости за сутки
 - о оценка выпитой за сутки жидкости
 - о оценка удельной плотности мочи в течение суток
 - о оценка выделенной жидкости за 3 часа
212. Показанием к более позднему прикладыванию к груди со стороны ребенка не является наличие
- о тяжелых нарушений мозгового кровообращения с угрозой внутричерепного кровоизлияния
 - о глубокой недоношенности
 - о тяжелых форм респираторных расстройств
 - о отита
213. В составе коровьего молока по сравнению с женским молоком содержится
- о больше глобулинов
 - о больше альбуминов
 - о 18 белков молока, идентичных белкам сыворотки крови
 - о оптимальное соотношение незаменимых аминокислот, витаминов С, А и Р
214. Суточный объем пищи для детей от 4 до 6 месяцев
- о 1/5 от массы тела
 - о 1/6 от массы тела
 - о 1/7 от массы тела
 - о 1/8 от массы тела
215. Суточная потребность в белке у детей 1-4 месяцев жизни при искусственном вскармливании составляет
- о 2,2 г/кг
 - о 3,5 г/кг
 - о 4 г/кг
 - о 3 г/кг
216. Желток рекомендуется вводить ребенку в возрасте
- о 7 месяцев
 - о 6 месяцев
 - о 7,5 месяцев
 - о 4,5-5 месяцев
217. К правилам введения прикорма не относится утверждение
- о каждый вида прикорма вводят постепенно, начиная с 5-10 г и увеличивая за 10-15 дней до нужного количества
 - о не вводят одновременно 2 прикорма
 - о вводят новый прикорм после привыкания к предыдущему
 - о прикорм дают перед кормлением грудью
218. Целесообразно вводить в питание мясной фарш в возрасте
- о 4 месяцев
 - о 1 года
 - о 7 месяцев
 - о 10 месяцев
219. Коррекция дефицита белка осуществляется введением в рацион питания
- о творога, желтка
 - о 10% и 20% сливок
 - о подсолнечного масла
 - о сахарного сиропа
220. У детей в возрасте 4-6 лет калорийность суточного рациона составляет 1970 ккал, норма жира - 68 г, углеводов - 272 г. Норма белка при этом равна
- о 48 г
 - о 58 г
 - о 68 г
 - о 72 г
221. К группе хромосомных не относится
- о болезнь Дауна
 - о синдром Альпорта
 - о синдром Шерешевского - Тернера
 - о синдром Пату
222. Для вирусной формы аденогенитального синдрома у девочек не характерно
- о гепатоспленомегалия
223. К факторам специфической защиты относятся
- о система комплемента
 - о простагландины
 - о антитела
 - о С-реактивный белок
224. При пищевой аллергии не рекомендуется
- о кабачки
 - о огурца
 - о капуста белокочанная

- о репа
- 225. Понятие "пищевая аллергия" включает в себя
 - о аллергическую реакцию на пищевые продукты
 - о токсическое действие пищевых продуктов
 - о непереносимость пищевых продуктов
 - о либераторное действие пищевых продуктов
- 226. Причиной поллинозов являются
 - о пыльцевые
 - о белковые
 - о пищевые
 - о эпидермальные
- 227. Хранить в холодильнике непастеризованное молоко, собранное у матерей в ночные часы можно хранить
 - о не более 3 ч
 - о не более 6 ч
 - о не более 8 ч
 - о не более 12 ч
- 228. Если беременная страдает сахарным диабетом, то у плода возможно развитие
 - о эмбриопатии
 - о фетопатии
 - о эмбриофетопатии
 - о синдактилии
 - о врожденного порока сердца
- 229. Наиболее неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие плода в первые 2 месяца беременности оказывают
 - о повышенные физические нагрузки
 - о вирусные инфекции
 - о неправильное питание
 - о токсикоз 1-й половины беременности
- 230. Из перечисленных антибиотиков беременной женщине без риска для плода можно назначить
 - о цефалоспорины
 - о аминогликозиды
 - о тетрациклин
 - о левомицетин
- 231. В семье, где оба родителя больны хроническим алкоголизмом, родился доношенный мальчик массой тела 2200 г, ростом 48 см. В клинической картине: микроцефалия, лицевая дисморфия, синдром угнетения, сменившийся повышением нервно-рефлекторной возбудимости. можно поставить диагноз
 - о микроцефалия, множественные стигмы дисэмбриогенеза, внутриутробная гипотрофия
 - о эмбриофетопатия, внутриутробная гипотрофия
 - о алкогольный синдром плода, микроцефалия
 - о задержка внутриутробного развития, морфофункциональная незрелость
- 232. Потребность в белке доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании
 - о 1,5-2 г/кг в сутки
 - о 2,2 г/кг в сутки
 - о 3,6-4 г/кг в сутки
 - о 4,5-5 г/кг в сутки
- 233. Нормальная частота дыхания у здорового новорожденного
 - о 10-15 в минуту
 - о 20-30 в минуту
 - о 40-60 в минуту
 - о 70-80 в минуту
- 234. К наиболее частым причинам миокардита у новорожденных детей относятся инфекции, вызванные
 - о вирусом Коксаки
 - о стафилококком
 - о стрептококком
 - о клебсиеллой
- 235. Основным дифференциально-диагностический признак сепсиса
 - о множественные, последовательно возникающие очаги инфекции
 - о нарушения иммунитета и глубокие изменения гемостаза
 - о тяжелое поражение ЦНС
 - о выраженный кишечный синдром
- 236. При атонических запорах у новорожденных детей не показано
 - о раннее введение соков
 - о назначение кислых смесей
 - о массаж живота
 - о проведение клизмы
- 237. Рино-синцитиальная инфекция чаще всего вызывает
 - о острый ринит
 - о бронхиолит
 - о пневмонию
 - о вирусную диарею
- 238. Особенности гипотиреоза при рождении
 - о сухость кожи, мышечная гипотония, склонность к запорам
 - о макроглоссия, низкий голос, брадикардия
 - о затаившаяся желтуха
 - о специфических симптомов при рождении нет
- 239. Клиника дыхательной недостаточности при ядерной желтухе отличается от пневмонии
 - о наличием крепитирующих хрипов
 - о наличием влажных хрипов в легких
 - о выраженной одышкой
 - о резким угнетением дыхательного центра (брадипноэ)
- 240. Суточная потребность в жидкости у недоношенных детей после 10-го дня жизни, включая питание составляет
 - о 50 мл/кг
 - о 80 мл/кг
 - о 100 мл/кг
 - о 130-160 мл/кг
- 241. Для недоношенных новорожденных с внутриутробной гипотрофией характерна
 - о гипогликемия
 - о гипокалиемия
 - о гипонатриемия
 - о гипермагниемия
- 242. Входными воротами инфекции при сепсисе у недоношенных детей чаще всего является
 - о кишечник
 - о легкие
 - о пупочная ранка
 - о мацерированная кожа
- 243. На внутриутробную инфекцию у ребенка 1-го дня жизни может с большей достоверностью указывать
 - о увеличение IgM
 - о увеличение IgG
 - о лейкоцитоз - 20 000 в мм3
 - о нейтрофилез 80%
 - о температурная реакция в пределах 37,2°C
- 244. Диагноз муковисцидоза подтверждает
 - о рентгенограмма грудной клетки
 - о исследование костного мозга
 - о биопсия тонкого кишечника
 - о микроскопия осадка мочи

- о определение электролитов пота
- 245. У ребенка в возрасте 2 дней обнаружен четко выраженный краниотабес. необходимо**
 - о определить Са, Р, щелочную фосфатазу
 - о ограничиться наблюдением
 - о сделать рентгенографию черепа
 - о сразу назначить витамин D до 5000 Е в сутки
 - о сделать люмбальную пункцию
- 246. Из перечисленных клинических признаков при экссудативном плеврите отсутствует**
 - о ослабленное дыхание
 - о притупление перкуторного звука
 - о бронхиальный тип дыхания
 - о ослабленное голосовое дрожание
 - о тахипноэ
- 247. Из перечисленных признаков для муковисцидоза не характерна**
 - о полифекалия
 - о меконияльный илеус
 - о гипернатриемия
 - о стеаторея
 - о ателектазы
- 248. Сдвигу КОС в сторону ацидоза способствует**
 - о гипервентиляция
 - о рвота
 - о гипокалиемия
 - о циркуляторная гипоксия
 - о гипотермия
- 249. для синдрома внезапной смерти у детей характерно**
 - о синдром чаще встречается у детей старше 3 лет
 - о смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка
 - о всегда обнаруживают конкретную причину смерти
 - о всегда имеются клинико-морфологические признаки незрелости
 - о семейная предрасположенность к внезапной смерти
- 250. Концентрационную функцию почек лучше оценивать пробой**
 - о Аддиса - Каковского
 - о по Зимницкому
 - о по Нечипоренко
 - о с помощью биохимического исследования мочи
- 251. Основной механизм псевдоаллергической реакции связан**
 - о с продукцией специфических антител
 - о с увеличением уровня иммуноглобулина класса Е
 - о с повышенной возбудимостью тучных клеток и выделением гистамина
 - о с увеличением количества супрессоров
 - о со снижением хелперной активности лимфоцитов
- 252. Основным органом, участвующим в метаболизме лекарств, является**
 - о почки
 - о печень
 - о легкие
 - о кровь
 - о поджелудочная железа
- 253. Пневмоторакс без развития плеврита типичен**
 - о для стафилококковой пневмонии
 - о для пневмококковой пневмонии
 - о для пневмоцистной пневмонии
 - о для микоплазменной пневмонии
- 254. Показанием к проведению инфузионной терапии является**
 - о одышка
 - о тахикардия
 - о олигурия
 - о анорексия
- 255. На втором году жизни педиатр наблюдает здорового ребенка**
 - о 2 раза в год
 - о 3 раза в год
 - о 4 раза в год
 - о 6 раз в год
 - о 8 раз в год
- 256. Перед проведением гипосенсибилизации не показано**
 - о определение иммуноглобулина Е
 - о бронхоскопия
 - о кожные тесты с различными аллергенами
 - о определение сыровоточных иммуноглобулинов
- 257. Для выявления уровня жидкости в полости плевры необходимо в первую очередь провести**
 - о рентгеновский снимок легких в вертикальном положении
 - о латерографию
 - о томографию
 - о плевральную пункцию
- 258. Причиной экспираторной одышки при бронхиальной астме является**
 - о стеноз гортани
 - о пневмония
 - о бронхоспазм
 - о круп
- 259. У мальчика 5 лет утомляемость, усиление пульсации левого желудочка, дрожание во 2-м межреберье слева, на ЭКГ перегрузка левого желудочка, на рентгенограмме - гипертрофия левого желудочка, увеличение левого желудочка. можно думать о диагнозе**
 - о стеноз легочной артерии
 - о дефект межжелудочковой перегородки
 - о субаортальный стеноз
 - о открытый артериальный проток
- 260. При тетраде Фалло наиболее частым осложнением является**
 - о бактериальный эндокардит
 - о тромбозы сосудов
 - о отек легких
 - о кровотечение
- 261. При гранулематозе Вегенера редко наблюдаются**
 - о поражение дыхательных путей
 - о нефропатии
 - о поражение носоглотки
 - о изменения со стороны нервной системы
- 262. Из перечисленных признаков в основные диагностические критерии ревматизма входит**
 - о полиартралгии
 - о хорея
 - о лихорадка
 - о увеличенная СОЭ
- 263. При резко выраженной недостаточности аортального клапана артериальное давление обычно**
 - о нормальное
 - о максимальное низкое и минимальное повышено
 - о систолическое - нормальное или повышено,

- о диастолическое - снижено
- о высокое на руках и низкое на ногах
- 264. Ребенку 10 лет. Диагноз: ревматизм, 1 атака, активная фаза, активность III степени, миокардит, полиартрит. Этому ребенку можно назначить ЛФК лежа
 - о через 1 месяц от начала атаки
 - о через 2 недели от начала атаки
 - о через 2 месяца от начала атаки
 - о после выписки из стационара
- 265. Осложнения со стороны крови могут возникнуть при использовании
 - о вольтарена
 - о папаверина
 - о тавегила
 - о супрастина
- 266. При тромбоцитопении не следует назначать
 - о сульфаниламиды пролонгированного действия
 - о димедрол
 - о ацетилсалициловую кислоты
 - о нитрофурановые производные
- 267. При острой сердечно-сосудистой недостаточности не показано применение
 - о адреналина
 - о преднизолона
 - о мезатона
 - о анаприлина
- 268. Тонус мышц у новорожденных проверяется
 - о пробой на "тракцию"
 - о симптом "жгута"
 - о симптом "щипка"
 - о поисковым симптом
 - о симптомом «складного ножа»
- 269. Препаратом, с которого целесообразно начать выведение из приступа пароксизмальной тахикардии ребенка в возрасте 8 месяцев (ЭКГ не записывалась, артериальное давление измерить не удалось), является
 - о кокарбоксилаза или витамин В1 внутривенно, АТФ внутримышечно
 - о дигоксин внутривенно
 - о новокаиномид внутривенно
 - о индерал внутрь
- 270. Для вегетодистонии по симпатикотоническому типу не характерны
 - о мраморность кожи, акроцианоз
 - о белый дермографизм
 - о склонность к гипертермии
 - о беспокойный сон
 - о повышение АД
- 271. Инфекционно-токсическую кардиопатию (дистрофию миокарда) при пневмонии характеризует
 - о нарушение проводимости (удлинение PQ)
 - о перегрузка левого желудочка
 - о блокада левой ножки пучка Гиса
 - о снижение зубца Т
- 272. Исследование, обязательно показанное грудному ребенку перед назначением плавания
 - о ФКГ
 - о рентгенограмма сердца
 - о тахисцилография
 - о ЭКГ
- 273. Зубец Т в отведениях II, V5, V6 регистрируется
 - о отрицательный
 - о положительный
 - о (+ -)

- о изоэлектрический
- 274. К препаратам, уменьшающим агрегацию тромбоцитов, не относятся
 - о трентал
 - о дипиридамол
 - о фенилин
 - о стугерон
- 275. Для выявления амилоидоза наиболее информативно
 - о определение иммуноглобулинов
 - о биопсия слизистой оболочки прямой кишки
 - о биопсия слизистой оболочки десен
 - о биопсия пораженного органа
- 276. Поражение глаз характерно
 - о для болезни Шенлейна - Геноха
 - о для дерматомиозита
 - о для ревматизма
 - о для ревматоидного артрита
- 277. Уретритом сопровождается
 - о ревматизм
 - о ревматоидный артрит
 - о синдром Рейтера
 - о полиндромный ревматизм
- 278. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови при рецидивирующей рвоте необходимо провести в первую очередь анализ на
 - о билирубин
 - о холестерин
 - о СРБ
 - о КОС
- 279. Недостаточность привратника не отражает
 - о боли в эпигастрии во время еды
 - о позывы на дефекацию во время еды
 - о разжижение стула
 - о рвота без примеси желчи
- 280. При дискинезии 12-перстной кишки не наблюдаются
 - о боли натошак в эпигастрии
 - о тошнота
 - о боли по ходу толстой кишки
 - о боли в эпигастрии во время еды и сразу после еды
- 281. Развитие внутрипеченочного холестаза не наблюдается
 - о при гепатите при мононуклеозе
 - о при лимфогранулематозе
 - о при дискинезии желчевыводящих путей и холецистите (холецистите)
 - о при септическом гепатите
- 282. Возможным прогнозом токсического гепатита не является
 - о выздоровление
 - о острая печеночная недостаточность
 - о абсцедирование
 - о переход в хронический гепатит, цирроз
- 283. Не усиливает непрямую гипербилирубинемия
 - о левомицетин
 - о сульфаниламиды
 - о салицилаты
 - о верошпирон
- 284. Основными в лечении хронического энтерита являются
 - о соляная кислота с пепсином
 - о анаболические препараты
 - о минеральные воды
 - о полиферментные препараты
- 285. К основному копрологическому признаку неспецифического язвенного колита

- о **относится**
 - о выделения слизи с кровью
 - о стеаторея
 - о амилорея
 - о креаторея
- 286. Медикаментозная профилактика при неспецифическом язвенном колите заключается в назначении**
- о сульфосалазина
 - о средств, нормализующих состав флоры толстой кишки
 - о спазмолитиков
 - о преднизолона длительно
- 287. Количество ретикулоцитов (%) у детей, кроме периода новорожденности, составляет**
- о 0-10
 - о 3-5
 - о 5-10
 - о 10-15
 - о 10-42
- 288. По анализу мочи по Нечипоренко можно судить**
- о об оксалурии
 - о о бактериурии
 - о об уратурии
 - о о лейкоцитурии
- 289. Гломерулонефрит чаще развивается**
- о на 1-м году жизни
 - о с 1 года до 2 лет
 - о с 7 до 15 лет
 - о после 2-3 лет
- 290. Ограничение соли не показано при**
- о олигоанурии
 - о артериальной гипертензии
 - о отечного синдрома
 - о микропротеинурии
- 291. Тубулоинтерстициальный нефрит является**
- о бактериальным воспалением
 - о абактериальным воспалением
 - о аутоиммунным процессом
 - о инфекционно-аллергическим
- 292. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) не отмечаются признаки**
- о снижения аппетита
 - о повышения артериального давления, (не бывает желтушности кожи).
 - о снижения артериального давления
 - о сочетания этой болезни с туберкулезом
- 293. Для первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна) не характерно**
- о повышение сахара в крови
 - о понижение калия в крови
 - о артериальная гипертензия
 - о мышечная слабость
- 294. Ребенка с эутиреотидным увеличением щитовидной железы III степени, вегетососудистой дистонией следует лечить**
- о у педиатра
 - о у эндокринолога
 - о у невропатолога
 - о у гомеопата
- 295. При гемофилии А следует назначить**
- о прямое переливание крови от матери
 - о концентрат VIII фактора
 - о прямое переливание крови
 - о переливание крови длительного хранения
- 296. Функциональную способность тромбоцитов не характеризует**
- о подсчет тромбоцитов
 - о определение агрегационной способности
 - о определение адгезии
 - о ретракция кровяного сгустка
- 297. При наличии у ребенка тромбоцитопатии и спленомегалии необходимо произвести**
- о стерильную пункцию
 - о коагулограмму
 - о определить продолжительность кровотечения
 - о посев крови на стерильность
- 298. При гемофилической пурпуре можно назначать**
- о аспирин
 - о антигистаминные препараты
 - о эпислон-аминокапроновую кислоту
 - о реополиглюкин
- 299. Нехарактерным серологическим изменением при лимфогранулематозах является**
- о гипер-α2 - и γ-глобулинемия
 - о гиперфибриногенемия
 - о повышение церулоплазмينا, гаптоглобина
 - о снижение железа
- 300. Для детского возраста характерны**
- о миеломная болезнь
 - о моноцитарный лейкоз
 - о хронический лимфолейкоз
 - о сублейкемический миелоз (миелосклероз)
- 301. Основным разделом работы в области профилактики участкового педиатра с детьми дошкольного возраста является**
- о осуществление восстановительного лечения
 - о динамическое наблюдение за здоровьем детей в возрасте от рождения до 7 лет
 - о организация диспансерных осмотров детей врачами-специалистами и лабораторно-диагностических исследований
 - о подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение и школу
- 302. График работ кабинета по воспитанию здорового ребенка в поликлинике для обеспечения качественного профилактического наблюдения необходимо организовать**
- о 2 раза в неделю
 - о ежедневно
 - о один раз в неделю
 - о в зависимости от мощности поликлиники
- 303. Ребенок 1 года 7 месяцев. Детское учреждение не посещает, анамнез благополучный; физическое и нервно-психическое развитие соответствует возрастной норме; 3 раза за последний год болел ОРЗ; уровень основных функций органов и систем не изменен. ребенка**
- о относится к группе здоровья
 - о первой
 - о второй
 - о второй А
 - о второй В
- 304. Часто болеющему ребенку 1 года 3 месяцев с дефицитом массы тела следует назначить комплекс гимнастики**
- о возрастной
 - о соответствующий возрасту 10-14 месяцев
 - о специальный лечебный
 - о возрастной + лечебный
- 305. Здоровым детям в возрасте 6 месяцев нужно проводить массаж**
- о массаж рук

- о массаж спины, живота и стоп
- о общий массаж
- о массаж ног
- о массаж воротниковой зоны

306. Показатель младенческой смертности можно рассчитывать При числе родившихся детей

- о 200
- о 400
- о 600
- о 800
- о 1000

307. При заключении о состоянии здоровья ребенка 5 месяцев педиатр не оценивает из числа линий развития

- о зрительные и слуховые ориентировочные реакции
- о речь активная
- о навыки
- о движения руки
- о понимание речи

308. Перед назначением плавания грудному ребенку необязательным исследованием является

- о подсчет числа сердечных сокращений
- о анализ мочи
- о рентгенография грудной клетки
- о анализ крови
- о ЭКГ

309. Данные скринингового исследования физического развития: длина - 50-й центиль; масса - 75-й центиль. физическое развитие Оценивается как

- о среднее
- о отклонение в физическом развитии
- о избыток массы тела
- о низкий рост

310. Биологический возраст ребенка в возрасте 6 лет с нормальной массой тела, прибавкой длины за год на 5 см, одним постоянным зубом оценивается как

- о опережение возраста
- о отставание от возраста
- о соответствие возрасту

311. Укажите основные причины леворукости детей

- о органическое поражение ЦНС
- о индивидуально-психологические особенности развития ребенка
- о особенности воспитания и обучения ребенка
- о нейроинфекция

312. Противопоказаниями со стороны матери к кормлению грудью не являются

- о заболевания почек с почечной недостаточностью
- о заболевания сердца с сердечно-сосудистой недостаточностью
- о злокачественные новообразования
- о грипп

313. Характеристикой, отличающей Женское молоко от коровьего молока не является

- о высокое содержание незаменимых аминокислот
- о преобладание казеиногена
- о наличие мелких хлопьев, образующихся при створаживании, доступных для воздействия желудочного сока ребенка
- о большая активность диастазы и других ферментов

314. Число кормлений детей возрасте от 1 до 3

месяцев составляет

- о 7 раз в сутки
- о 6 раз в сутки
- о 4 раза в сутки
- о 5 раз в сутки

315. Суточная потребность в белке у детей после введения прикорма при естественном вскармливании составляет

- о 2 г/кг
- о 2,2 г/кг
- о 4 г/кг
- о 3 г/кг

316. Сроки введения кефира ребенку, находящемуся на грудном вскармливании

- о 45 месяцев
- о 5 месяцев
- о 6 месяцев
- о 8 месяцев

317. Приготовление овощного пюре считается неправильным, если

- о количество картофеля составляет не более 1/2 от общего объема овощного пюре
- о разваривать овощи в большом количестве воды без крышки
- о разваривать овощи в небольшом количестве воды или на пару под крышкой
- о овощи предварительно замачиваются

318. К особенностям оценки достаточности питания детей 1-го года жизни не относят оценку

- о расчета питания
- о весо-ростовых показателей
- о наличия заболеваемости
- о наследственности

319. Дефицит жира в рационе питания детей не может быть восполнен за счет употребления

- о 10% и 20% сливок
- о подсолнечного масла
- о желтка
- о яичного белка

320. На фоне лечения нестероидными противовоспалительными препаратами необходима диетическая коррекция

- о калийсодержащими продуктами
- о продуктами, обогащенными пищевыми волокнами
- о продуктами, обладающими защитными свойствами по отношению к слизистой желудочно-кишечного тракта
- о кисломолочными продуктами

321. Для синдрома "кошачьего крика" характерно

- о делеция плечика 5-й пары хромосом
- о транслокация 21-й хромосомы
- о кольцевидная хромосома 18-й пары
- о отсутствие X-хромосомы

322. К антителам относится

- о белки острой фазы
- о гликозаминогликаны
- о иммуноглобулин А
- о С-реактивный белок

323. К иммунодефицитным состояниям относятся

- о синдром Альпорта
- о синдром Луи - Бар (атаксия-телеангиоэктазия)
- о синдром Марфана
- о синдром де Тони - Дебре - Фанкони

324. При пищевой аллергии детям не рекомендуют употреблять в пищу

- о яблоки зеленого цвета
- о груши зеленого цвета

- о абрикосы
- о сливы

325. Реже всего лекарственную аллергию вызывают

- о антигистаминные препараты
- о сульфаниламидные препараты
- о жаропонижающие препараты и анальгетики
- о антибиотики

326. К основным клиническим формам поллинозов нельзя отнести

- о аллергический альвеолит
- о риноконъюнктивальные формы
- о бронхоспазм
- о крапивницу

327. Дальнейшее снижение перинатальной смертности при низком ее уровне От качества в основном зависит от работы

- о родильного дома
- о отделения патологии новорожденных
- о женской консультации
- о отделения реанимации

328. Обработка рук персонала в отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей производится

- о 0,5% раствором хлорамина
- о туалетным мылом в проточной воде (дважды) или (моющим средством и антисептиком)
- о щеткой и туалетным мылом
- о 70% этиловым спиртом

329. Влияние различных вредностей в первые 2 месяца беременности чаще всего приводит

- о к развитию дистрофических и некротических процессов
- о к развитию воспалительных процессов
- о к формированию пороков развития
- о к патологии иммунной системы

330. Основной путь инфицирования плода при активном туберкулезе у матери

- о трансплацентарный
- о восходящий
- о через половые клетки отца и матери
- о при прохождении плода по родовым путям

331. Росту бифидобактерий способствует

- о бета-лактоза
- о лизоцим
- о макрофаги
- о лактоферрин
- о ненасыщенные жирные кислоты

332. У доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании, потребность в углеводах составляет

- о 4-6 г/кг в сутки
- о 7-9 г/кг в сутки
- о 10-12 г/кг в сутки
- о 13 г/кг в сутки

333. Расширение венозной сети на передней брюшной стенке появляется при

- о аппендиците
- о желчекаменной болезни
- о портальной гипертензии
- о кишечной инфекции
- о гастрите

334. Показанием к назначению гидрокортизона у новорожденных с сепсисом является

- о наличие инфекционного токсикоза
- о развитие септического шока
- о развитие ДВС-синдрома
- о все перечисленные

335. Для грам-отрицательной флоры наиболее характерна локализация очага остеомиелита в

- о эпифизах трубчатых костей
- о метафизах трубчатых костей
- о нижней челюсти
- о верхней челюсти

336. Для аденогенитального синдрома у новорожденной девочки патогномичным является

- о рвота с рождения
- о гинекомастия
- о вирильные наружные гениталии с пигментацией
- о мраморный рисунок кожи

337. Частым осложнением энтеровирусной инфекции являются

- о серозный менингит и миокардит
- о пневмония
- о отит-анtrit
- о пиелонефрит

338. Антибактериальная терапия новорожденному с ограниченной формой везикулопустулеза

- о не показана
- о показана при сочетании везикулопустулеза с гипотрофией
- о показана при сочетании везикулопустулеза с желтухой
- о показана во всех случаях

339. Метод вскармливания недоношенного ребенка определяет

- о гестационный возраст
- о масса тела при рождении
- о функциональная зрелость и общее состояние ребенка
- о постнатальный возраст

340. В раннем неонатальном периоде наиболее часто вызывают гибель недоношенных детей

- о родовая травма
- о асфиксия и синдром дыхательных расстройств
- о инфекции
- о врожденные пороки развития

341. У недоношенных детей с массой тела менее 1500 г в первые три недели жизни наиболее часто встречается

- о железодефицитная анемия
- о витамин Е-дефицитная анемия
- о белководефицитная анемия
- о витамин В12-дефицитная анемия

342. Длительная ингаляция 100% кислорода может вызвать у недоношенного ребенка

- о развитие ретролентальной фиброплазии
- о развитие бронхолегочной дисплазии
- о снижение растяжимости легких
- о появление судорог
- о повышение температуры

343. Уровень непрямого билирубина сыворотки крови уменьшает

- о люминал (фенобарбитал)
- о магнезия
- о преднизолон
- о аскорбиновая кислота

344. Признаки мужского пола ребенка можно трактовать как феминизацию. При

- о истинном гермафродитизме
- о болезни Шерешевского - Тернера
- о аденогенитальном синдроме
- о синдроме Клайнфельтера
- о гипоспадии

345. Карпопедальный спазм характерен

- о для дефицита железа
- о для гипофосфатемии
- о для гипокальциемии
- о для фебрильных судорог
- о для эписиндрома

346. Полное расправление легких у новорожденных происходит

- о сразу после рождения
- о через час после рождения
- о через 6 месяцев
- о в течение нескольких дней
- о через 2-3 года

347. "Мойнингамовский" ритм болей при заболеваниях желудка у детей

- о боль после приема пищи уменьшается, а затем вновь усиливается
- о боль после приема пищи усиливается, а затем уменьшается
- о боль снимается приемом пищи
- о независимость боли от приема пищи
- о боль до приема пищи

348. Гематокрит остается нормальным

- о при изотоническом эксикозе
- о при водodefицитном эксикозе
- о при солeдефицитном эксикозе
- о изменения гематокрита для любого типа эксикоза не характерны

349. Ригидности затылочных мышц не наблюдают

- о при бактериальном менингите
- о при вазомоторном коллапсе
- о при шейном лимфадените
- о при среднем отите

350. Для почечно-тубулярного ацидоза не характерно

- о метаболический ацидоз
- о полиурия
- о гипергликемия
- о нефролитиаз
- о остеопатия

351. Пищевым продуктом, обладающим выраженным либераторным эффектом, считают

- о цитрусовые
- о молоко
- о яйца
- о яблоки

352. При проведении антибиотикотерапии необходимо придерживаться следующей рекомендации

- о назначать вместе бактерицидные и бактериостатические препараты
- о использовать прерывистый курс лечения
- о комбинировать аминокгликозиды
- о создавать достаточные концентрации антибиотиков
- о для усиления эффективности комбинировать с глюкокортикоидами

353. Утолщение кожной складки над пораженным участком типично

- о для очаговой пневмонии
- о для ателектаза
- о для пневторакса
- о для гнойного плеврита

354. Округлые инфильтраты в легких заставляют исключить

- о воспалительные изменения
- о туберкулез
- о микоз

- о новообразования

355. Для бронхиальной астмы не характерно

- о приступ бронхоспазма с экспираторной одышкой
- о повышение хлоридов поте и моче
- о гиперпродукция вязкой прозрачной мокроты
- о рассеянные непостоянные сухих и влажных хрипов

356. При атопической бронхиальной астме не рекомендуется назначать

- о обзидан
- о интал
- о эуфиллин
- о беротек

357. При гиперсекреторных нарушениях в приступный период бронхиальной астмы показаны

- о антигистаминные препараты
- о препараты, подавляющие кашлевой рефлекс
- о холинолитики
- о отхаркивающие средства, эуфиллин, ингаляции с муколитиками, обильное щелочное питье

358. Синдром бронхиальной астмы с эозинофилией иногда наблюдается

- о при системной красной волчанке
- о при узелковом периартериите
- о при склеродермии
- о при лейкозе

359. У больного с открытым артериальным протоком не наблюдается

- о полицитемия
- о увеличение левого желудочка
- о выбухание легочной артерии на рентгенограмме
- о гиперволемию малого круга кровообращения

360. При тетраде Фалло не бывает

- о вынужденного положения
- о приступов глубокого цианоза
- о бессимптомного течения
- о пальцев в виде "барабанных палочек"
- о полицитемии

361. При склеродермии наиболее часто наблюдается

- о поражение печени
- о кардиопатия
- о нефропатия
- о поражение кожи

362. Одним из основных диагностических критериев ревматизма является

- о очаговая инфекция
- о кардит
- о общее недомогание
- о артралгия

363. Набухание вен на шее не может свидетельствовать

- о о недостаточности кровообращения
- о о нарушении венозного возврата крови к сердцу
- о о повышении центрального венозного давления
- о о недостаточности клапанов аорты

364. Недостаточность кровообращения у ребенка в возрасте 3 месяцев обычно не является следствием

- о фиброэластоза
- о ревматического кардита
- о врожденного порока сердца
- о пароксизмальной тахикардии

365. У ребенка с анемией не рекомендуется применять

- пенициллина
- левомицетина (цитостатики)
- сульфаниламидов
- нитрофурановых производных

366. Ребенок 8 лет перенес 2 атаки ревматизма. Сформировалась митральная недостаточность. В этой ситуации проводить профилактику бициллином необходимо в течение

- 1 года
- 2 лет
- 3 лет
- 5 лет

367. Из перечисленных препаратов при коллапсе не показан

- преднизолон
- адреналин
- метазон
- пипольфен

368. Из перечисленных препаратов к β-адреноблокаторам относится

- эфедрин
- анаприлин
- новокаиномид
- аймалин

369. Выведение ребенка в возрасте 6 месяцев из приступа суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии целесообразно начать с введения

- новокаиномид
- индерала внутрь
- дигоксина
- мезатона, затем изоптина внутривенно

370. Для ваготонического типа вегетодистонии не характерны

- гипергидроз
- тахикардия
- красный дермографизм
- склонность к обморокам

371. Амилоидоз чаще осложняет

- ревматоидный артрит
- ревматизм
- лейкоз
- системную красную волчанку

372. Метод электрокардиографии отражает меньше всего

- автоматизм
- проводимость
- возбудимость
- сократимость

373. Снижение зубца Т на ЭКГ не вызывает

- гиперкалиемию
- гипокалиемию
- инфекционно-токсическая кардиопатия при пневмонии
- тяжелая аллергическая реакция

374. Нестероидные противовоспалительные препараты не обладают действием

- антипиретическим
- анальгетическим
- дезагрегантным
- повышающим активность ферментов

375. Для системной красной волчанки характерно повышение иммуноглобулинов крови класса

- IgA
- IgM
- IgG

- IgE

376. Критерии Киселя – Джонса – Нестерова используются в диагностике

- ревматоидного артрита
- ревматизма
- красной волчанки
- саркоидоза

377. Инсоляция провоцирует развитие

- ревматизма
- системной красной волчанки
- реактивного артрита
- синдрома Рейтера

378. При склонности к рецидивирующей рвоте из перечисленных препаратов предпочтителен

- термопсис
- реглан (церукал), (домперидон)
- соляная кислота
- кофеин

379. Дуоденогастральный рефлюкс могут способствовать развитию

- дивертикула желудка
- перегиба желудка
- язвы пищевода
- антрального гастрита

380. Для заболевания желчного пузыря не патогномоничен

- Кера
- Мерфи
- Курашова
- Пастернацкого

381. Показателем гепатоцитолита является

- гиперхолестеринемия
- гипертрансаминаземия
- диспротеинемия
- гиперфибриногенемия

382. Желтуха Жильбера чаще выявляется

- у новорожденных
- в грудном возрасте
- в школьном возрасте
- в дошкольном возрасте

383. При гепатоцитолите целесообразнее

- карбенициллин
- оксациллин
- лактулоза
- фурасемид

384. Основной причиной угнетения иммунологической реактивности при гипотрофии является

- нарушение обмена белков
- нарушение обмена жиров
- нарушение обмена углеводов
- дефицит витаминов
- дефицит минеральных веществ

385. Показанием для проведения ирригоскопии являются

- боли натощак в эпигастрии
- боли по ходу толстой кишки перед дефекацией
- выделение слизи, крови с калом
- боли в области ануса после дефекации

386. Фитопрофилактика раздраженной толстой кишки заключается в назначении

- ромашки, зверобоя, пустырника
- желчегонных средств
- листа сенны
- экстракта крушины

387. Почка экскретирует

- альдостерон
- катехоламин
- ренин

- о андрогены
- 388. Значительное повышение IgG в крови наблюдается**
 - о при пиелонефрите
 - о при системной красной волчанке
 - о при цистите
 - о при гломерулонефрите нефротической формы
- 389. Гематурическая форма гломерулонефрита чаще развивается в возрасте**
 - о ясельном
 - о после 6-7 лет
 - о в старшем школьном возрасте
 - о в любом возрасте
- 390. Разгрузочная диета показана**
 - о при острых проявлениях гломерулонефрита
 - о при стихании активности процесса
 - о при ремиссии гломерулонефрита
 - о при любом из перечисленных периодов гломерулонефрита
- 391. Анаболическим действием обладает**
 - о оротат калия
 - о лейкеран
 - о хлористый аммоний
 - о бруфен
- 392. Больному с кетоацидотической прекомой сахарного диабета следует назначить**
 - о дообследование
 - о срочную госпитализацию в эндокринологическое отделение
 - о внутривенное введение 5% раствора глюкозы
 - о лечение на дому
- 393. У больных с врожденным первичным гипотиреозом не наблюдается**
 - о снижение вольтажа на ЭКГ
 - о повышенного уровня ТТГ
 - о сниженного уровня Т3, Т4
 - о высокого уровня гормона роста
- 394. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) наблюдается**
 - о тремор рук
 - о судороги
 - о повышенный аппетит
 - о гиперпигментация кожи
 - о желтушность кожи
- 395. Парапротеинемический гемабластоз, встречающийся у детей**
 - о миеломная болезнь
 - о болезнь тяжелых цепей
 - о болезнь Вальденстрема
 - о идиопатическая парапротеинемия
- 396. Для верификации диагноза хронического миелолейкоза необходимо проведение**
 - о пункции костного мозга
 - о пункции селезенки
 - о спинномозговой пункции
 - о пункции лимфоузла
- 397. При остром лейкозе Не характерен**
 - о ретикулоцитопения
 - о ретикулоцитоз
 - о нейтропения
 - о тромбоцитопения
- 398. Для анемий не характерно**
 - о ретикулоцитопения
 - о уменьшение эритроцитов, нейтрофилов
 - о тромбоцитопения
 - о относительная лимфопения
- 399. Верификации диагноза апластической анемии не способствует**

- о трепанобиопсия
- о пункция костного мозга
- о определение железа сыворотки
- о определение СОЭ
- 400. Основная причина микросфероцитарных гемолитических анемий**
 - о врожденный дефект структуры мембранного белка эритроцита
 - о усиление процессов перекисного окисления липидов
 - о гиперспленизм
 - о иммунные процессы
- 401. Высоким показателем рождаемости является**
 - о 11-15 на 1000 населения
 - о 16-20 на 1000 населения
 - о 21-25 на 1000 населения
 - о 26-30 на 1000 населения
- 402. Ребенок первого года жизни должен посетить кабинет по воспитанию здорового ребенка**
 - о 5 раз в год
 - о ежемесячно
 - о ежеквартально
 - о по рекомендации педиатра
- 403. Ребенок 2 лет 7 месяцев 3 раза за последний год болел ОРЗ. его резистентность оценивается как**
 - о нормальная
 - о сниженная
 - о плохая
 - о очень плохая
- 404. Ребенку 3 месяцев можно назначить возрастной комплекс гимнастики и массажа при наличии рефлекса**
 - о Бабинского
 - о Галанта
 - о Моро
 - о Ландау
- 405. При проведении специальных закаливающих процедур является нежелательной стадия сосудисто- двигательной реакции**
 - о вазодилатации
 - о паретическое состояние
 - о вазоконстрикции
 - о игра вазомоторов
- 406. О нормальном развитии зрительных функций ребенка в возрасте 1 месяца свидетельствует показатель**
 - о длительное зрительное сосредоточение на неподвижном предмете
 - о зрительное сосредоточение на игрушке в вертикальном положении на руках у взрослого
 - о плавное слежение за движущимся предметом
 - о ступенчатое слежение
- 407. Ведущим в воспитании двигательной сферы ребенка 7 месяцев является**
 - о умение садиться
 - о сидение
 - о ползание
 - о умение вставать
- 408. Витамин Д содержится в**
 - о желтке (способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта)
 - о овощах
 - о хлебе грубого помола
 - о мясе
 - о бобовых
- 409. Ребенку 11 месяцев. При очередном посещении врача выявлена дисгармония**

- физического развития в виде избытка массы тела I степени. ребенку рекомендовано
- о ревизия питания
 - о консультация эндокринолога
 - о ограничение углеводов
 - о повторное взвешивание
410. У ребенка 1 года 1 месяца выявлена нейросенсорная глухота. Физическое развитие нормальное; нервно- психическое развитие соответствует возрасту по всем параметрам, кроме характеризующих речь. ребенка следует отнести
- о к третьей группе здоровья
 - о ко второй группе здоровья
 - о к четвертой группе здоровья
 - о к пятой группе здоровья
411. К медицинским критериям готовности ребенка к поступлению в школу не относит
- о уровень биологического возраста
 - о уровень школьной зрелости
 - о уровень резистентности
412. Причинами возникновения вторичной гипогалактии являются все, кроме
- о несоблюдения режима кормления грудью ребенка
 - о сцеживания молока после каждого прикладывания к груди
 - о нерационального режима дня и питания женщины
 - о отсутствия сцеживания грудного молока после кормления
413. Приближение по составу коровьего молока к женскому молоку не достигается способом
- о снижения концентрации белка, углеводов, солей
 - о увеличения концентрации белка, углеводов, солей
 - о обогащения незаменимыми аминокислотами, стимуляторами бифидогенной флоры кишечника
 - о увеличения концентрации витаминов, микроэлементов
414. Продолжительность диспансерного наблюдения в поликлинике за детьми с хроническим колитом составляет
- о не менее 1 года
 - о 2 года
 - о 3 года
 - о 5 лет
 - о до перевода во взрослую сеть
415. Суточная потребность в белке у детей после введения прикорма при искусственном вскармливании адаптированной смесью составляет
- о 2 г/кг
 - о 2,5 г/кг
 - о 3-4 г/кг
 - о 4,5 г/кг
416. Правила проведения искусственного вскармливания адаптированными смесями
- о сроки введения пищевых добавок, как при естественном вскармливании
 - о сроки введения пищевых добавок и прикорма на 2-3 недели раньше, чем при естественном вскармливании
 - о более поздний перевод на 5-6 разовое кормление
 - о сроки введения прикорма на 2-3 недели позже, чем естественном вскармливании
417. Прикорм овощным пюре вводят ребенку, находящемуся на естественном вскармливании, в возрасте
- о 5 месяцев
 - о 8 месяцев
 - о 6 месяцев
 - о 7 месяцев
418. Эффективность питания детей в возрасте до 1 года нельзя оценить
- о по сопоставлению фактического питания детей с рекомендуемыми нормами
 - о по генетическому анамнезу
 - о по частоте заболеваемости
 - о по физическому развитию
419. Коррекция дефицита углеводов в рационе питания осуществляется
- о творогом
 - о желтком
 - о сахарным сиропом
 - о 10% и 20% сливками
420. На фоне лечения антибиотиками необходима диетическая коррекция путем
- о ограничения поваренной соли
 - о введения кисломолочных продуктов
 - о введения продуктов, обладающих защитными свойствами по отношению к слизистой желудочно-кишечного тракта
 - о введения продуктов, обогащенных калием
421. С помощью пробы Феллинга диагностируют
- о фенилкетонурию
 - о гистидинемия
 - о гомоцистинурию
 - о гликогеноз
422. Плазматические клетки, непосредственно вырабатывающие антитела, образуются
- о из В-лимфоцитов
 - о из нейтрофилов
 - о из базофилов
 - о из макрофагов
423. На внутриутробную инфекцию у новорожденных 5-ти дней указывает
- о лейкоцитоз 10 000 в мм3
 - о увеличение IgM
 - о лимфоцитоз 50%
 - о снижение IgG
424. Базисными препаратами в лечении пищевой аллергии являются
- о эуфиллин
 - о интал, задитен, налкром
 - о стугерон
 - о супрастин
425. На развитие лекарственной аллергии не влияет
- о индекс сенсibilизации (или частота аллергической реакции) на лекарственный препарат
 - о факторы лечения (дозировки, способы введения препаратов)
 - о генетические факторы
 - о пол ребенка
426. В приступном периоде бронхиальной астмы не назначается
- о аэрозольные β2-симпатомиметики (сальбутамол, вентолин)
 - о эуфиллин
 - о глюкокортикостероиды
 - о супрастин (антигистаминные)
427. При возникновении в роддоме группового инфекционного заболевания больных

- о новорожденных необходимо перевести в наблюдательное отделение и назначить лечение
 - о оставить на месте, назначив лечение
 - о немедленно перевести в соответствующий стационар
 - о все ответы правильные
- 428. В течение первого года жизни недоношенный ребенок должен осматриваться невропатологом
 - о каждый месяц
 - о каждые 2-3 месяца
 - о каждые 4-5 месяцев
 - о в возрасте 1 месяца, затем не реже 2 раз в год
- 429. Клиническую картину при внутриутробных инфекциях в большей степени определяет
 - о сроки внутриутробного поражения
 - о токсичность возбудителя
 - о путь проникновения инфекции
 - о состояния реактивности организма плода
- 430. Наиболее характерными симптомами врожденного туберкулеза являются
 - о внутриутробная гипотрофия, желтуха, спленомегалия
 - о гипертермия, гепатомегалия, увеличение лимфатических узлов
 - о врожденная катаракта, эритематозная сыпь, жидкий стул
 - о лихорадка, везикулезная сыпь, менингит, асцит
- 431. У доношенных новорожденных, перенесших асфиксию в родах, самым частым вариантом поражения ЦНС является
 - о субдуральное кровоизлияние
 - о перивентрикулярное кровоизлияние
 - о отек мозга
 - о перивентрикулярная лейкомаляция
- 432. Здорового недоношенного ребенка можно начинать купать
 - о через 2 дня после рождения
 - о через 5 дней после рождения
 - о через 7 дней после рождения
 - о через 10 дней после рождения
- 433. В желудочно-кишечном тракте новорожденного ребенка железо всасывается на уровне
 - о желудка
 - о верхних отделов тонкой кишки
 - о тощей кишки
 - о толстой кишки
- 434. Большое количество нейтрального жира и его преобладание над жирными кислотами обнаруживается
 - о при лактазной недостаточности
 - о при муковисцидозе
 - о при экссудативной энтеропатии
 - о все ответы правильные
- 435. Остеомиелиту грам-отрицательной этиологии свойственно
 - о острое, с отчетливо выраженным артритом
 - о молниеносное
 - о вялотекущее, без отчетливо выраженного артрита и с неяркими рентгенологическими признаками
 - о все варианты встречаются одинаково часто
- 436. Наиболее частый вид гнойного поражения кожи у новорожденных детей
 - о пемфигус
 - о везикулопустилез
 - о болезнь Риттера
 - о псевдофурункулез
- 437. Причиной вторичного рецидивирующего омфалита является
 - о фингус пупочной ранки
 - о неполный инфицированный свищ пупка
 - о флегмона пупка
 - о "кожный пупок"
- 438. При дисахаридазной недостаточности характер стула
 - о гомогенный, желтый, со слизью
 - о жидкий, жирный, зловонный
 - о водянистый, кислый, трескучий
 - о обильный, замазкообразный, ахоличный
- 439. Недоношенному ребенку с внутриутробной гипотрофией, если толерантность его к пище неизвестна, следует рассчитывать питание
 - о на фактический вес
 - о на долженствующий вес
 - о на вес при рождении
 - о все ответы правильные
- 440. У недоношенных детей чаще встречаются пневмонии
 - о ранние бактериальные
 - о вирусно-бактериальные
 - о аспирационные
 - о абсцедирующие
- 441. По раннему развитию железодефицитной анемии наиболее угрожаемы недоношенные дети
 - о перенесшие после рождения тяжелые инфекции
 - о с внутриутробной гипотрофией
 - о незрелые к гестационному возрасту
 - о с общим отеком синдромом
- 442. Противоэпидемическую работу в домашнем очаге проводит
 - о участковый педиатр
 - о врач-бактериолог
 - о врач-иммунолог
 - о старшая мед.сестра
 - о зав. педиатрическим отделением
- 443. К реактивным состояниям новорожденных не относят
 - о физиологической эритемы
 - о милии
 - о мелены
 - о вагинального кровотечения
 - о опухания молочных желез
- 444. Супруги гетерозиготны по D(резус)-фактору. в случае рождения однойцевой двойни
 - о оба ребенка могут быть резус-положительны и гомозиготны по резус-фактору
 - о один из близнецов резус-отрицательный, другой положителен и гомозиготен по резус-фактору
 - о оба близнеца резус-положительны, один гомо-, другой гетерозиготен
 - о оба резус-отрицательны, один гомо-, другой гетерозиготен
 - о оба резус-отрицательны и гетерозиготны
- 445. При длительном применении инактивирует витамин D и способствует развитию рахита
 - о фенobarбитал
 - о бутадиян
 - о пиридоксальфосфат
 - о пенициллин
 - о дигоксин
- 446. При острой пневмонии основным фактором

- возникновения гипоксемии является
- о повышение температуры
- о поверхностное дыхание
- о повышение метаболизма
- о тахикардия
- о анемия
- 447. Целиакия**
- о развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни
- о приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти
- о спонтанно излечивается после 2 года жизни
- о сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника
- о 5) встречается чаще у мальчиков, чем у девочек
- 448. Развитие гипокальциемического судорожного синдрома способствует**
- о ацидоз
- о алкалоз
- о гиперкалиемия
- о гипопроteinемия
- о гиповентиляция
- 449. У детей раннего возраста фебрильные судороги**
- о наблюдают чаще в возрасте от 3 месяцев до 3 лет
- о в дальнейшем у 90% детей формируется эпилепсия
- о носят локальный характер
- о связаны с прорезыванием зубов
- о сопровождаются изменением ликвора
- 450. Олигурия не встречается при**
- о острой почечной недостаточности
- о эксикоза
- о мочекаменной болезни
- о сахарного диабета
- о сердечно-сосудистой недостаточности (периода декомпенсации)
- 451. К атопическому поражению кожи относится**
- о пеленочный дерматит
- о нейродерматит
- о себорейный дерматит
- о гнейс
- о контактное импетиго
- 452. В этиологии пневмонии в первом полугодии жизни меньшее значение имеет флора**
- о стафилококк
- о пневмококк
- о клебсиелла
- о синегнойная палочка
- 453. Диагностировать гнойный плеврит позволяет**
- о укорочение перкуторного звука и смещение органов средостения в больную сторону
- о усиление голосового дрожания
- о ослабленное дыхание с бронхофонией
- о укорочение перкуторного звука и смещение органов средостения в здоровую сторону
- 454. Причиной экспираторной одышки является**
- о стеноз гортани
- о пневмония
- о бронхоспазм
- о трахеит
- 455. Для атопической бронхиальной астмы не характерно**
- о повышенный уровень медиаторов аллергических реакций
- о высокий уровень иммуноглобулинов Е
- о наличие эозинофилов в мокроте

- о лейкоцитоз с выраженным палочкоядерным сдвигом
- 456. При "аспириновой" бронхиальной астме противопоказан**
- о тавегил
- о кверсалин
- о фенотерал
- о эуфиллин
- 457. При легком приступе бронхиальной астмы рекомендуется назначение**
- о эфедрин с адреналином
- о обильного щелочного питья, эуфиллина, щелочных ингаляций
- о (обильного щелочного питья, ингаляций будесонида)
- о неселективных бронхоспазмолитиков
- о димедрола с эфедрином
- 458. Обычно нет необходимости производить рентгенограмму грудной клетки для выявления увеличенных торакальных лимфоузлов**
- о 1) при лимфосаркоме
- о 2) при лимфогранулематозе
- о 3) при инфекционном мононуклеозе
- о 4) при лейкозе
- 459. У больного с широким открытым артериальным протоком вряд ли может наблюдаться**
- о усиленный разлитой верхушечный толчок
- о выбухание грудной клетки над областью сердца слева
- о "машинный" шум
- о цианоз и "барабанные пальцы"
- 460. Одышечно-цианотические приступы наблюдаются**
- о при дефекте межпредсердной перегородки
- о при тетраде Фалло
- о при открытом артериальном протоке
- о при дефекте межжелудочковой перегородки
- 461. При дерматомиозите наиболее часто наблюдается**
- о синдром Рейно
- о генерализованное поражение мышц
- о нейропатия
- о нефропатия
- 462. При ревматическом поражении суставов наблюдается**
- о утренняя скованность
- о рецидивирующий полиартрит
- о ночные локализованные боли
- о доброкачественное течение полиартрита
- 463. При митральной недостаточности систолический шум бывает**
- о нежный, короткий, непостоянный
- о грубый, с эпицентром в V точке
- о протяжный, дующий, связанный с I тоном, не исчезающий в динамике в V точке
- о протяжный, дующий, связанный с I тоном, стойкий в динамике и при перемене положения, с максимумом на верхушке сердца
- 464. Нестероидные противовоспалительные препараты не рекомендуются**
- о при ревматизме
- о при ревматоидном артрите
- о при тромбоцитопенической пурпуре
- о при посттравматическом артрите
- 465. Гипертензию может вызвать**
- о бруфен
- о неробол

- преднизолон
 - β-адреноблокаторы
- 466. Укажите интервал между реакцией Манту и последующей прививкой СОСТАВЛЯЕТ**
- 72 часа
 - 36 часов
 - 2 недели
 - 45 дней
 - 30 дней
- 467. Соотношение артериального давления правильно, когда**
- АД на руках и ногах одинаково
 - АД на руках выше, чем на ногах
 - АД на ногах выше, чем на руках на 20-30 мм рт. ст.
 - АД на ногах выше, чем на руках на 40-60 мм рт. ст.
- 468. Ребенка с впервые выявленной частой экстрасистолией следует**
- оставить дома, назначить постельный режим и противоревматическую терапию
 - ограничить физические нагрузки
 - оставить под наблюдением, назначить индерал внутрь
 - госпитализировать для обследования
- 469. Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при АД 90/60 мм рт. ст. целесообразнее с применения**
- адреналина внутривенно
 - дигоксина внутримышечно
 - индерала внутривенно
 - изоптина и кокарбоксилазы внутривенно
- 470. Тяжелый изолированный миокардит чаще наблюдается**
- при ревматизме
 - при септическом кардите
 - при поствирусном кардите
 - при системной красной волчанке
- 471. При инфекционно-токсической кардиопатии (дистрофии миокарда) наиболее целесообразно назначить**
- оротат калия
 - преднизолон
 - кордиамин
 - пенициллин
- 472. Для гипертрофической кардиомиопатии при ультразвуковом исследовании сердца характерно**
- гипертрофия межжелудочковой перегородки
 - увеличение полости левого желудочка
 - увеличение полости правого желудочка
 - гипертрофия предсердий
- 473. Диспансерное наблюдение у кардиоревматолога не требуется детям**
- с неполной блокадой правой ножки пучка Гисса
 - с синдромом увеличенного интервала QT
 - с синдромом Вольфа - Паркинсона - Уайта
 - с неполной АВ-блокадой
- 474. К нестероидным противовоспалительным препаратам не относится**
- пироксикам
 - напросин
 - дисферал
 - флугалин
- 475. Дрожание во 2-м межреберье слева чаще определяется**
- при дефекте межжелудочковой перегородки
 - при дефекте межпредсердной перегородки
 - при открытом артериальном протоке
 - при митральной недостаточности
- 476. Амилоидоз обычно не осложняется**
- ревматоидный артрит
 - лимфогранулематоз
 - болезнь Шенлейна - Геноха
 - хронический остеомиелит
- 477. Эуфиллин не может вызывать**
- тахикардии
 - экстрасистолии
 - атриовентрикулярной блокады
 - увеличения сердечного выброса
- 478. Наличие изжоги свидетельствует**
- о забросе желудочного содержимого в пищевод
 - о повышении кислотности желудочного содержимого
 - о диафрагмальной грыже
 - о язвенной болезни желудка
- 479. Не считается вибрационным симптом**
- Лепене
 - Ортнера
 - Пастернацкого
 - Образцова
- 480. О наличии рефлюкса из тонкой кишки в 12-перстную при исследовании осадка дуоденального содержимого свидетельствует**
- кристаллы холестерина
 - кристаллы билирубината кальция
 - лямблии
 - лейкоциты
- 481. Для гепаторенального синдрома характерно**
- развитие нефропатии при печеночно-клеточной недостаточности
 - появление желтухи при почечной недостаточности
 - сочетание печеночной и почечной недостаточности
 - наличие признаков патологии печени и почек
- 482. Для желтухи Жильбера характерно**
- непрямая гипербилирубинемия
 - ретикулоцитоз
 - повышение трансаминаз
 - прямая гипербилирубинемия
- 483. При печеночно-клеточной недостаточности не показано применение**
- эссенциале
 - преднизолон
 - ингибиторов ферментов (трасилол, контрикал и т.д.)
 - сульфаниламидов
- 484. Ведущим клиническим синдромом при хроническом энтерите является**
- боли в гипогастрии
 - синдром нарушенного всасывания
 - боли натошак
 - запоры
- 485. Показанием для проведения колоноскопии являются**
- спастический запор
 - повторные кровотечения из прямой кишки
 - простой запор
 - боли по ходу толстой кишки
- 486. Рвотой с кровью не сопровождается**
- носовое кровотечение
 - эзофагит (геморрагический, язвенный)
 - дискинезия желчевыводящих путей
 - портальная гипертензия с расширением вен пищевода

487. Не характеризует концентрационную функцию почек

- о проба Зимницкого
- о белок и белковые фракции
- о относительная плотность мочи
- о осмолярность мочи

488. К иммунокомплексным болезням относят

- о гломерулонефрит
- о пневмонию
- о вирусный гепатит
- о гастродуоденит

489. Нефротическая форма гломерулонефрита чаще развивается в возрасте

- о до 1 года
- о с 1 года до 7 лет
- о в пубертатном возрасте
- о в любом возрасте

490. Антибактериальная терапия больному с гломерулонефритом не назначается

- о при постстрептококковом гломерулонефрите
- о на фоне глюкокортикоидной терапии
- о при иммуносупрессивной терапии
- о при поддерживающем, прерывистом курсе преднизолона

491. Остеопороз чаще возникает При назначении

- о преднизолона
- о трентала
- о гепарина
- о лазикса

492. При гипотиреозе педиатр должен

- о назначить самостоятельно лечение
- о направить больного на консультацию к эндокринологу
- о назначить диетотерапию
- о назначить повторный осмотр через полгода

493. При врожденном первичном гипотиреозе не наблюдается

- о гиперхолестеринемия
- о задержка дифференцировки костей скелета
- о остеопороз
- о полиурия

494. Применение мерказолила, пропранолола и преднизолона показано

- о при диффузно-токсическом зобе III степени тяжелой формы
- о при гипотиреозе
- о при эутиреоидном увеличении щитовидной железы III степени, вегетососудистой дистонии
- о при сахарном диабете

495. Наиболее эффективное лечение микросфероцитарной анемии

- о спленэктомия
- о кортикостероиды
- о гемотрансфузии
- о гемосорбция

496. При гемолизе не наблюдается

- о лейкоцитоз
- о нейтрофилез
- о левый сдвиг нейтрофилов
- о нейтропения

497. Гематологический признак, не характерный для талассемии

- о мишеневидные эритроциты
- о базофильная пунктация эритроцитов
- о снижение осмотической устойчивости эритроцитов
- о повышение осмотической устойчивости эритроцитов

498. Правильная тактика применения препаратов железа

- о до нормализации гемоглобина
- о до нормализации гемоглобина и еще 3-4 недели
- о до нормализации сывороточного железа
- о в течение 2 недель

499. Не является гематологическим признаком железодефицитной анемии

- о 1) сниженный цветной показатель
- о 2) анизо-пойкилоцитоз
- о 3) нормобластоз
- о 4) гипохромия эритроцитов

500. Нетипичные изменения состава периферической крови при хроническом миелолейкозе

- о лейкоцитоз нейтрофильный
- о левый сдвиг до промиелоцитов, миелобластов
- о тромбоцитоз
- о лимфобласты в периферической крови

501. Полноту и качество диспансерного наблюдения за здоровьем детей отражают

- о число детей, находящихся на естественном вскармливании до 4 месяцев (в процентах)
- о число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья
- о динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года
- о частота осмотра педиатром

502. Перинатальная смертность это

- о число детей, умерших до года, на 1000 родившихся живыми
- о число мертворожденных (со сроком гестации > 28 недель) + число детей, умерших на первой неделе жизни, на 1000 родившихся живыми и мертвыми
- о число мертворожденных
- о число детей, умерших на первом месяце жизни

503. Созревание функциональных систем идет наиболее активно

- о в антенатальном периоде
- о в зависимости от системы
- о в неонатальном периоде
- о в постнатальном периоде

504. Резистентность пятилетнего Ребенка, который за последний год 5 раз болел ОРЗ

- о низкая
- о нормальная
- о сниженная
- о очень низкая

505. К целям второго дородового патронажа не относится

- о антенатальная профилактика рахита
- о назначение антибиотиков для профилактики гнойно-септических заболеваний ребенка
- о обучение матери правилам вскармливания и ухода за ребенком
- о подготовка уголка новорожденного
- о выяснения состояния здоровья беременной

506. Основной принцип закаливания при выборе закаливающей процедуры

- о постепенность
- о наличие положительной эмоциональной реакции на процедуру
- о учет возрастных и индивидуальных особенностей
- о систематичность

507. При нормальном развитии слуховых функций ребенок в возрасте 1 месяца

- о вздрагивает и мигает при резком звуке
- о прислушивается к голосу взрослого
- о находит глазами невидимый источник звука
- о узнает голос матери

508. Ребенка 2 месяцев с нормальным нервно-психическим развитием нецелесообразно

- о укреплять упор ног
- о учить брать игрушку из рук взрослого
- о развивать умение удерживать голову, лежа на животе
- о развивать "комплекс оживления"

509. Методикой специального закаливания часто болеющего ребенка 3 лет, в генеалогическом анамнезе у которого три родственника с гипертонической болезнью и один с сахарным диабетом является

- о интенсивное закаливание
- о испарительное закаливание
- о контрастный метод
- о постепенное снижение температуры

510. Ребенка 3 лет с перинатальной энцефалопатией в анамнезе впервые выявлен низкий рост (до 3-го центиля), Масса тела соответствует длине необходимо направить

- о к эндокринологу
- о к невропатологу
- о к ортопеду
- о к генетику

511. Для новорожденных, родившихся от матерей с сахарным диабетом, характерна

- о большая масса тела
- о гипогликемия
- о высокая частота респираторных расстройств
- о высокая частота пороков развития

512. В задачи кабинета здорового ребенка не входит

- о изучение фактического питания ребенка
- о расчет питания с последующей коррекцией
- о советы по лечению детей
- о пропаганда знаний по кулинарно-технологической обработке блюд для детей 1 года жизни

513. При гипогалактии не рекомендуется

- о полноценное питание
- о употребление жидкости в малом количестве
- о прием жидкости до и после кормления грудью
- о прием дрожжевого напитка

514. Расчет суточного объема пищи для новорожденных при массе тела при рождении 3000 г по формуле Тура

- о $70 \text{ мл} \cdot \text{число дней}$, при массе тела при рождении менее 3200 г
- о $70 \text{ мл} \cdot \text{число дней}$, при массе тела при рождении более 3200 г
- о $80 \text{ мл} \cdot \text{число дней}$, при массе тела при рождении менее 3200 г
- о $80 \text{ мл} \cdot \text{число дней}$, при массе тела при рождении более 3200 г

515. Сколько раз в день следует кормить ребенка в возрасте 4 месяцев до введения прикорма?

- о 7 раз
- о 6-5 раз
- о 4 раз
- о 3 раз
- о 8 раз

516. Суточная потребность в белке у детей после

введения прикорма при смешанном вскармливании составляет

- о 2 г/кг
- о 2,5 г/кг
- о 1,5 г/кг
- о 3 г/кг
- о 4 г/кг

517. На искусственное вскармливание ребенка переводят, если

- о грудное молоко отсутствует или составляет менее 1/5 суточного объема
- о грудное молоко составляет менее 1/3 суточного объема пищи
- о грудное молоко составляет более 1/3 суточного объема пищи
- о грудное молоко составляет более 1/5 суточного объема пищи

518. Прикормом не является

- о каша
- о овощное пюре
- о творог
- о кефир

519. Критерием оценки Эффективности питания у детей в возрасте от 1 года до 14 лет не является

- о тургор тканей
- о наследственность
- о масса и длина тела
- о уровень нервно-психического развития

520. При сниженной биологической ценности пищи на массу тела ребенка сильнее влияет

- о белковая недостаточность, особенно животных белков
- о недостаточность углеводов и жира
- о избыток углеводов и жира
- о недостаток витаминов и микроэлементов

521. Детей 1-го года жизни при фенилкетонурии не рекомендуется кормить

- о молочными смесями
- о соками
- о фруктовым пюре
- о овощным пюре

522. К наследственным нарушениям обмена билирубина не относится

- о болезнь Криглера - Найяра
- о болезнь Жильбера
- о болезнь Ротера
- о прегановая желтуха

523. При аллергических процессах чаще всего изменяется уровень иммуноглобулинов

- о А
- о G
- о M
- о E

524. Показания для введения докорма

- о ребенок отказывается от груди
- о мастит у матери
- о острое респираторное заболевание у матери
- о "голодный" крик ребенка
- о стойкая гипогалактия

525. В комплексную оценку физического развития у детей старшего возраста не входит

- о антропометрия
- о половая и зубная формулы
- о физиометрические показатели
- о гемодинамические показатели
- о психомоторное развитие

526. На развитие лекарственной аллергии не влияет

- о индекс сенсibilизации (или частота аллергической реакции) на лекарственный препарат
- о факторы лечения (дозировки, способы введения препарата)
- о генетические факторы
- о пол ребенка

527. Базисным препаратом в лечении респираторных алергозов является

- о супрастин
- о антил, задитен
- о эуфиллин
- о виллозен

528. В палатах для новорожденных физиологического отделения родильного дома поддерживается температура воздуха

- о не ниже 20°C
- о не ниже 22-24°C
- о не ниже 25°C
- о не ниже 26°C

529. Доношенность или недоношенность определяют

- о продолжительностью беременности
- о массой тела и ростом ребенка при рождении
- о признаками, характеризующими зрелость ребенка
- о совокупностью перечисленных показателей

530. Заболевание сахарным диабетом матери на состояние инсулярного аппарата у плода

- о тормозит функцию клеток инсулярного аппарата плода
- о активизирует клетки инсулярного аппарата
- о приводит к атрофии инсулярного аппарата
- о не оказывает никакого влияния

531. Наличие симптомов гиперфункции щитовидной железы в раннем неонатальном периоде у детей от матерей с тиреотоксикозом связано

- о с трансплацентарной передачей плоду тироксина
- о с трансплацентарной передачей плоду тиреотропного гормона
- о с трансплацентарной передачей плоду тиреостимулирующих иммуноглобулинов
- о с трансплацентарной передачей плоду тиреотропного гормона и тироксина

532. Острое воспаление среднего уха сопровождается болезненностью при надавливании на козелок у детей в возрасте

- о грудном
- о преддошкольном
- о дошкольном
- о младшем школьном
- о старшем школьном

533. Оптимальное интеллектуальное развитие ребенка обеспечивает

- о грудное вскармливание
- о искусственное вскармливание неадаптированными смесями
- о вскармливание искусственным смесями, обогащенными минеральными веществами и витаминами
- о смешанное вскармливание

534. Папула, везикула или пустула в месте инъекции после введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ может появиться

- о через 1 неделю
- о через 2-3 недели
- о через 4-6 недель

- о через 2-3 месяца

535. Препаратом выбора при лечении муковисцидоза является

- о абомин
- о трифермент
- о панкреатин
- о ораза

536. Изменения в лейкоцитарной формуле крови наиболее выражены при сепсисе

- о грам-отрицательной этиологии
- о грам-положительной этиологии
- о грибковой этиологии
- о любой этиологии

537. Для криза надпочечниковой недостаточности при адреногенитальном синдроме характерен

- о метаболический ацидоз
- о метаболический алкалоз
- о дыхательный ацидоз
- о дыхательный алкалоз

538. Наиболее частая локализация гнойного очага при пупочном сепсисе

- о пупочная ранка
- о околопупочная область
- о пупочные сосуды
- о передняя брюшная стенка

539. Полная транспозиция магистральных сосудов характеризуется

- о диффузным цианозом
- о одышкой
- о грубым систолическим шумом в сердце
- о тахикардией

540. У новорожденного ребенка при охлаждении до 32°C может наблюдаться

- о дыхательный ацидоз
- о дыхательный алкалоз
- о метаболический ацидоз
- о метаболический алкалоз

541. Самым частым осложнением пневмонии у недоношенных детей является

- о абсцедирование
- о плеврит
- о сердечная недостаточность
- о менингит

542. Заместительная гемотранфузия недоношенным детям с железодефицитной анемией показана при уровне гемоглобина

- о 150 г/л
- о 100 г/л
- о 90 г/л
- о 70 г/л

543. Наиболее существенным параметром, подтверждающим гемолитическую болезнь новорожденных по ABO-системе, следует считать

- о микросфероцитоз у ребенка
- о обнаружение иммунных антител анти-A и анти-B в крови матери
- о наличие у матери группы крови O, у ребенка - A(II) или B(III)
- о положительную прямую пробу Кумбса
- о снижение осмотической резистентности эритроцитов ребенка

544. Множественные истинные пороки развития характерны

- о ля энзимопатии
- о для эмбриопатии
- о для фетопатии
- о для патологии неонатального периода
- о для патологии перинатального периода

545. Наиболее важным показателем для генетической консультации женщины 36 лет, родившей ребенка с типичной болезнью Дауна является

- о возраст матери
- о генотип отца
- о состояние здоровья матери
- о генотип матери
- о повышенный радиационный фон

546. Витамин D

- о увеличивает продукцию паратгормона
- о способствует всасыванию Ca из желудочно-кишечного тракта
- о блокирует канальцевую реабсорбцию Ca
- о повышает уровень щелочной фосфатазы в крови
- о витамин D не влияет на указанные биологические эффекты

547. Бронхиолит у детей раннего возраста

- о легкое и кратковременное заболевание
- о обусловлен аллергическим компонентом
- о является ранним признаком бронхиальной астмы
- о приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких
- о не встречается

548. Начало диареи в первые недели жизни не характерно

- о для муковисцидоза
- о для целиакии
- о для недостаточности лактозы
- о для дефицита энтерокиназы
- о для любого заболевания

549. К метаболическому ацидозу приводит

- о профузный понос
- о пилоростеноз
- о синдром передозировки ингибиторов карбоангидразы
- о синдром врожденного дефицита карбоангидразы
- о гипербилирубинемия

550. При гипертермическом синдроме со спазмом сосудов начинать терапию следует с

- о введения диуретиков
- о немедленного охлаждения пузырями со льдом
- о введения симпатомиметиков
- о введения фенотиазиновых препаратов
- о β-адреноблокаторов

551. При УЗИ разная величина почек может определяться

- о при хроническом пиелонефрите
- о при нефрозе
- о при ренальном рахите
- о при гломерулонефрите
- о при гипертрофии почек

552. Преимущественную локализацию на коже лица в первый год жизни имеет

- о себорейный дерматит
- о экзема (атопический дерматит)
- о чесотка
- о строфулюс
- о псориаз

553. В этиологии пневмонии у редко болеющих детей после года ведущее значение имеет

- о пневмококк
- о стрептококк
- о стафилококк
- о клебсиелла

554. Гиперлейкоцитоз с резким нейтрофильным и

юным сдвигом типичен

- о для микоплазменной пневмонии
- о для пневмоцистной пневмонии
- о для синегнойной пневмонии
- о для стафилококковой пневмонии

555. Экзогенный аллергический альвеолит обусловлен чаще аллергией

- о на органическую пыль
- о на бактерии
- о на лекарства
- о на пищевые аллергены

556. Для атопической бронхиальной астмы характерен

- о I тип аллергической реакции
- о II тип аллергической реакции
- о III тип аллергической реакции
- о IV тип аллергической реакции

557. Из перечисленных препаратов пролонгированным является

- о эуфиллин
- о дипрофиллин
- о теопек
- о теоникол

558. Подростка, страдающего хроническим гломерулонефритом, следует ориентировать на специальность

- о библиотекарь
- о геолог
- о летчик
- о водитель
- о шахтер

559. В установлении нервно-артритического типа конституции помогают все перечисленные данные генеалогического анамнеза, кроме

- о наличия у деда подагры
- о наличия у родственников тугоухости
- о наличия у родственников аллергических заболеваний
- о наличия у родственников мигрени

560. При открытом артериальном протоке обычно не развивается

- о бактериальный эндокардит
- о отек легких
- о сердечная недостаточность
- о одышечно-цианотические приступы

561. При тетраде Фалло применяют

- о дигоксин
- о анаприлин
- о лазикс
- о целанид

562. Ребенок, перенесший в течении года 2 орви и обострение хронического тонзиллита, можно отнести в группу здоровья

- о первую
- о вторую
- о третью
- о четвертую
- о пятую

563. При ревматизме наибольшее диагностическое значение имеет

- о иммуноглобулины A
- о АСЛ-О
- о иммуноглобулины G
- о ревматоидный фактор

564. Ребенку с предварительным диагнозом "ревматизм" необходимо назначить

- о клинический анализ крови амбулаторно
- о биохимический анализ крови амбулаторно
- о консультацию кардиоревматолога

- о госпитализацию

565. При проведении профосмотра детей при переходе к предметному обучению проводят

- о тест Керна-Иерасика
- о Филиппинский тест
- о определяют весо-ростовой индекс
- о оценку нервно-психического развития
- о передают сведения на юношей в военкомат

566. Гипертензию может вызвать прием

- о индоцида
- о невиврамона
- о гепарина
- о нероболила

567. К острой сердечно-сосудистой недостаточности не относится

- о пароксизмальная тахикардия
- о обморок
- о коллапс
- о шок

568. Гипертония чаще всего наблюдается

- о при системной красной волчанке
- о при геморрагическом васкулите
- о при узелковом периартериите
- о при открытом артериальном протоке

569. Высокую гипертензию чаще обуславливает

- о порок развития сосудов почки
- о пиелонефрит
- о удвоение чашечно-лоханочной системы
- о наследственный нефрит

570. Лучшим препаратом для профилактики суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у ребенка в возрасте 3 месяцев является

- о резерпин
- о хинидин
- о дигоксин
- о фенобарбитал

571. При поствирусном миокардите наиболее часто отмечается

- о систолодиастолический шум
- о длинный дующий систолический шум на верхушке
- о мезодиастолический шум
- о мягкий, короткий систолический шум, глухие тоны

572. Наиболее точным методом определения сердечных границ является

- о пальпация
- о перкуссия
- о рентгеноскопия
- о рентгенография

573. Для дилатационной кардиомиопатии характерно

- о гипертрофия левого желудочка
- о увеличение полостей желудочков
- о гипертрофия правого желудочка
- о гипертрофия межжелудочковой перегородки

574. Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению

- о ревматизма
- о идиопатической кардиомиопатии
- о пароксизмальной тахикардии
- о перикардита

575. К нестероидным противовоспалительным препаратам относится

- о полькортолон
- о метипред

- о урбазон

- о пироксикам

576. Акцент II тона на легочной артерии наблюдается

- о при транспозиции аорты
- о при аномальных коронарных сосудах
- о при легочной гипертензии
- о при стенозе аорты

577. В диагностические критерии системной красной волчанки не входит

- о утренняя скованность суставов
- о (портальная гипертензия)
- о эритема на лице в виде "бабочки"
- о LE-клетки
- о антинуклеарный фактор

578. Риск развития патологии пищевода выше

- о при недостаточности эзофагокардиального отдела
- о при спастическом запоре
- о при гепатите
- о при дискинезии желчевыводящих путей

579. Конституциональный кетоацидоз реже всего дифференцируют

- о с вегетовисцеральными пароксизмами
- о с гельминтозом
- о с острым животом
- о с комой при сахарном диабете

580. При повторном исследовании, если первоначально определена секреторная недостаточность, в качестве стимулятора целесообразно использовать

- о гистамин
- о капустный сок
- о мясной бульон
- о хлеб с водой

581. Для холецистита не характерно

- о обнаружение СРБ при биохимическом исследовании желчи
- о утолщение стенки желчного пузыря при УЗИ
- о наличие в пузыре при УЗИ осадка гетерогенной эхоплотности
- о наличие лейкоцитов при микроскопии осадка желчи

582. Для хронического гепатита наиболее характерно

- о повышение трансаминаз в 1,5-2 раза по сравнению с нормой
- о повышение трансаминаз более чем в 2 раза по сравнению с нормой
- о гиперхолестеринемия
- о гипербилирубинемия

583. Определяющим клиническим признаком при циррозе печени является

- о увеличение печени и селезенки
- о увеличение и значительное уплотнение печени и селезенки
- о дистрофические изменения
- о желтуха

584. Поражение поджелудочной железы обязательно

- о при муковисцидозе
- о при кишечной инфекции
- о при скарлатине
- о при колите

585. В период обострения хронического энтерита не рекомендуется

- о капуста
- о мясное гаше
- о кисломолочные продукты

- о кисели

586. Прицельная биопсия обязательна

- о при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона
- о при спастическом запоре
- о при проктосигмоидите
- о при дисбактериозе

587. Объем мочевого пузыря у ребенка 3 месяцев составляет

- о 20-30 мл
- о 50 мл
- о 100 мл
- о 150 мл
- о 10-15 мл

588. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) характерно для

- о наследственного нефрита
- о тубулопатии
- о гломерулонефрита
- о дизметаболической нефропатии

589. Внутривенную урографию можно проводить

- о с 10-дневного возраста
- о с месячного возраста
- о с 6-месячного возраста
- о с 3 лет

590. Для нефротического синдрома характерно

- о значительная протеинурия, гипоальбуминемия
- о гипопиридемия
- о гипертония
- о гипофибриногенемия

591. Антибактериальная терапия при гломерулонефрите не включает

- о 5-нок
- о пенициллин
- о нитрофурановые препараты
- о гентамицин

592. Для врожденного первичного гипотиреоза не характерна

- о задержка психомоторного развития
- о длительно существующая желтуха новорожденных
- о сухость кожи
- о диарея (тахикардия)

593. Кормление грудью новорожденного ребенка должно проводиться в течение

- о 10-15 мин
- о 15-20 мин
- о 20-25 мин
- о 40-45 мин
- о 60 мин

594. При сахарном диабете I типа, диабетической гипогликемической коме не следует

- о вводить 40% раствор глюкозы
- о вводить подкожно 0.5-1.0 мл адреналина
- о накормить больного после выхода из комы
- о вводить инсулин

595. У девочки 14 лет высокорослость, булимия, жажда, ожирение III степени, розовые стрии на коже молочных желез, бедер, плеч, живота. Артериальное давление - 140/ 80 мм рт. ст. Ваш предварительный диагноз:

- о конституционально-экзогенное ожирение
- о гипоталамический синдром с нарушением жирового обмена
- о церебральное ожирение

596. Наиболее редко постгеморрагическую анемию вызывают

- о легочные кровотечения
- о носовые кровотечения

- о маточные кровотечения

- о желудочно-кишечные кровотечения

597. Основная причина наследственных несфероцитарных гемолитических анемий

- о нарушение активности ферментов эритроцитов
- о гиперспленизм
- о структурный дефект белков мембраны эритроцитов
- о иммунные процессы

598. При дефекте глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы провокатором гемолиза не является

- о нафталин
- о анилиновые красители
- о алкалоз
- о ацидоз

599. При сфероцитарной гемолитической анемии не назначают

- о профилактику тромбофилии
- о оксигенотерапию
- о препараты железа
- о гемотрансфузии

600. В финале гемобластоза отсутствует

- о кровоточивость
- о видимые новообразования
- о гирсутизм
- о гнойно-воспалительные процессы

601. Наиболее перспективной формой взаимодействия акушерской, педиатрической и терапевтической служб является

- о заполнение совместных документов
- о работа акушерско-терапевтико-педиатрического комплекса (АТПК)
- о совместный патронаж беременных
- о школа будущих матерей и отцов

602. Критерием школьной зрелости при подготовке детей к поступлению в школу, является

- о умение читать
- о умение писать
- о биологический возраст
- о положительный филиппинский тест
- о весо-ростовой показатель

603. Отражает гетерохронность развития и развивается ускоренными темпами на третьем году жизни ребенка

- о сердечно-сосудистая система
- о дыхательная система
- о двигательная система
- о пищеварительная система
- о психика ребенка

604. Часто болеющим можно считать ребенка в возрасте 2 лет если

- о острые заболевания в течение года отмечались 7 раз
- о обострения бронхиальной астмы наблюдались 2 раза в год и острые респираторные заболевания также 2 раза в год
- о на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые заболевания 3 раза в течение года
- о у ребенка хронический отит с частыми обострениями

605. Массаж является неотъемлемой частью воспитания здорового ребенка

- о до 6 месяцев
- о до 1 года
- о до 14 месяцев
- о до 10 месяцев

606. Детям 2-го и 3-го года жизни

- предпочтительнее проводить закаливание солнцем в виде
 - о специальных солнечных ванн
 - о пребывания в "кружевной" тени деревьев
 - о малоподвижных кратковременных игр на освещенном солнцем участке
 - о пребывания под прямыми лучами солнца
- 607. Специальные занятия гимнастикой и массажем со здоровым ребенком необходимы
 - о с рождения
 - о здоровому ребенку не нужны
 - о с полутора месяцев
 - о с 2 месяцев
- 608. Оценка нервно-психического развития ребенка 12 месяцев проводится по следующим линиям развития
 - о анализатор зрительный, анализатор слуховой, эмоциональные реакции, активная речь, понимание речи, движение руки
 - о движения общие, понимание речи, активная речь
 - о сенсорное развитие, понимание речи, активная речь, игра, движения общие, навыки
 - о движения общие, понимаемая речь, активная речь, действия с предметами, навыки
- 609. О необходимости перевода ребенка на режим более старшего возраста не свидетельствуют
 - о возраст ребенка
 - о длительное засыпание при укладывании на дневной сон
 - о раннее пробуждение после ночного сна и дневного сна
 - о активность в конце бодрствования
- 610. Ребенок в возрасте 1 месяца Посещает бассейн, Ни разу не болел, развитие соответствует возрасту, относится к группе здоровья
 - о первой
 - о второй
 - о третьей
 - о четвертой
- 611. Неблагоприятный прогноз состояния здоровья При значении индекса отягощенности генеалогического анамнеза
 - о 0,2-0,5
 - о 0,5-0,7
 - о 0,7 и выше
 - о генеалогический анамнез не имеет значения для прогноза
- 612. К основной документации кабинета здорового ребенка не относится
 - о картотека блюд прикорма и пищевых добавок
 - о карточки-раскладки
 - о сводный порционник
 - о схемы введения продуктов питания
- 613. При гипогалактии не используют
 - о никотиновую кислоту
 - о витамин Е
 - о апилак
 - о неробол
- 614. Здоровых новорожденных можно прикладывать к груди матери при отсутствии противопоказаний с ее стороны
 - о через сутки
 - о в первые 30 мин после рождения
 - о через 6 часов
 - о через 12 часов
- 615. Режим питания детей от 4 до 6 месяцев после введения прикорма
 - о 7 раз в сутки
 - о 6 раз в сутки
 - о 5 раз в сутки
 - о 3 раза в сутки
- 616. Суточная потребность в жире у детей первых 4 месяцев жизни при любом виде вскармливания составляет
 - о 7 г/кг
 - о 6,5 г/кг
 - о 5 г/кг
 - о 5,5 г/кг
- 617. Ночное кормление грудью матери
 - о показано всем детям
 - о показано недоношенным детям
 - о показано при гипотрофии
 - о уменьшает лактацию, так как нарушается сон матери
 - о показано при гипогалактии
- 618. Для первого прикорма не рекомендуют
 - о пшеничную кашу
 - о гречневую кашу
 - о кашу с добавлением сушеной моркови и тыквы
 - о каши из смеси разных круп
- 619. В меньшей степени К критериям эффективности питания детей 1 года жизни относится
 - о эмоциональный тонус
 - о одышка
 - о состояние кожи, подкожной клетчатки, костно-мышечной системы
 - о функциональное состояние желудочно-кишечного тракта
- 620. Суточная доза аскорбиновой кислоты для витаминизации питания детей в возрасте 6-12 лет составляет
 - о 40 мг
 - о 50 мг
 - о 60 мг
 - о 70 мг
- 621. При фенилкетонурии у детей в диете не допускается
 - о дефицит жира
 - о обогащение полиненасыщенными жирными кислотами
 - о избыток жира
 - о использование продуктов, содержащих фенилаланин в небольшом количестве
- 622. Опасность брака между родственниками заключается
 - о в бесплодии
 - о в возникновении мутации
 - о в повышенной вероятности встречи двух рецессивных генов
- 623. К показателям гуморального иммунитета относятся
 - о иммуноглобулины А, М, G
 - о иммуноглобулины Е
 - о реакция бласттрансформации лейкоцитов
 - о реакция розеткообразования
- 624. В развитии воспаления меньшее значение имеет
 - о гистамин
 - о гепарин
 - о серотонин
 - о простагландины
 - о ренин
- 625. При пищевой аллергии не рекомендуется
 - о морковный сок

- o сливовый сок
 - o черничный сок
 - o яблочный сок
- 626. На развитие лекарственной аллергии не влияет**
- o индекс сенсибилизации (или частота аллергической реакции) на лекарственный препарат
 - o факторы лечения (дозировки, способы введения препарата)
 - o генетические факторы
 - o пол ребенка
- 627. Для атопической формы бронхиальной астмы характерны следующие изменения показателей в сыворотке крови**
- o увеличение содержания общего IgE
 - o повышение уровня общего IgE и специфических IgE
 - o увеличенное содержание гистамина
 - o повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов
- 628. Если нет возможности создать всю систему специализированной помощи новорожденным, в первую очередь следует организовать**
- o отделение выхаживания недоношенных детей
 - o отделение патологии новорожденных
 - o отделение для новорожденных с поражением ЦНС
 - o отделение хирургии новорожденных
- 629. К инактивированным вакцинам относится**
- o клещевая
 - o оральная полиомиелитная
 - o паротитная
 - o коревая
 - o краснушная
- 630. Активный иммунитет вызывают**
- o вакцины
 - o иммуноглобулины
 - o бактериофаги
 - o эубиотики
 - o сыворотки
- 631. Действие на новорожденного переданных ему трансплацентарно от матери с тиреотоксикозом тиреостимулирующих иммуноглобулинов может сохраняться в течение**
- o 1 месяца
 - o 6 месяцев
 - o 1 года
 - o 2 лет
- 632. Центральные органы иммунной системы**
- o тимус и костный мозг
 - o селезенка и кровь
 - o селезенка и лимфатические узлы
 - o печень и селезенка
 - o печень и вилочковая железа
- 633. В углеводах грудного молока преобладает**
- o сахароза
 - o мальтоза
 - o β-лактоза
 - o галактоза
- 634. Наиболее часто судорожный синдром у новорожденных от матерей с сахарным диабетом вызывают**
- o асфиксия и родовая травма
 - o пороки развития ЦНС
 - o гипогликемия и гипокальциемия
 - o гипербилирубинемия
- 635. Для возникновения кишечных инфекций у доношенных новорожденных наиболее значимы**
- o эндогенная флора
 - o материнская флора
 - o госпитальные штаммы
 - o все в равной степени
- 636. Электролитные нарушения наиболее выражены**
- o при флегмоне
 - o при энтероколите
 - o при деструктивной пневмонии
 - o при гнойном менингите
- 637. При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективным является**
- o фототерапия
 - o лечение фенobarбиталом
 - o инфузионная терапия
 - o комбинация перечисленных методов
- 638. Показано ли введение консервированной крови с целью стимуляции иммунитета**
- o да
 - o нет
 - o только при наличии в консервированной крови высокого титра бактериальных антител
 - o только при условии предварительной иммунизации донора
- 639. Тугое пеленание может вызвать у новорожденного ребенка**
- o апноэ
 - o гиповентиляцию
 - o гипervентиляцию
 - o все перечисленное
- 640. Из гнойно-воспалительных заболеваний у недоношенных новорожденных чаще встречается**
- o флегмона
 - o остеомиелит
 - o пемфигус
 - o рожистое воспаление
- 641. Недоношенным детям предпочтительнее рассчитывать объем питания**
- o объемным методом
 - o калорийным методом
 - o по формуле Финкельштейна
 - o по формуле Тура
- 642. Самым частым метастатическим очагом при септикопиемической форме сепсиса у недоношенных детей является**
- o флегмона
 - o деструктивная пневмония
 - o перитонит
 - o менингит
- 643. У родившегося в срок ребенка в первую неделю жизни нарастала желтуха, которая стабильно сохраняется в течение 4 недель, появились запоры, брадикардия. это свидетельствует**
- o о сепсисе
 - o о гипотиреозе
 - o о ABO-гемолитической болезни
 - o о пилоростенозе
 - o о физиологической желтухе новорожденного
- 644. Достоверным признаком врожденной цитомегалии является**
- o микрофтальм и хориоретинит
 - o кальцификаты в веществе мозга
 - o остеопороз

- обнаружение характерных клеток в осадке мочи, слюне, ликворе
- менингоэнцефалит
- 645. Легкий вариант гемолитической болезни по резус-фактору можно ожидать когда**
 - отец ребенка гомозиготен по резус-фактору
 - бабушка ребенка со стороны матери резус-положительна
 - группа крови матери и ребенка совпадает
 - матери ребенка в детстве переливали кровь
 - у матери atopическое заболевание
- 646. Гипокальциемические судороги у недоношенных детей могут быть обусловлены**
 - недостаточной функцией паращитовидных желез
 - пониженной способностью почек экскретировать фосфор
 - применением цитратной крови
 - применением аскорбиновой кислоты
- 647. Цианоз слизистых и кожных покровов не нарастает при беспокойстве у детей при**
 - врожденном пороке сердца
 - метгемоглобинемии
 - пневмонии
 - ателектазе
 - крупе
- 648. Отдаленный прогноз при целиакии**
 - неблагоприятный
 - возможна незначительная коррекция
 - полное выздоровление
 - хороший на фоне постоянной медикаментозной терапии
 - хороший на фоне постоянного диетического лечения
- 649. Для гипотонической дегидратации характерно**
 - полидипсия
 - артериальная гипертензия
 - гиперрефлексия
 - брадикардия
 - низкие АД и ЦВД
- 650. При обструктивных уropатиях пиелонефрит**
 - встречается редко
 - является причиной обструкции
 - для указанной уropатии пиелонефрит не характерен
 - встречается очень часто
 - не связан с бактериальной флорой
- 651. При остром пиелонефрите у детей грудного возраста ведущим признаком является**
 - общая интоксикация организма
 - дизурические явления
 - синдром срыгивания
 - субфебрилитет
 - болевой синдром
- 652. Специфическая гипосенсибилизирующая терапия пищевой аллергии включает**
 - лечение желудочно-кишечного тракта
 - назначение антигистаминных препаратов
 - дробное введение "виновного" антигена
 - лечение гистаглобулином
 - назначение иммуномодулятора
- 653. Ведущим клиническим синдромом в диагностике пневмонии является**
 - одышка
 - ослабленное дыхание
 - крепитация локальная
 - многочисленные мелкопузырчатые хрипы
- 654. Отсутствие адекватной одышки в первые часы заболевания типично**
 - для очаговой пневмонии
 - для сегментарной пневмонии
 - для очагово-сливной пневмонии
 - для интерстициальной пневмонии
- 655. Для подтверждения экссудативного плеврита прежде всего показана**
 - латерограмма
 - томограмма
 - плевральная пункция
 - пневмотахометрия
- 656. Для ребенка школьного возраста в приступный период atopической бронхиальной астмы не характерно**
 - вздутие легочной ткани
 - перегрузка малого круга, усиление сосудистого рисунка
 - наличие воспалительных очаговых изменений
 - рассеянные сухие свистящие хрипы
- 657. При лечении астматического статуса не показаны**
 - эфедрин и его производные
 - кортикостероиды
 - эуфиллин
 - селективные симпатомиметики
- 658. Перепись детского населения в поликлинике проводится**
 - 2 раза в год
 - 1 раз в год
 - ежемесячно
 - один раз в квартал
 - один раз в 2 года
- 659. В группу риска по кардиальной патологии не относятся дети**
 - с синдромом Марфана
 - с синдромом Элерса - Данлоса
 - с синдромом укороченного интервала PQ
 - с синдромом Альпорта
- 660. Для планирования профилактических прививок в детской поликлинике оформляют учетные формы**
 - ф.№063/у и ф.№112/у
 - ф.№026/у и ф.№112/у
 - ф.№063/у и ф.№058/у
 - ф.№112/у и ф.№058/у
 - ф.№063/у и ф.№030/у
- 661. При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно**
 - ввести строфантин
 - дать кислород
 - назначить анаприлин (обзидан)
 - назначить промедол
- 662. При ревматоидном артрите не отмечается**
 - поражение мелких суставов
 - утренняя скованность суставов
 - длительное течение артрита
 - "летучесть" болей
- 663. При активном воспалительном процессе при ревматизме не характерен**
 - лейкоцитоз
 - увеличение СОЭ
 - лимфоцитоз
 - тромбоцитоз
- 664. Ребенку с предварительным диагнозом "ревматизм" целесообразно назначить дома до госпитализации**
 - преднизолон
 - бетамезон
 - дексаметазон
 - супрастин

- o аспирин + супрастин
- 665. Преднизолон не оказывает**
 - o противовоспалительного действия
 - o антигистаминного действия
 - o иммуносупрессивного действия
 - o антикоагулянтного действия
- 666. Гематологические осложнения могут иметь место при назначении**
 - o супрастина
 - o папаверина
 - o бруфена
 - o тавегила
- 667. При отеке легких не наблюдается**
 - o одышки
 - o ортопноэ
 - o большого количества влажных хрипов в легких
 - o учащенное мочеиспускание
- 668. Для выявления вазоренальной гипертензии наиболее информативным исследованием является**
 - o цистография
 - o измерение артериального давления на ногах
 - o внутривенная урография
 - o ренальная ангиография
- 669. Наиболее частой причиной возникновения желудочковой формы пароксизмальной тахикардии является**
 - o нейровегетативные сдвиги
 - o органическая патология сердца
 - o пневмония
 - o эндокринная патология
- 670. Для профилактики частых приступов суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии ребенку 10 лет с синдромом предвозбуждения желудочков более эффективен**
 - o анаприлин внутрь
 - o строфантин
 - o новокаиनाмид внутрь
 - o кордарон внутрь
- 671. Для постинфекционного миокардита характерно**
 - o СОЭ - 60 мм/ч
 - o гипер-γ-глобулинемия до 25%
 - o СОЭ - 25 мм/ч
 - o ДФА - 400 единиц оптической плотности
- 672. Увеличение границ сердца в наибольшей степени зависит от состояния**
 - o миокарда
 - o эндокарда
 - o подклапанных структур
 - o перикарда
- 673. Для выявления гипертрофической кардиомиопатии наиболее информативно**
 - o ЭхоКГ
 - o рентгенограмма
 - o радиоизотопное исследование
 - o ЭКГ + ФКГ + рентгенограмма
- 674. Для неполной атриовентрикулярной блокады I степени у ребенка 5 лет не характерно**
 - o PQ=0,18
 - o PQ=0,20
 - o PQ=0,25
 - o PQ=0,12
- 675. К гормональным противовоспалительным препаратам относятся**
 - o напросин
 - o ибупрофен

- o метипред
- o фенилбутазол
- 676. Снижение диастолического давления характерно**
 - o для анемии
 - o для открытого артериального протока
 - o для стеноза аорты
 - o для митральной недостаточности
- 677. Ингибитором простагландинов является**
 - o ретаболил
 - o аспирин
 - o тобромидин
 - o резерпин
- 678. При подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы необходимо провести**
 - o рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием с проведением водно-сифонной пробы
 - o фиброгастродуоденоскопию
 - o внутрижелудочную pH-метрию
 - o рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием
- 679. Для рвоты при кетоацидозе наиболее характерно**
 - o жидкий стул
 - o боли в животе
 - o головная боль
 - o ацетонурия
- 680. Показаниями для определения кислотности желудочного содержимого у детей являются**
 - o дизуретические явления
 - o голодные боли в эпигастриальной области
 - o боли при дефекации
 - o дисфагия
- 681. О задержке выброса желчи из желчного пузыря может свидетельствовать**
 - o белок
 - o холестерин
 - o тимоловая проба
 - o билирубин
- 682. Для диагностики хронического гепатита не информативным является**
 - o спленомегалия
 - o увеличение печени без ее уплотнения
 - o увеличение и уплотнение печени
 - o появление желтухи
- 683. Наименее информативно Для диагностики цирроза печени**
 - o радиоизотопное исследование с коллоидом
 - o радиоизотопное исследование с технецием
 - o эзофагогастродуоденоскопия
 - o ультразвуковое исследование
- 684. Реже осложняются панкреатитом**
 - o аллергические заболевания
 - o дискинезии 12-перстной кишки
 - o подпеченочный холестаз
 - o кишечные инфекции
- 685. Пассаж по тонкой кишке замедляет**
 - o имодиум
 - o соляная кислота с пепсином
 - o панкреатин
 - o вазелиновое масло
- 686. Парапроктиты характерны**
 - o для неспецифического язвенного колита
 - o для болезни Крона
 - o для проктосигмоидита
 - o для постинфекционного колита
- 687. Концентрация мочи у ребенка достигает уровня взрослого в возрасте**

- о 1-й недели
- о 5 лет
- о 6 месяцев
- о 10 лет

688. Преобладание нейтрофилов в мочевом осадке свидетельствует

- о о пиелонефрите
- о о тубуло-интерстициальном нефрите
- о о гломерулонефрите
- о о наследственном нефрите

689. Экстренное извещение заполняет врач

- о заподозривший инфекционную болезнь
- о подтвердивший диагноз инфекционной болезни
- о установивший границы эпидемического очага
- о лечащий врач больного
- о заполняет средний медицинский персонал

690. Для начала гломерулонефрита наиболее характерно

- о температурная реакция
- о абдоминальный синдром
- о олигурия
- о катаральные явления

691. Преднизолон часто применяется

- о при гломерулонефрите, нефротической форме
- о при сахарном диабете
- о при амилоидозе
- о при синдроме нарушенного кишечного всасывания

692. Для подтверждения диагноза сахарного диабета у ребенка особой важности не имеет наличие

- о гипербилирубинемии
- о гипергликемии
- о глюкозурии
- о наличия ацетона в моче

693. Девочки 10 лет. Ожирение II степени без признаков гиперкортицизма. Невропатолог патологии не выявил. Родители с избыточной массой. ваш диагноз

- о конституционально-экзогенное ожирение
- о гипоталамический синдром с нарушением жирового обмена
- о церебральное ожирение
- о синдром Лоренса - Муна - Бидля

694. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) не бывает

- о гиперпигментации кожи
- о желтушности кожи
- о похудания
- о общей слабости

695. У девочки 14 лет диффузное увеличение щитовидной железы III степени. Кожа влажная, горячая, Экзофтальмия. Положительные симптомы Грефе и Мебиуса. Тахикардия. Артериальное давление - 140/60 мм рт. ст. Установлен диагноз - «диффузный токсический зоб».

- о диагноз верен
- о диагноз не верен
- о необходимо исключить опухоль мозга
- о необходимо исключить ревматизм

696. Самая долгоживущая клетка

- о эритроцит
- о нейтрофил
- о тромбоцит
- о эозинофил

697. Увеличение эозинофилов и базофилов имеет

место

- о при остром лейкозе
- о при хроническом миелолейкозе
- о при бактериальной инфекции
- о при вирусной инфекции

698. Не повышает СОЭ Повышенное содержание

- о фибриногена
- о гаптоглобина
- о α2 и γ-глобина
- о альбумина

699. Повышенное содержание каких сывороточных белков может повысить СОЭ?

- о фибриногена
- о гаптоглобина
- о α2 и γ-глобина
- о альбумина

700. К гематологическим признакам микросфероцитарной анемии не относится

- о микросфероцитоз
- о ретикулоцитоз
- о снижение осмотической резистентности эритроцитов
- о положительная проба Кумбса

701. Чтобы засвидетельствовать отказ пациента от профилактической прививки необходимо

- о не менее 2-х медработников
- о достаточно главного врача учреждения
- о не менее 2-х медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-эпидемиологического надзора
- о не менее 2-х медработников ЛПУ и главного врача учреждения
- о не менее 2-х медработников ЛПУ и врача иммунолога

702. Коэффициент рождаемости определяется как

- о число родившихся детей (в процентах)
- о число родившихся детей (в промиллях)
- о отношение числа родившихся за год к общей численности населения (в процентах)
- о отношение числа родившихся за год к общей численности населения (в промиллях)

703. Основой для развития функциональной патологии ребенка не является

- о акцелерация синхронная
- о акцелерация асинхронная
- о ретардация асинхронная
- о ретардация синхронная

704. При хроническом заболевании показателем компенсации функционального состояния организма нельзя считать

- о уровень физического развития
- о уровень резистентности
- о уровень нервно-психического развития
- о показатели функциональных проб
- о отсутствие обострений

705. Главная задача специальных занятий гимнастикой с детьми раннего возраста

- о обеспечение созревания правильного качества движений
- о удовлетворение органической потребности в движении
- о приобретение различных двигательных "умений" (ходьба, лазание, метание)
- о воспитание чувства ритма

706. Показатель нервно-психического развития Ребенка в возрасте 2 года 6 месяцев:

- «подбирает к образцу предметы 4 цветов» не свидетельствует
- о морфологическом и функциональном

- о состоянии мозга
 - о наличии в повседневной практике ребенка деятельности, обогащающей восприятие цвета
 - о умении рисовать
 - о специальных занятиях с ребенком по различию цветов
- 707. Определите основную задачу утренней гимнастики для детей раннего возраста**
- о удовлетворение естественной потребности в движении
 - о воспитание качественного двигательного навыка
 - о воспитание потребности в движении после сна
- 708. У ребенка 2 месяцев: эмоциональные реакции - в ответ на общение быстро отвечает улыбкой; движения общие – длительно. нервно-психическое развитие**
- о нормальное
 - о опережение
 - о отставание
 - о мозаичное
- 709. Процесс доминантности руки завершается**
- о к 3 годам
 - о к 5 годам
 - о к 7 годам
 - о к 11 годам
- 710. Основным преимуществом применения лекарственных растений перед синтетическими стимуляторами при коррекции ранних отклонений в состоянии здоровья является**
- о мягкость действия
 - о меньшая токсичность
 - о широкий спектр действия
 - о отсутствие привыкания
- 711. Для прогноза частой заболеваемости ребенка раннего возраста менее значимыми сведениями из анамнеза является**
- о перинатальные осложнения
 - о профвредности матери
 - о раннее искусственное вскармливание
 - о аллергические заболевания у родственников
- 712. Организационная работа роддома по вопросам питания детей не включает**
- о пропаганды рационального вскармливания
 - о профилактики и борьбы с гипогалактией
 - о пропаганды естественного вскармливания
 - о контроля за массой тела ребенка
- 713. К правилам естественного вскармливания не относится**
- о режим питания до введения прикорма - 6 раз в сутки, после введения прикорма - 5 раз в сутки
 - о режим питания до введения прикорма - 6 раз в сутки, после введения прикорма - 5 раз в сутки
 - о введение пищевых добавок с 3-недельного возраста
 - о введение прикорма с 4,5-5-месячного возраста
- 714. Кратность питания здорового новорожденного с 10-го до 29-го дня жизни при достаточной лактации составляет**
- о 7 раз
 - о 6 раз
 - о 5 раз
 - о 4 раза
- 715. Суточная потребность в жидкости для детей первого года**
- о 250-200 мл/кг
 - о 200-150 мл/кг
 - о 150-100 мл/кг
 - о 100-50 мл/кг
- 716. У детей в возрасте 4-6 месяцев при любом виде вскармливания суточная потребность в жире равна**
- о 7 г/кг
 - о 6,5 г/кг
 - о 6 г/кг
 - о 5,5 г/кг
 - о 5 г/кг
- 717. К консервам, используемым в питании детей грудного возраста не относится**
- о "Чебурашка"
 - о сгущенное молоко с сахаром
 - о "Творог" (молокозавод Лианозово)
 - о "Птенчик"
- 718. Проведение на дому профилактических прививок против туберкулеза**
- о недопустимо
 - о возможно в любом случае
 - о возможно прививочной бригадой
 - о возможно с разрешения главного врача
 - о возможно с разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора
- 719. Клинико-биологические критерии эффективности питания детей 1-го года жизни нельзя оценить по данным**
- о белка и белковых фракций
 - о лейкоцитов мочи
 - о иммунологических показателей крови
 - о копрологии
- 720. Особенно сильно изменяет иммунореактивность детей недостаток**
- о холестерина
 - о триглицеридов
 - о полиненасыщенных жирных кислот
 - о ненасыщенных жирных кислот
- 721. На фоне лечения лактиком необходима диетическая коррекция**
- о калийсодержащими продуктами
 - о продуктами, содержащими пищевые волокна
 - о ограничением поваренной соли
 - о кисломолочными продуктами
- 722. Достоверное определение пола при вирильной форме аденогенитального синдрома возможно путем**
- о пальпации яичек
 - о определения 11-оксикортикостероидов
 - о определения полового хроматина
 - о определения кариотипа
- 723. Количество Т-лимфоцитов в периферической крови в норме колеблется в пределах**
- о 15-20% общего числа лимфоцитов
 - о 90-100% общего числа лимфоцитов
 - о 60-80% общего числа лимфоцитов
 - о 20-40% общего числа лимфоцитов
- 724. Механизм истинной аллергической реакции не определяет**
- о увеличение содержания циркулирующих иммунных комплексов в крови
 - о повышенная выработка иммуноглобулина Е
 - о сенсibilизация лимфоцитов
 - о увеличенное выделение гистамина без выработки антител
- 725. Редко встречающейся кожной формой пищевой аллергии является**
- о себорейный дерматит

- о крапивница
- о токсидермия
- о атопический дерматит

726. Профилактическая вакцинация ребенка при обострении хронического заболевания

- о проводится после окончания обострения, и после нормализации температуры и клинических показателей
- о проводится через 1 месяц после нормализации температуры
- о проводят через 2 недели после окончания обострения
- о в этих случаях можно проводить по плану
- о проводят через 2 месяца после окончания обострения

727. Исследованием подтверждающим эозинофилию, обусловленную атопией является

- о анализ кала на яйца глистов
- о определение содержания гистамина в крови и моче
- о определение уровня общего IgE
- о определение концентрации IgM

728. Основные пути передачи внутрибольничной инфекции

- о через руки персонала
- о через продукты питания
- о через белье
- о через предметы ухода

729. Плод способен вырабатывать антитела при встрече с антигеном

- о с 3-4 месяцев внутриутробного развития
- о с 5-6 месяцев внутриутробного развития
- о с 7-8 месяцев внутриутробного развития
- о с 9 месяца внутриутробного развития

730. При врожденном сифилисе у плода поражается в первую очередь

- о кожа и слизистые оболочки
- о кости
- о печень
- о центральная нервная система

731. При развитии сильной реакции или осложнения на предыдущую дозу вакцины дальнейшую иммунизацию проводят

- о другим препаратом
- о тем же препаратом под наблюдением врача
- о тем же препаратом после подготовки
- о тем же препаратом через 12 месяцев
- о тем же препаратом после разрешения иммунолога

732. Противопоказанием к иммунизации является наличие у ребенка

- о сильной реакции или осложнения введения предыдущей дозы вакцины
- о увеличения тени тимуса
- о перинатальной энцефалопатии.
- о анемии легкой степени тяжести
- о при наличии субфебрильной температуры

733. Показания для АДС-М вакцинации

- о дети, переболевшие коклюшем
- о дети, имеющие противопоказания к АКДС; подростки и взрослые
- о дети до трех лет, не болевшие коклюшем; подростки и взрослые
- о профилактика дифтерии и столбняка у детей с 6 летнего возраста, подростков и взрослых
- о профилактика дифтерии и столбняка у детей до 6 летнего возраста

734. Возможность развития флегмоны

новорожденных только в неонатальном периоде обусловлена

- о высокой проницаемостью кожных покровов новорожденного
- о особенностями строения сосудистой сети кожи и подкожной клетчатки
- о особенностями иммунитета новорожденного
- о особенностями центральной нервной системы новорожденного

735. Наиболее тяжелые формы кишечных инфекций у новорожденных вызывают

- о грам-положительные бактерии
- о грам-отрицательные бактерии
- о вирусы
- о все в одинаковой степени

736. Клинические симптомы сепсиса у новорожденных детей

- о наличие множества гнойных очагов
- о тяжелая сердечная недостаточность
- о гипертермия, угнетение сознания, диспепсические расстройства
- о нарушение терморегуляции, диспепсические расстройства, неврологические симптомы, нарушение свертываемости крови и ОЦК

737. Наиболее часто у новорожденных, перенесших асфиксию в родах встречается

- о пилороспазм
- о ахалазия пищевода
- о высокая кишечная непроходимость
- о некротизирующий энтероколит

738. Успех в лечении сепсиса у новорожденных детей определяет

- о комплексная терапия с момента госпитализации ребенка
- о противошоковая терапия
- о своевременное заменное переливание крови
- о ранняя диагностика, идентификация возбудителя и его чувствительности к антибиотикам

739. Период полового созревания характеризуется

- о ускорением темпов роста и прибавки массы
- о замедлением нарастания массы тела
- о сформированными вторичными половыми признаками
- о устойчивой вегетативной регуляцией
- о законченным периодом роста

740. Для недоношенного ребенка с развернутой картиной внутриутробного сепсиса в периферической крови наиболее характерны

- о лейкоцитоз со сдвигом формулы влево
- о лимфоцитоз
- о моноцитоз
- о лейкопения

741. Соотношение сладких и кислых молочных смесей в суточном рационе ребенка при искусственном вскармливании должно составлять

- о 4:1
- о 2:1
- о 1:1
- о 1:2
- о 1:4

742. Гнойный менингит у недоношенных новорожденных чаще всего развивается на фоне

- о субарахноидального кровоизлияния
- о паренхиматозного кровоизлияния
- о внутриутробной гипотрофии
- о незрелости

743. Гемолитическую болезнь новорожденных по АВО-системе антигенов наблюдают

- о только у зрелых доношенных детей
- о только у детей от повторной беременности
- о у детей с группой крови O(I)
- о чаще у детей с группой крови A(II) от матерей с O(I) группой крови
- о у детей от резус-положительного отца

744. Основная причина физиологической желтухи новорожденного

- о гемолиз
- о недостаточная глюкуронизация
- о сгущение крови
- о холестаз
- о гипогликемия

745. Среди всех заболеваний у детей преобладают

- о хромосомные
- о генные (энзимопатия)
- о болезни с наследственным предрасположением
- о врожденные инфекции (токсоплазмоз, цитомегалия)
- о заболевания на фоне транзиторной незрелости иммунитета

746. Краниотабес отсутствует

- о при D-дефицитном рахите
- о при D-зависимом рахите
- о при остеопорозе
- о у недоношенного и незрелого ребенка

747. Практически не встречается в раннем детском возрасте

- о бронхопневмония
- о аспирационная пневмония
- о лобарная пневмония
- о абсцедирующая пневмония
- о пневмоцистная

748. Для приготовления пищи при глютеининдуцированной целиакии рекомендуют использовать

- о пшеничную муку
- о ржаную муку
- о овсяные хлопья
- о манную крупу
- о кукурузную муку

749. Водедефицитному эксикозу соответствует

- о холодная пастозная кожа
- о полидипсия
- о повышение белка и цитоза в ликворе
- о гипонатриемия
- о полиурия

750. Наиболее частой причиной пиелонефрита является

- о удвоение почки
- о нефроптоз
- о пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- о поликистоз

751. При остром пиелонефрите у детей грудного возраста ведущим признаком будет

- о общая интоксикация организма
- о дизурические явления
- о синдром срыгивания
- о субфебрилитет
- о болевой синдром

752. Антигистаминные препараты наиболее эффективны

- о при атопическом дерматите
- о при псевдоаллергических реакциях
- о при цитотоксических реакциях
- о при контактном дерматите

- о при иммунокомплексных заболеваниях

753. Гипертермия с ознобом в первые часы заболевания типична

- о для стафилококковой пневмонии
- о для микоплазменной пневмонии
- о для пневмоцистной пневмонии
- о для пневмококковой пневмонии

754. Соотношение пульса и дыхания 1:1 типично

- о для стафилококковой пневмонии
- о для пневмококковой пневмонии
- о для цитомегалической пневмонии
- о для пневмоцистной пневмонии

755. Для выявления междолевого выпота показана

- о томография
- о рентгенограмма в боковой проекции
- о плевральная пункция
- о прямая рентгенограмма

756. Для постановки диагноза атопической бронхиальной астмы диагностически значимо

- о определение IgE
- о бронхоскопия
- о ведение пищевого дневника
- о эозинофилия

757. При бронхиальной астме применение антигистаминных препаратов возможно только в сочетании

- о с обильным щелочным питьем
- о с муколитиками
- о с бронхоспазмолитиками
- о с комплексом перечисленных средств

758. Школьник, перенесший пневмонию, может приступить к занятиям по физкультуре

- о через 2-4 нед после выздоровления
- о через 1-2 мес
- о через 3-4 мес
- о через 5-6 мес
- о через 12 мес

759. Заболевания суставов чаще развиваются у детей

- о с экссудативно-катаральной конституцией
- о с лимфатической конституцией
- о с нервно-артритической конституцией
- о с перинатальной энцефалопатией

760. Выраженный общий цианоз наблюдается

- о при атрезии трехстворчатого клапана
- о при коарктации аорты
- о при открытом артериальном протоке
- о при дефекте межжелудочковой перегородки

761. К врожденным порокам сердца, которые лечат оперативно в первые годы жизни ребенка не относится

- о открытый артериальный проток
- о коарктация аорты
- о транспозиция крупных сосудов
- о открытое овальное окно

762. Ревматоидный артрит характеризуется

- о сочетанием с эндокардитом
- о летучим характером поражения суставов
- о циклическим течением с полным и быстрым обратным развитием
- о наличием остаточных деформаций

763. При тяжелой атаке ревматизма чаще отмечается

- о изолированный тяжелый миокардит
- о изолированный перикардит
- о изолированный эндокардит
- о эндомиокардит

764. В начальный период ревматической атаки

- показано применение
- о пенициллина
- о цефопина
- о левомицетина
- о бициллина
- 765. При лечении больного цитостатическими иммуносупрессантами необходимо назначать регулярно
 - о консультацию окулиста
 - о полный анализ крови
 - о рентгенографию (для выявления остеопороза костей)
 - о измерение артериального давления
- 766. Более быстрое диуретическое действие оказывает
 - о гипотиазид
 - о лазикс
 - о фонуриг
 - о урегит
- 767. К проявлениям острой сердечно-сосудистой недостаточности не относится
 - о бледность кожных покровов
 - о нитевидный пульс
 - о падение артериального давления
 - о гиперемия кожи
- 768. Из перечисленных пороков с артериальной гипертензией протекает
 - о стеноз легочной артерии
 - о стеноз аорты
 - о коарктация аорты
 - о дефект межпредсердной перегородки
- 769. Для диагностики пароксизмальной тахикардии срочным исследованием является
 - о рентгенография
 - о ЭКГ
 - о ФКГ
 - о исследование калия в крови
- 770. Ребенок, страдающий пароксизмальной тахикардией нейровегетативного генеза, может заниматься физкультурой в школе в общей группе
 - о через 1 месяц после приступа
 - о через 6 месяцев после приступа
 - о через 1 год после приступа
 - о через 5 лет после приступа
- 771. Острый воспалительный процесс в меньшей степени характеризует
 - о уровень иммуноглобулина IgG
 - о мочевины
 - о С-реактивный белок
 - о сialовая реакция
- 772. Для правильной оценки звуков сердечной деятельности аускультацию ребенка необходимо проводить в положении
 - о лежа и стоя
 - о стоя
 - о лежа
 - о сидя
- 773. PQ при синдроме преждевременного возбуждения желудочков (синдроме Вольфа - Паркинсона - Уайта) составляет
 - о 0,14 с
 - о 0,10 с
 - о 0,18 с
 - о 0,20 с
- 774. Для неполной атриовентрикулярной блокады I степени у ребенка 14 лет характерно
 - о PQ=0,22

- о PQ=0,18
- о PQ=0,16
- о все указанные величины
- 775. Наибольшим кумулятивным действием обладает
 - о целанид
 - о дигоксин
 - о дигитоксин
 - о ланикор
- 776. Низкий рост, грубые черты лица, деформация позвоночника, увеличение печени и селезенки, патологии глаз характерны
 - о для гликогеноза
 - о для мукополисахаридоза
 - о для галактоземии
 - о для болезни де Тони - Дебре - Фанкони
- 777. Форма сердца на рентгенограмме в виде "деревянного голландского башмачка" характерна
 - о для перикардита
 - о для аномального тотального дренажа легочных вен в верхнюю полую вену
 - о для тетрады Фалло
 - о для коарктации аорты
- 778. Для выявления варикозного расширения вен пищевода наиболее информативным исследованием является
 - о гастрофибродуоденоскопия
 - о рентгенография желудочно-кишечного тракта с барием
 - о исследование кала на скрытую кровь
 - о анализ крови
- 779. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови при кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на
 - о сахар
 - о протромбин
 - о билирубин
 - о остаточный азот
- 780. При синдроме "раздраженного желудка" не характерна
 - о изжога
 - о рвота
 - о кровь в кале
 - о отрыжка
- 781. Необязательны для лечения дисхолии
 - о гепатотропные препараты
 - о антиоксидантные препараты
 - о антимикробные препараты
 - о желчегонные препараты
- 782. Наиболее информативно в отношении хронического гепатита
 - о ультразвуковое исследование
 - о радиоизотопное исследование печени
 - о радиоизотопное исследование печени с технецием
 - о радиоизотопное исследование печени в динамике
- 783. При циррозе печени предпочтительнее употреблять пищу
 - о отварную
 - о жареную
 - о запеченую
 - о сырую
- 784. Для приступа панкреатита не характерны
 - о боли в гипогастрии
 - о вздутие живота
 - о запор

- о диарея

785. Для стеатореи II типа характерно наличие в кале

- о жирных кислот
- о нейтрального жира
- о йодофильной флоры
- о зерен крахмала

786. Для абдоминального синдрома, связанного с заболеванием толстой кишки не характерны боли

- о в животе по ходу толстой кишки
- о в правом подреберье
- о в эпигастрии
- о в области ануса после дефекации

787. В понятие нефрон входит

- о клубочек и система канальцев
- о проксимальный и дистальный канальцы
- о клубочек
- о проксимальный и дистальный канальцы, петля Генле

788. Морфологическую характеристику можно уточнить при количестве в моче лейкоцитов

- о 2-5 в поле зрения
- о 30 и более в поле зрения
- о 5-10 в поле зрения
- о при любом количестве лейкоцитов в осадке мочи

789. Продолжительность диспансерного наблюдения за детьми с дискинезией желчевыводящих путей после обострения составляет

- о 1 год
- о 2 года
- о 3 года
- о 5 лет
- о до перевода во взрослую сеть

790. Гломерулонефрит чаще развивается

- о на фоне респираторного заболевания
- о через 7-14 дней после респираторного заболевания
- о через два месяца после переохлаждения
- о через 30 дней после простуды

791. Артериальное давление путем изменения водно-электролитного баланса снижает

- о дихлотиазид
- о дибазол
- о натрия нитропруссид
- о резерпин

792. Для первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна) не характерно

- о повышение сахара в крови
- о полиурия
- о артериальная гипертензия
- о мышечная слабость

793. Для болезни Иценко - Кушинга не характерно

- о артериальная гипотензия
- о неравномерное отложение жира
- о стрии
- о остеопороз и задержка роста

794. У девочки 3 лет полиурия, дефицит веса 10%, кожа и язык сухие, гиперемия щек, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, печень +3 см. Гликемия натощак - 12.8 ммоль/л. В моче 6% сахара при суточном диурезе 2.5 литра. Предварительный диагноз:

- о почечная глюкозурия
- о инсулинозависимый сахарный диабет
- о несахарный диабет
- о нарушение толерантности к углеводам

795. Оссалгии при гемобластозах у детей не дифференцируют с

- о полиартритом
- о геморрагическим васкулитом
- о подагрой
- о остеомиелитом

796. Наиболее достоверно для верификации диагноза острого лейкоза

- о исследование анализа периферической крови
- о производство миелограммы
- о биохимическое исследование
- о исследование кариотипа

797. Клиническим признаком лимфогранулематоза не является

- о увеличение лимфоузлов
- о гепатоспленомегалия
- о исхудание, дистрофия
- о пурпура

798. Основной диагностический симптом при ксантоматозе Хенда - Шюллера - Кристана

- о сахарная кривая
- о очаги остеолитиза на рентгенограммах плоских костей
- о экзофтальм
- о специфические клетки в пунктате костного мозга

799. Спленомегалия не характерна для

- о врожденного сифилиса
- о малярии
- о лямблиоза
- о токсоплазмоза

800. Затянувшийся паротит следует дифференцировать

- о с синдромом Микулича при лейкозе
- о с лимфаденитом
- о с инфекционным мононуклеозом
- о с токсической дифтерией

801. Зная число обследованных детей и общее количество всех заболеваний, можно вычислить

- о число детей часто и длительно болеющих (в процентах)
- о структуру заболеваемости (в процентах)
- о индекс здоровья
- о интенсивный показатель частоты заболеваний

802. Эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий, проведенных в дошкольных учреждениях не оценивается по

- о структуре заболеваемости в процентах
- о числу случаев острых заболеваний на 100 детей

- о полноте охвата медицинскими осмотрами
- о числу детей, взятых на диспансерный учет

803. Предельное число малых аномалий развития, которое может встречаться у здоровых людей

- о 1-2
- о 3-4
- о 5-7
- о 8-10

804. Если ребенок 8 месяцев не выполняет упражнения "присаживание из положения на спине, держась за кольца", то у него имеет место слабость

- о мышц живота
- о мышц ног
- о мышц спины
- о мышц рук

805. Ребенку 9 месяцев. Четыре раза переболел

- острыми респираторным инфекциями;
физкультурой никогда не занимался. ему
показан комплекс упражнений
- о возрастной
- о на возраст ниже
- о ЛФК
- о пограничный
- 806. Для игры ребенка в возрасте 1 года 6 месяцев характерно
 - о воспроизводит в игре разученные действия
 - о отображает в игре отдельные действия
 - о игра носит сюжетный характер
 - о наличие элементов ролевой игры
- 807. К расслабляющему массажу относят прием
 - о поглаживание
 - о растирание
 - о разминание
 - о поколачивание
- 808. Ребенку 12 месяцев (обратился впервые). при проверке НПР выяснилось, что у него: речь активная соответствует 12 мес, понимание речи - 12 мес, движения общие - 7 мес, навыки - 8 мес. правильная тактика врача заключается в
 - о назначении консультации невропатолога
 - о назначении возрастных рекомендаций
 - о назначении рекомендаций дифференцированно, в соответствии с уровнем развития по каждому показателю
- 809. Особенности поведения для леворуких детей
 - о "зеркальное" мышление
 - о недостаточность зрительно-пространственной ориентировки
 - о повышенная эмоциональность, высокий уровень тревожности, затруднения в планировании своего поведения
 - о выраженная агрессивность
 - о сниженный интеллект
- 810. Свойства лекарственных растений лучше сохраняются в виде
 - о настоя
 - о отвара
 - о экстракта
 - о не имеет значения
- 811. Линии развития, по которым нельзя сделать заключение о нервно-психическом развитии ребенка в возрасте 1 месяца
 - о состояние зрительных функций
 - о состояние слуховых функций
 - о движения
 - о эмоциональные реакции
 - о понимание речи
- 812. К преимуществам Естественного вскармливания перед другими видами вскармливания не относится утверждение
 - о легче кормить ребенка
 - о имеется оптимальное количество и качество компонентов
 - о содержатся активные вещества (гормоны, простагландины)
 - о присутствуют факторы иммунологической защиты
- 813. В молозиве по сравнению с переходным женским молоком больше содержится
 - о белка
 - о углеводов
 - о фосфора
 - о насыщенных жирных кислот
- 814. Питание недоношенных I степени назначается
 - из расчета
 - о белков и углеводов на фактическую массу тела
 - о белков и углеводов на должную массу тела
 - о жиров на должную массу тела
 - о всех пищевых компонентов на фактическую массу тела
- 815. Число кормлений детей в возрасте от 7 до 12 месяцев составляет
 - о 7 раз в сутки
 - о 6 раз в сутки
 - о 5-4 раз в сутки
 - о 3 раза в сутки
- 816. Суточная потребность в жирах при любом виде вскармливания у детей в возрасте 7-12 месяцев составляет
 - о 7 г/кг
 - о 6,5 г/кг
 - о 6 г/кг
 - о 5,5 г/кг
- 817. Адаптированной молочной смесью является
 - о "Крепыш"
 - о "Здоровье"
 - о "Биолакт"
 - о "Детолакт"
- 818. К характерным осложнениям после введения ацкс относятся
 - о пронзительный крик, судороги
 - о некроз мягких тканей
 - о повышение температуры до 38 градусов
 - о отек Квинке
 - о субфебрильная температура в течение 2-3 дней
- 819. Чаще всего осложнения на прививку ацкс проявляются
 - о в первые три дня
 - о сразу после внедрения
 - о через 2 недели
 - о на 8-10 день
 - о в первую неделю
- 820. К энергозатратам не относятся
 - о основной обмен
 - о расход энергии на двигательную активность, рост и развитие
 - о специфически-динамическое действие пищи
 - о поступление энергии с пищей
- 821. Во время лечения верошпином необходима диетическая коррекция в виде
 - о назначение диеты в соответствии с заболеванием
 - о добавление сухофруктов (курага, изюм, чернослив)
 - о добавление белковосодержащих продуктов
 - о увеличение кисломолочных продуктов
- 822. Не характерно для гипотиреоза
 - о макроглоссия
 - о злаяжная желтуха
 - о наклонность к гипотермии
 - о преждевременное закрытие родничка
 - о запор
- 823. Количество В-лимфоцитов в периферической крови в норме составляет
 - о 40-60% от общего числа лимфоцитов
 - о 15-23% от общего числа лимфоцитов
 - о 60-100% от общего числа лимфоцитов
 - о 1-5% от общего числа лимфоцитов
- 824. Механизм псевдоаллергической реакции заключается в

- о выработке антител к аллергену
- о повышенной выработке иммуноглобулина Е
- о сенсibilизации лимфоцитов
- о усиленной выработке (либерации) гистамина без выработки антител

825. Тип аллергической реакции наиболее характерный для пищевой аллергии

- о 1 тип - реактивный
- о 2 тип - цитотоксический
- о 3 тип - иммунокомплексный
- о 4 тип - реакция замедленного типа

826. К наиболее характерным симптомам крапивницы у детей не относится

- о зуд кожи
- о наличие экзематозного и лихеноидного синдромов
- о высыпания в виде пятен и волдырей
- о артралгии

827. Психозомоциональные факторы могут вызывать астму напряжения посредством

- о выброса адреналина
- о гипервентиляции и раздражения ирритантных рецепторов
- о активацией блуждающего нерва

828. Перинатальный период длится

- о с момента рождения до 7 дня жизни
- о с момента оплодотворения до родов
- о с 28-й недели внутриутробного развития до 7 дня жизни
- о с 28-й недели внутриутробного развития до 1 месяца жизни

829. Характерным осложнением для врожденной краснухи является

- о хориоретинит
- о катаракта
- о миокардит
- о геморрагический синдром

830. К клиническим формам внутриутробной бактериальной инфекции не относится

- о аспирационная пневмония
- о язвенно-некротический эзофагит, гастроэнтерит, перитонит
- о гнойный лептоменингит, остеомиелит
- о миокардит

831. Специфическая иммунопрофилактика детей из группы диспансерного наблюдения проводится

- о по индивидуальному календарю
- о по общепринятому календарю
- о прививки противопоказаны
- о прививают через 6 мес. после снятия с учета
- о прививают через 12 мес. после снятия с учета

832. Систему гемостаза у новорожденных детей не характеризует

- о повышенная проницаемость капилляров
- о сниженная функциональная активность тромбоцитов
- о низкая активность факторов свертывания крови
- о высокая активность факторов свертывания крови

833. Из факторов неспецифического иммунитета в защите слизистых оболочек от патогенной микрофлоры ведущую роль играет

- о интерферон
- о лизоцим
- о пропердин
- о система комплемента

834. Для новорожденных от матерей с сахарным

диабетом не характерна

- о гипогликемия
- о гипокальциемия
- о гипербилирубинемия
- о гиперкальциемия

835. Основным признаком кишечной инфекции при проведении дифференциального диагноза с неинфекционной диареей

- о кратность и характер стула
- о эксикоз и дистрофия
- о острое начало, инфекционный токсикоз, симптомы энтероколита
- о зависимость кишечного синдрома от вскармливания

836. У новорожденного ребенка в возрасте 5-6 суток при развитии судорожного синдрома следует исключить в первую очередь

- о родовую травму ЦНС
- о порок развития головного мозга
- о метаболические нарушения
- о гнойный менингит

837. Изменением системы крови у новорожденных, перенесших асфиксию в родах, является

- о анемия
- о лейкопения
- о тромбоцитоз
- о полицитемия

838. Снижение гемоглобина при гемолитической болезни новорожденных происходит

- о до 2 недель жизни
- о до 1 месяца
- о до 1,5 месяцев
- о до 2 месяцев (после перенесенной гемолитической болезни - до 6 месяцев)

839. Частота наблюдений педиатром детей с холециститом, холецистохолангитом после обострения составляет

- о 1 раз в месяц
- о 1 раз в квартал
- о 1 раз в год
- о 2 раза в год
- о 1 раз в два года

840. Продолжительность диспансерного наблюдения за детьми с язвенной болезнью желудка и двп составляет

- о 1 раза
- о 2 лет
- о 3 лет
- о 5 лет
- о до перевода во взрослую сеть

841. Для недоношенных детей оптимальным между кормлениями является промежуток в

- о 2 часа
- о 2,5 часа
- о 3 часа
- о 3,5 часа

842. Самой частой причиной развития некротизирующего энтероколита у недоношенных детей является

- о асфиксия в родах
- о нарушение колонизационной резистентности кишечника
- о вирусная инфекция
- о бактериальная инфекция

843. Прямая гипербилирубинемия у новорожденного характерна

- о для атрезии желчных путей
- о для гемолитической болезни новорожденного
- о для конъюгационной желтухи типа Люцера

- о для микросфероцитарной анемии
 - о для болезни Ди Джорджа
- 844. Ретролентальная фиброплазия недоношенных является следствием**

- о охлаждения
- о недостаточного питания
- о чрезмерной кислородотерапии
- о гиоксии
- о гипогликемии

845. Синдром расщепления губы и мягкого неба специфичен для

- о трисомии E
- о трисомии G
- о болезни Шерешевского - Тернера
- о трсомии D (синдром Патау)
- о синдрома Альпорта

846. Ателектазы легких характерны для

- о гемосидероза
- о муковисцидоза
- о целиакии
- о дефицита α 1-антитрипсина
- о ларинготрахеита

847. Главным при напряженном пневмотораксе является

- о интубация и искусственное дыхание
- о положение на пораженной стороне
- о активная кислородотерапия
- о возвышенное положение
- о плевральная пункция и дренаж

848. Слизистые имеют интенсивно розов цвет

- о при циркуляторной гипоксии
- о при гипоксемической гипоксии
- о при гистотоксической гипоксии
- о при анемической гипоксии
- о при любом типе гипоксии имеет место цианоз

849. Гипертонической дегидратации соответствует

- о выбухающий родничок
- о гипотермия
- о снижение АД
- о сухость слизистых
- о гипонатриемия

850. Постоянная щелочная реакция мочи имеет место

- о при пиелонефрите
- о при почечном канальцевом ацидозе
- о при мегауретере
- о при остром гломерулонефрите
- о при гидронефрозе

851. Колебания относительной плотности мочи у ребенка 10-месячного возраста составляют

- о от 1,010 до 1,020
- о от 1,009 до 1,015
- о от 1,001 до 1,003
- о от 1,002 до 1,008
- о от 1,020 до 1,030

852. Бронхоспазм усиливают

- о алкалоз
- о седативные препараты
- о β -адреноблокаторы
- о ваголитические препараты
- о β 2-стимуляторы

853. К типичной пневмонии для иммунодефицитного состояния относится

- о пневмококковая
- о стафилококковая
- о микоплазменная
- о пневмоцистная

854. Максимально нарушается диффузия газов

- о при очагово-сливной пневмонии
- о при сегментарной пневмонии
- о при крупозной пневмонии
- о при интерстициальной пневмонии

855. Для подтверждения врожденного порока бронхов показана

- о бронхография
- о томография
- о пневмотахометрия
- о бронхоскопия

856. К типичным рентгенологическим изменениям при бронхиальной астме в приступный период не относятся

- о нарушения подвижности грудной клетки
- о вздутия грудной клетки
- о увеличения лимфоузлов средостения
- о усиления сосудистого рисунка

857. При бронхиальной астме не рекомендуются

- о препараты, подавляющие кашлевой рефлекс
- о антигистаминные препараты
- о муколитики
- о бронхоспазмолитики

858. Для аллергического риносинусита не характерно

- о отек слизистой носа, гайморовых пазух
- о псевдополипоз
- о развитие псевдокист
- о одышка экспираторная

859. Сердечные изменения чаще встречаются

- о при синдроме де Тони - Дебре - Фанкони
- о при синдроме Марфана
- о при синдроме Альпорта
- о при адреногенитальном синдроме

860. Легочная гипертензия не наблюдается

- о при открытом артериальном протоке
- о при дефекте межпредсердной перегородки
- о при изолированном стенозе легочной артерии
- о при дефекте межжелудочковой перегородки

861. При системной красной волчанке сыпь локализуется

- о на ушных раковинах
- о на туловище
- о на ногах
- о на спинке носа и щеках

862. Развитию ревматизма может способствовать наличие у ребенка

- о пиелонефрита
- о холецистита
- о хронического тонзиллита
- о вульвовагинита
- о хронического отита

863. Для диагностики ревматизма наибольшее значение имеет наличие

- о эндомиокардита
- о перенесенной ангины
- о диспротеинемии
- о узловатой эритемы

864. Бициллинопрофилактику ревматизма следует начать

- о после выписки из стационара в поликлинике
- о в санатории
- о в стационаре уже в активной фазе болезни
- о после выписки из санатория в поликлинике

865. В случае аллергии к пенициллину следует назначить

- о ампициллин
- о бициллин
- о оксациллин

- цепорин
- амоксициллин
- 866. У детей раннего возраста для быстрой дигитализации предпочтительнее использовать**
 - дигитоксин в таблетках
 - дигоксин в таблетках
 - настой адониса
 - изоланид в таблетках
- 867. При отеке легких обычно не наблюдается**
 - тахикардия
 - кашель
 - пенистая мокрота
 - брадикардия
- 868. Для дифференциальной диагностики гипертензии при коарктации аорты наиболее информативным является**
 - повышение в моче альдостерона
 - нормальное содержание в моче 17-кетостероидов
 - артериальное давление на ногах ниже, чем на руках
 - снижение в моче уровня катехоламинов
- 869. Прогноз наиболее серьезен**
 - при суправентрикулярной форме пароксизмальной тахикардии
 - при желудочковой форме пароксизмальной тахикардии
 - при суправентрикулярной форме пароксизмальной тахикардии с частыми приступами
 - при суправентрикулярной форме пароксизмальной тахикардии, впервые появившейся на фоне ОРЗ
- 870. У детей с острой ревматической лихорадкой нередко наблюдается**
 - ортоградная неполная АВ-блокада I степени
 - ортоградная неполная АВ-блокада II степени (периоды Самойлова - Венкебаха)
 - полная АВ-блокада
 - миграция водителя ритма
- 871. При инфекционном эндокардите чаще всего поражается эндокард**
 - митрального клапана
 - аортального клапана
 - трехстворчатого клапана
 - легочной артерии
- 872. У ребенка во 2-м межреберье слева в норме**
 - I тон равен II тону
 - II тон слабее I тона
 - I, II, III тоны равны
 - I тон громче II тона
 - II тон громче I тона
- 873. PQ на ЭКГ школьника равно**
 - 0,18 с
 - 0,20 с
 - 0,22 с
 - 0,16 с
 - 0,24 с
- 874. Наиболее информативным исследованием для диагностики пролапса митрального клапана является**
 - ЭКГ
 - ультразвуковое исследование
 - ФКГ
 - рентгенограмма сердца
- 875. Для диагностики вегетодистонии целесообразно провести**
 - клиноортостатическую пробу
 - велоэргометрию
 - УЗИ сердца
 - исследование внешнего дыхания
- 876. Ревматоидный фактор представляет**
 - лимфокины
 - фракцию комплемента
 - медиаторы воспаления
 - иммуглобулины
- 877. Форма сердца на рентгенограмме, напоминающая цифру "8", наблюдается**
 - при тетраде Фалло
 - при атрезии трехстворчатого клапана
 - при тотальном аномальном впадении легочных вен
 - при открытом артериальном протоке
- 878. При подозрении на аномалию развития пищевода необходимо провести**
 - рентгеноконтрастное исследование желудочно-кишечного тракта
 - радиоизотопное исследование желудочно-кишечного тракта с коллоидом
 - ультразвуковое исследование
 - анализ крови
- 879. При кетоацидозе нежелательное питание**
 - жиры
 - овощные блюда
 - легко усвояемые углеводы
 - прием пищи не показан до купирования кетоацидоза
- 880. Причиной антрального гастрита не является**
 - дуоденогастральный рефлюкс
 - травма слизистой оболочки желудка
 - хеликобактериоз
 - гиперацидность
- 881. При холецистите целесообразнее использовать**
 - фурановые
 - сульфамиды
 - эритромицин
 - тетрациклин
- 882. Хронический гепатит легче дифференцировать с**
 - затяжным течением острого гепатита
 - реконвалесценцией после острого гепатита
 - гепатозом (вне обострения)
 - токсическим гепатитом
- 883. При печеночной патологии нежелательны**
 - мясо
 - масло растительное
 - белковые продукты (кислые фрукты)
 - сладкие фрукты
- 884. Наиболее информативно при панкреатите**
 - рентгеноконтрастное исследование 12-перстной кишки
 - ультразвуковое исследование
 - рентгеноконтрастное исследование 12-перстной кишки с использованием гипотонии
 - обзорная рентгенограмма брюшной полости
- 885. К основной флоре толстой кишки не относятся**
 - кишечная палочка
 - клостридии
 - лактобактерии
 - бифидумбактерии
- 886. Группой риска заболеваний желудка не является**
 - дисбактериоз
 - семейная предрасположенность к заболеваниям толстой кишки
 - запор

- о гиперацидность
- 887. Клубочек выполняет функцию**
 - о фильтрационную
 - о реабсорбционную
 - о секреторную
 - о выделительную
- 888. Гиперлипидемия наиболее характерна**
 - о для гломерулонефрита нефротической формы
 - о для гломерулонефрита гематурической формы
 - о для пиелонефрита
 - о для тубуло-интерстициального нефрита
- 889. Показанием к биопсии почек не является**
 - о гломерулонефрит при отсутствии эффекта от проводимой терапии в течение 6 месяцев и более
 - о латентно текущие нефропатии
 - о подозрения на поликистоз
 - о бессимптомной гематурии
- 890. Лабораторными показателями активности при гематурической форме гломерулонефрита не является**
 - о ускоренная СОЭ
 - о гиперфибриногенемия
 - о макрогематурия
 - о микрогематурия
- 891. Ингибитором синтеза ангиотензина-II является**
 - о анаприлин
 - о апрессин
 - о дибазол
 - о каптоприл
- 892. У девочки 12 лет задержка роста, множественные малые аномалии, короткая шея с крыловидными складками, отсутствие вторичных половых признаков. диагноз**
 - о церебрально-гипофизарный нанизм
 - о болезнь Дауна
 - о синдром Шерешевского - Тернера
 - о конституциональная задержка полового и физического развития
- 893. При хронической первичной надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) не характерно**
 - о понижение артериального давления
 - о сниженный уровень кортизола в крови
 - о сниженный уровень АКТГ в крови
 - о похудание
- 894. При лечении конституционально-экзогенного ожирения можно не использовать назначение**
 - о диетотерапии
 - о ЛФК
 - о анорексигенных препаратов
 - о хлоридана
- 895. Реже всего вызывает ДВС-синдром бактериальная инфекция**
 - о менингококковая
 - о грам-отрицательная
 - о стрептококковая
 - о стафилококковая
- 896. Тромбоцитопатию не характеризует**
 - о подсчет тромбоцитов
 - о определение времени кровотечения
 - о определение времени свертывания
 - о определение функций тромбоцитов
- 897. Для гемофилии А наиболее характерно кровоизлияние**
 - о в суставы
 - о носовое
 - о в кожу
 - о в плевральную полость
- 898. Принципы лечения аутоиммунных гемолитических анемий следующие, кроме**
 - о кортикостероидных препаратов
 - о заместительной гемотрансфузии
 - о иммунодепрессантных препаратов
 - о спленэктомии
- 899. К основным провокатором гемолитического криза при несфероцитарных гемолитических анемиях не относится**
 - о инфекций
 - о лекарственных препаратов
 - о алиментарных факторов
 - о иммунных процессов
- 900. Биохимическим серологическим критерием гемолиза не является**
 - о непрямая гипербилирубинемия
 - о уменьшение гаптоглобина
 - о гиперпротеинемия
 - о повышение железа
- 901. К системе амбулаторно-поликлинической помощи детям в сельской местности не относится**
 - о детская поликлиника ЦРБ
 - о амбулатория сельской участковой больницы
 - о медсанчасть
 - о фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
 - о детская областная консультативно-диагностическая поликлиника
- 902. На рождение ребенка с врожденными уродствами повлияли повреждающие факторы на сроках беременности**
 - о 8-12 недель
 - о 14-16 недель
 - о 20-25 недель
 - о 28-32 недели
- 903. Частота пульса 110-115 ударов в минуту характерна в норме для ребенка в возрасте**
 - о 1 месяц
 - о 1 год
 - о 2 года
 - о 5 лет
- 904. Критерии, обуславливающие состояние здоровья ребенка**
 - о наличие хронических заболеваний и уровень основных функций
 - о резистентность
 - о уровень физического и нервно-психического развития
 - о наличие или отсутствие отклонений в раннем онтогенезе
- 905. Основная физиологическая задача комплекса гимнастики и массажа № 1**
 - о ослабление тонуса сгибателей
 - о улучшение тургора тканей
 - о укрепление мышц живота и спины
 - о усиление тонуса разгибателей
- 906. Наиболее чувствительный и информативный показатель в диагностике нервно-психического развития ребенка 2 лет**
 - о понимание речи соответствует 1 году 9 месяцам
 - о активная речь соответствует 1 году 3 месяцам
 - о сенсорное развитие соответствует 1 году 6 месяцам
 - о развитие движений соответствует 2 годам
- 907. Абсолютное показание к назначению возрастного физиологического комплекса гимнастики и массажа ребенку 6 месяцев**
 - о нормальное физическое развитие

- о угасание безусловных рефлексов
- о отсутствие отклонений в раннем онтогенезе
- о нормальные показатели нервно-психического развития

908. Детей-реконвалесцентов после перенесенных ОРЗ и гриппа

- о освобождают на 1 неделю от физкультурных занятий
- о освобождают на 2 недели от физкультурных занятий
- о допускают к физкультурным занятиям без ограничения физической нагрузки
- о допускают к физкультурным занятиям с ограничением физической нагрузки

909. Неправильным утверждением в отношении переучивания леворукого ребенка на праворукие является

- о насильственное переучивание противопоказано
- о до 6 лет можно переучивать, а в 7 лет попытки прекратить
- о до 5 лет допускаются осторожные попытки обучения ребенка праворуким действиям без какого-либо нажима, диктата, окрика

910. Растение, улучшающее вкус любого травяного сбора

- о одуванчик
- о пустырник
- о мята
- о зверобой

911. Какие факторы не оказывают преимущественного влияния на исход адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению

- о опыт совместной игровой деятельности со взрослым
- о отсутствие отрицательных привычек
- о наличие опыта общения со сверстниками

912. По технике естественного вскармливания не рекомендуют

- о каждое кормление прикладывать ребенка только к одной груди
- о каждое кормление кормить обеими грудями
- о сцеживать молоко до конца после каждого кормления
- о докормить сцеженным молоком, если при контрольном кормлении выявлен недокорм

913. Дети перенесшие гломерулонефрит наблюдают

- о в течение года
- о в течение 3 лет
- о в течение 5 лет
- о в течение 2 лет
- о до перевода во взрослую поликлинику

914. Масса тела недоношенных детей, при которой их можно перевести на 6-разовое кормление, составляет

- о 3 кг
- о 3,5 кг
- о 4 кг
- о 3,5-4 кг

915. Суточная потребность в углеводах у детей первого года жизни при всех видах вскармливания составляет

- о 10-11 в г/кг
- о 11-12 в г/кг
- о 12-14 в г/кг
- о 14-15 в г/кг

916. Сроки введения соков

- о с 4 месяца
- о с 1,5-2 месяцев
- о с 3-3,5 месяцев
- о с 3 месяцев

917. Вводят творог ребенку в возрасте

- о 1 месяца
- о 1,5-2 месяцев
- о 3,5-3 месяцев
- о 5 месяцев

918. Способом приготовления каши не является

- о разваривание крупы небольшим количестве воды, добавление цельного молока и варки до готовности
- о смешивание молока с водой и варки до готовности
- о добавление масла в готовую кашу
- о варка каши под закрытой крышкой

919. Питание, обеспечивающее формирование и поддержание иммунитета

- о богатое белками
- о богатое ПНЖК
- о обогащенное пребиотками и пробиотиками
- о рафинированными продуктами
- о продуктами естественной среды

920. На рост ребенка в меньшей степени влияет

- о недостаток микроэлементов
- о недостаток витаминов
- о недостаток углеводов и жиров
- о белковая недостаточность, особенно животных белков

921. В рационе питания детей с сахарным диабетом в возрасте старше 7 лет процент белка животного происхождения должен составлять

- о 125%
- о 80%
- о 75%
- о 20% или (33%)

922. При фенилкетонурии доминирует

- о поражение кишечника и нарастающая гипотрофия
- о депрессия гемопоза
- о неврологическая симптоматика
- о экзема и альбинизм

923. Непосредственно формируют гуморальный иммунитет

- о В-лимфоциты
- о Т-лимфоциты
- о нейтрофилы
- о макрофаги

924. В диагностике аллергической реакции I типа наиболее значимо

- о эозинофилия
- о повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
- о повышенное содержание гистамина в моче
- о высокая концентрация иммуноглобулина Е в сыворотке крови

925. Первый клинический анализ крови здоровому ребенку проводится в возрасте

- о 1 месяц
- о 3 месяца
- о 6 месяцев (3 месяца)
- о 1 год
- о 9 месяцев

926. К наиболее тяжелым клиническим формам алергодерматозов не относятся

- о синдром Стивенса - Джонсона
- о синдром Лайелла

- о многоформная экссудативная эритема
- о дерматит Дюринга
- 927. К факторам риска развития бронхиальной астмы НЕ относятся
 - о искривления носовой перегородки
 - о селективного иммунодефицита IgA
 - о наследственной предрасположенности
 - о гиперхолестеринемии
- 928. Основная причина смертности в перинатальном периоде
 - о родовая травма
 - о асфиксия
 - о пороки сердца
 - о гемолитическая болезнь новорожденных
- 929. Энтеровирусная инфекция, вызванная вирусом Коксаки В, осложняется
 - о хориоретинитом
 - о катарактой
 - о миокардитом
 - о геморрагическим синдромом
- 930. Анемия у беременных чаще всего является
 - о гипопластической
 - о железодефицитной
 - о постгеморрагической
 - о гемолитической
- 931. Кратковременная тяжелая внутриутробная гипоксия вызывает у плода
 - о брадикардию и артериальную гипотензию
 - о брадикардию и артериальную гипертензию
 - о тахикардию и артериальную гипертензию
 - о тахикардию и артериальную гипотензию
- 932. Первый "перекрест крови" у недоношенных детей происходит
 - о на 4-й день жизни
 - о на 5-й день жизни
 - о на 6-й день жизни
 - о после 7-10 дня жизни
- 933. Падение гемоглобина на 1-м месяце жизни у здорового доношенного новорожденного ребенка связано
 - о с естественным гемолизом эритроцитов
 - о с торможением функции костного мозга
 - о с активацией ретикуло-гистиоцитарной системы
 - о со всеми перечисленными факторами
- 934. Прививать ребенка прибывшего без сведений о прививках против полиомиелита следует
 - о трехкратно иммунизировать
 - о ревакцинировать в соответствии с возрастом
 - о однократно иммунизировать
 - о не прививать
 - о сделать запрос
- 935. Ревакцинация против полиомиелита проводится
 - о 18 мес., 20 мес., 14 лет
 - о 4-5 и 6-7 лет
 - о 18мес., 24мес., 6 лет, 14 лет
 - о 12 мес., 7 лет
 - о 6 лет, 14 лет, 18 лет
- 936. Основное отличие поражения ЦНС при наследственных нарушениях обмена от поражений ЦНС гипоксического генеза
 - о симптомы поражения с возрастом уменьшаются
 - о симптомы поражения с возрастом нарастают
 - о симптомы поражения ярко выражены сразу после рождения
 - о симптомы поражения носят неспецифический характер

- 937. Частота осмотров участковым педиатром детей с хроническим гепатитом и начальной стадией цирроза печени в неактивной фазе составляет
 - о 1 раз в месяц в течение года
 - о 1 раз в квартал в течение 2 лет
 - о 1 раз в полгода в течение 3 лет
 - о 1 раз в квартал в течение 5 лет
 - о 2 раза в год в течение года
- 938. В каких случаях синдром обезвоживания может сопровождаться шоком
 - о при длительном сохранении обезвоживания
 - о при быстром развитии обезвоживания
 - о при второй степени обезвоживания
 - о при третьей степени обезвоживания
- 939. Внутрижелудочковое кровоизлияние у недоношенного ребенка позволяет заподозрить
 - о одышка
 - о тремор конечностей
 - о тахикардия
 - о апноэ
- 940. Удваивают массу тела при рождении дети с 3-й степенью недоношенности к возрасту
 - о 2 месяца
 - о 2,5-3 месяца
 - о 4 месяца
 - о 5 месяцев
- 941. Желток недоношенному ребенку можно начинать давать
 - о в возрасте 2 недель
 - о в возрасте 3 недель
 - о в возрасте 1 месяца
 - о в возрасте 3 месяцев
- 942. Проведение фототерапии недоношенным детям может осложняться
 - о появлением жидкого стула с примесью зелени
 - о синдромом сгущения желчи
 - о развитием гемолитической анемии
 - о присоединением инфекции
- 943. Из перечня заболеваний, сопровождающихся судорогами у новорожденных, следует исключить
 - о внутричерепное кровоизлияние
 - о гипогликемию
 - о менингит
 - о D-дефицитный рахит
 - о синдром Ди Джорджа
- 944. Гипербилирубинемия, не обусловленная иммунопатологическими причинами, чаще встречается
 - о у зрелого новорожденного
 - о недоношенного
 - о новорожденного с асфиксией
 - о с пороком сердца
 - о у переносимого ребенка
- 945. При портальной гипертензии наблюдают
 - о гипогликемию
 - о изолированную гепатомегалию
 - о высокий уровень g-глобулинов
 - о расширение вен пищевода
- 946. Парадоксальное дыхание наиболее часто наблюдают
 - о при пневмотораксе
 - о при ларингоспазме
 - о при эмфиземе
 - о при пневмонии
 - о при бронхиальной астме
- 947. Голосовое дрожание усилено

- о при плеврите
 - о при пневмотораксе
 - о при инфильтративном легочном процессе
 - о при легочной эмфиземе
 - о при ателектазе
- 948. Из перечисленных клинических признаков для клеточной дегидратации наиболее характерен**
- о мышечная гипотония
 - о жажда
 - о судороги
 - о отеки
 - о повышение артериального давления
- 949. Для характеристики микроциркуляции наиболее информативно**
- о гемограмма
 - о частота пульса
 - о диурез
 - о центральное венозное давление
 - о артериальное давление
- 950. К эмбриопатии не относится**
- о подковообразная почка
 - о удвоенная почка
 - о синдром Альпорта
 - о агенезия почки
 - о сегментарная гипоплазия
- 951. Объем мочевого пузыря у новорожденного ребенка**
- о от 20 до 30 мл
 - о от 30 до 50 мл
 - о от 100 до 150 мл
 - о от 100 до 200 мл
 - о от 10 до 20 мл
- 952. Расширению бронхов способствуют**
- о гипокальциемия
 - о повышение тонуса вагуса
 - о симпатикотония
 - о гипогликемия
 - о физическая нагрузка
- 953. Отсутствие эффекта от жаропонижающих препаратов центрального действия типично**
- о для пневмококковой пневмонии
 - о для стафилококковой пневмонии
 - о для микоплазменной пневмонии
 - о для грам-отрицательной пневмонии
- 954. Для пневмоцистной пневмонии типично**
- о большое количество влажных мелкопузырчатых хрипов
 - о гипертермия
 - о укороченный тимпанит при резком вздутии грудной клетки спереди
 - о усиление голосового дрожания
- 955. Для выявления бронхоэктазов показана**
- о бронхография
 - о пневмотахометрия
 - о обзорный снимок
 - о томография
- 956. Из перечисленных исследований при бронхиальной астме в межприступном периоде показано**
- о постановка кожных проб
 - о бронхография
 - о бронхоскопия
 - о ингаляционные тесты с бронхоспазмолитиками
- 957. Астматический статус II-III степени требует немедленного применения**
- о антигистаминных препаратов
 - о кортикостероидов
 - о интала

- о адреналина
- 958. Бронхиальную астму у детей до 3 лет чаще вызывают**
- о медикаментозные аллергены
 - о пищевые аллергены
 - о домашняя пыль
 - о растительные аллергены
- 959. Гепарин и гистамин выделяют**
- о нейтрофилы
 - о лимфоциты
 - о тучные клетки (мастоциты)
 - о плазматические клетки
- 960. При большом дефекте межжелудочковой перегородки у ребенка в возрасте 3 месяцев не наблюдаются**
- о одышки и непереносимости физической нагрузки
 - о повторных пневмоний
 - о акцента второго тона на легочной артерии
 - о судорог
- 961. При системной красной волчанке чаще наблюдается**
- о синдром Рейно
 - о наличие LE-клеток
 - о периорбитальная эритема
 - о дисфагия
- 962. Ревматической атаке наиболее часто предшествует**
- о стрептококковая инфекция
 - о травма
 - о сепсис
 - о кишечная инфекция
- 963. Эндомиокардит чаще наблюдается**
- о при ревматизме
 - о при инфекционно-аллергическом миокардите
 - о при системной красной волчанке
 - о при ревматоидном артрите
- 964. Ребенок госпитализирован на 2-й день от начала артрита. Температура 37,8°C, боль и припухлость суставов сохраняется. Систолический шум на верхушке продолжительный, СОЭ - 45 мм/ч. в план лечения не входит назначение**
- о пенициллина
 - о преднизолона
 - о ацетилсалициловой кислоты
 - о левомицетина
- 965. Наиболее целесообразной комбинацией антибиотиков при перикардите, обусловленном стафилококком, является**
- о пенициллин и ампициллин
 - о пенициллин и эритромицин
 - о оксациллин и пенициллин
 - о ампициллин и оксациллин
 - о ампициллин и эритромицин
- 966. На сократительную способность миокардита в большой степени влияет**
- о калий
 - о кальций
 - о натрий
 - о магний
- 967. Задержку роста, обусловленную церебрально-гипофизарным нанизмом, начинают замечать**
- о при рождении
 - о на первом году жизни
 - о в 2-4 года
 - о в пубертатном периоде
 - о в 10-11 лет
- 968. Узуры ребер характерны**

- о для вазоренальной гипертензии
 - о для узелкового периартериита
 - о для открытого артериального протока
 - о для коарктации аорты
969. При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом является
- о частота сердечных сокращений 120 в минуту
 - о частота сердечных сокращений более 160-180 в минуту
 - о частота сердечных сокращений 140 в минуту
 - о перебои (выпадения) сердечных сокращений
970. При полной атриовентрикулярной блокаде (атриовентрикулярная блокада III степени) наблюдается
- о аритмия
 - о ритм 50-60 ударов в минуту
 - о ритм 90 ударов в минуту
 - о дефицит пульса
971. Функциональная проба для оценки состояния сердечно-сосудистой системы
- о Шалкова
 - о Мак-Клюра
 - о молоточковая
 - о щипковая
 - о жгута
972. Соотношение тонов на верхушке сердца в норме
- о I тон громче II тона
 - о I и II тоны равной интенсивности
 - о II тон громче I тона
 - о I, II, III тоны равной интенсивности
973. QRS на ЭКГ школьника равен
- о 0,05 с
 - о 0,08 с
 - о 0,10 с
 - о 0,04 с
974. Для дифференциальной диагностики недостаточности митрального клапана от пролапса митрального клапана наиболее достоверным является следующий метод исследования
- о ЭКГ
 - о рентгенография
 - о векторкардиография
 - о эхокардиография
975. При системной красной волчанке не наблюдается
- о гепатита
 - о жировой дистрофии печени
 - о увеличения вследствие перикардита
 - о поликистоза печени
976. Учительница обратила внимание родителей на то, что девочка 10 лет стала обидчивой, плаксивой, у нее испортился почерк, плохо выполняет задания на уроках труда. В этой ситуации следует подумать
- о о неврозе
 - о об ослаблении зрения
 - о о хорее
 - о о неврите периферических нервов
977. Для какого врожденного порока у грудного ребенка характерна на ЭКГ картина инфаркта (глубокий зубец Q, смещение ST, отрицательный T в отведениях I, V5, V6)
- о для тетрады Фалло
 - о для аномального отхождения левой коронарной артерии
 - о для коарктации аорты
 - о для атрезии трехстворчатого клапана

978. Больному с эзофагитом назначают
- о нерастворимые антациды
 - о ферменты
 - о спазмолитики
 - о седативные препараты
979. Для халазии характерен следующий симптом
- о боли в правом подреберье
 - о запоры
 - о боли натощак в эпигастрии
 - о рецидивирующая рвота
980. Диагноз пилорического хеликобактериоза наиболее точен
- о при гистологическом обнаружении микроба в биоптате
 - о при положительном уреазном тесте с биоптатом
 - о при выделении чистой культуры пилорического хеликобактера из биоптата
 - о при клинко-эндоскопическом исследовании
981. При наличии гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей из-за слабого сокращения мышц стенок желчного пузыря из продуктов питания предпочтительны
- о фрукты
 - о мясо
 - о яйца
 - о творог
982. При хроническом гепатите не отмечается
- о увеличение, уплотнение печени и селезенки
 - о наличие желтухи
 - о увеличение печени без увеличения селезенки
 - о дерматоваскулит
983. Детям с гепатобилиарной патологией не рекомендуется употреблять
- о отварное мясо
 - о жареное мясо
 - о отварную рыбу
 - о отварные овощи
984. Для внутривенных вливаний при приступе панкреатита обязательно использовать
- о реополиглюкин, 0.5% раствор новокаина
 - о свежезамороженную плазму с гепарином
 - о ингибиторы ферментов
 - о наркотики
985. Двигательную функцию толстой кишки можно определить
- о копрограммой
 - о ректороманоскопией
 - о ирригоскопией
 - о колоноскопией
986. Непрерывная диетическая профилактика колитов, сопровождающихся запорами, заключается в назначении
- о шлакогонной диеты с механической обработкой клетчатки
 - о желчегонной диеты
 - о молочно-растительной диеты
 - о возрастного общего стола
987. Низкую осморегуляторную функцию почек у детей грудного возраста не определяет
- о функциональная неполноценность эпителия дистального канальца
 - о недоразвитие осморцепторов
 - о недостаточность образования антидиуретического гормона
 - о характер питания
988. Выраженная фибриногенемия наблюдается
- о при гломерулонефрите нефротической формы
 - о при цистите

- о при наследственном нефрите
- о при дизметаболической нефропатии
- 989. Наиболее тяжелым морфологическим вариантом гломерулонефрита является**
 - о минимальные изменения клубочков
 - о фокально-сегментарный гломерулонефрит
 - о экстракапиллярный гломерулонефрит с полулуниями
 - о экстракапиллярный пролиферативный гломерулонефрит

990. Для смешанной формы гломерулонефрита наиболее характерна

- о гематурия с протеинурией
- о изолированная протеинурия
- о абактериальная лейкоцитурия
- о длительно сохраняющаяся гематурия

991. К глюкокортикоидным препаратам не относится

- о метандростенолон
- о гидрокортизон
- о преднизолон
- о триамцинолон

992. Для дифференциального диагноза острого аппендицита и абдоминального синдрома у больного с кетоацидотической прекомой сахарного диабета не следует учитывать

- о наличие глюкозурии
- о лейкоцитоз
- о наличие ацетонурии
- о наличие гипергликемии

993. При диабетической кетоацидотической коме обычно не наблюдаются

- о боли в животе
- о потеря сознания
- о запах ацетона
- о судороги

994. Для диагноза сахарного диабета у ребенка важно наличие

- о увеличения СОЭ
- о а IV типа (Андерсен1)

- о гиперкалиемии
- о низкого удельного веса мочи
- о гипергликемии

995. Острый гемолиз обычно не осложняется

- о острой почечной недостаточностью
- о комой
- о ДВС-синдромом
- о кровотечением

996. Аутоиммунная гемолитическая анемия не является симптоматической

- о при системной красной волчанке
- о при ревматизме
- о при хроническом активном гепатите
- о при иммунодефицитных состояниях

997. При остром лейкозе не характерно

- о нейтропения абсолютная
- о увеличение молодых форм нейтрофилов
- о увеличение зрелых сегментоядерных нейтрофилов
- о лейкоэмическое зияние

998. Правильная тактика назначения преднизолона, программного лечения

- о назначить лечение при подозрении на острый лейкоз
- о после анализа крови
- о после данных миелограммы
- о при развернутой клинике острого лейкоза

999. При лимфогранулематозе отсутствуют жалобы на

- о температурную реакцию с ознобом
- о слабость, потливость
- о желтуху с зудом
- о кровоточивость

1000. Спленомегалия не характерна

- о для мраморной болезни
- о для цереброицидоза (болезнь Гоше)
- о для несфероцитарной гемолитической анемии
- о для гликогеноза

1. Эффективность первого этапа диспансеризации на педиатрическом участке можно оценить по
 - о отсутствию отрицательной динамики по группам здоровья
2. Для прогнозирования нарушений темпов развития и закладки тканей и органов плода
 - критическими считаются сроки беременности
 - о 14-16 недель
3. Возраст, для которого характерна в норме частота пульса 135-140 ударов в минуту
 - о новорожденный
4. Критерий, который является ведущим для отнесения ребенка к III группе здоровья
 - о наличие или отсутствие хронических заболеваний
5. В каких случаях в гимнастический комплекс для здоровых детей раннего возраста можно включать упражнение "приседание из положения стоя"
 - о умение сидеть на корточках
6. Ранняя неонатальная смертность от перинатальной смертности составляет
 - о 50%
7. О развитии ребенка 3 месяцев нельзя сделать заключение по
 - о развитию движений рук (умение брать игрушку)
8. Наиболее желательный прирост пульса в основной части урока по физической культуре по отношению к его исходной величине для детей основной медицинской группы
 - о 50-80%
9. При соответствующих воздействиях дефицит массы тела у ребенка с гипотрофией II степени может восстановиться
 - о через 5-6 месяцев
10. Трава, относящаяся к горечам
 - о пустырник
11. Показатель, говорящий о завершении адаптации ребенка к детскому учреждению
 - о общение с детьми
12. Интервалы между кормлениями и частота кормления зависят
 - о беспокойства ребенка
13. Жир женского молока в отличие от жира коровьего молока не содержит
 - о большого количества низких насыщенных жирных кислот
14. Суточный объем пищи для детей с 10-го по 29-й день жизни составляет
 - о 1/5 от массы тела
15. Суточная потребность в белке у детей 1-4 месяцев жизни при смешанном вскармливании составляет
 - о до 2,4 г/кг
16. Пюре фруктовое рекомендуется вводить в питание ребенка с
 - о 4 месяцев
17. Прикорм вводится на неадаптированных смесях
 - о раньше на 2-3 недели при смешанном и искусственном вскармливании
18. Нецелесообразно готовить кашу ребенку 5 месяцев
 - о на цельном молоке
19. К основным принципам режима питания у детей не относится
 - о прием пищи по желанию ребенка
20. К алиментарной белковой недостаточности и избыточности углеводов не приводит
 - о задержка в организме жидкости
21. Сахарная ценность пищевого рациона состоит
 - о из углеводов + 50% белка
22. Для синдрома Шершевского - Тернера не характерно

- о высокий рост
- 23. Иммунологический ответ после антигенной стимуляции формируется
 - о на 5-7-й день
- 24. Для псевдоаллергической реакции характерно
 - о повышенное содержание гистамина в крови и в моче
- 25. Выраженным либераторным эффектом не обладает
 - о молоко
- 26. Из всех форм бронхиальной астмы реже встречается у детей
 - о аспириновая астма
- 27. Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране
 - о младенческая смертность
- 28. Особенности слюнных желез к моменту рождения
 - о морфологически сформированы, но секреторная функция низкая
- 29. Наиболее опасно заболевание женщины краснухой на
 - о на 1-м месяце беременности
- 30. У женщин с диабетом беременных чаще всего рождаются дети
 - о с макросомией
- 31. В условиях внутриутробной гипоксии кровотоков через аранциев проток у плода
 - о увеличивается
- 32. Полностью эпителизируется пупочная ранка в норме
 - о к концу 2-й недели жизни
- 33. Не оправданная рекомендация кормящей женщине при снижении лактации
 - о более редкое прикладывание к груди
- 34. Самым тяжелым осложнением при желтушной форме гемолитической болезни новорожденных является
 - о поражение ЦНС
- 35. Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется
 - о транспозиция магистральных сосудов
- 36. При фиброэластозе чаще всего поражается
 - о левый желудочек
- 37. Потребность в жирах доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании составляет
 - о 6,5 г/кг в сутки
- 38. Появление у ребенка мочи цвета малинового сиропа свидетельствует
 - о о гемоглобинурии
- 39. Ребенок самостоятельно ходит, говорит отдельные слова (более 20 слов), понимает обращенную к нему речь, выполняет простые задания. ориентировочный возраст ребенка
 - о 1 год 6 месяцев
- 40. Чаще других приводит к смерти недоношенных детей в перинатальном периоде
 - о преждевременная отслойка плаценты
- 41. Профилактику билирубиновой энцефалопатии при конъюгационной желтухе у недоношенных детей из группы высокого риска следует начинать
 - о с первого дня жизни
- 42. Гипертермия у недоношенных детей чаще наблюдается
 - о при менингите
- 43. Для гиалиновых мембран у новорожденных не типичен
 - о отсутствие дыхательной недостаточности
- 44. Для врожденного гипотиреоза не характерно
 - о преждевременное закрытие большого родничка
- 45. Внутрипеченочный холестаз развивается в результате угнетения ферментов (оксидаз)
 - о вирусами (при ОРВИ)
- 46. Цитомегаловирусная инфекция вызывает пневмонию
 - о интерстициальную
- 47. К признакам железодефицитной анемии не относится
 - о повышение билирубина крови
- 48. Препаратом выбора при остром развитии приступа судорог является
 - о фенobarбитал внутривенно
- 49. Основным показателем гипотонической гипергидратации является
 - о периферические отеки
- 50. При текущем пиелонефрите наиболее четко верифицирует развитие хронической почечной недостаточности
 - о полиурия
- 51. Искривления конечностей не наблюдается
 - о при глюкозурии
- 52. Для лечения бронхообструктивного синдрома при пищевой аллергии противопоказаны
 - о β-адреноблокаторы
- 53. Развитие сосудистой недостаточности типично
 - о для пневмококковой пневмонии
- 54. Для лечения "домашних" пневмоний показан
 - о ампициллин
- 55. Оценка ясельной зрелости ребенка проводится до поступления в ясли не позже, чем за
 - о 1 мес.
- 56. Для лечения бронхиальной астмы в межприступном периоде не является ведущим назначение
 - о репаратов кальция
- 57. При эозинофильном легочном инфильтрате у ребенка старшего возраста чаще обнаруживаются
 - о отсутствие перкуторных и аускультативных изменений
- 58. Для аллергического фаринготрахеита характерны
 - о кашель с прозрачной слизистой мокротой
- 59. Активность лимфоцитов и плазматических клеток подавляет
 - о метилпреднизолон (урбазон)
- 60. При дефекте межжелудочковой перегородки максимум шума определяется
 - о на груди
- 61. Наибольшее диагностическое значение при системной красной волчанке имеют
 - о антитела к ДНК
- 62. У мальчика 10 лет боль и припухлость коленных и голеностопных суставов, температура 38 С. Левая граница сердца увеличена на 2 см. Тоны сердца приглушены. Неделю назад перенес ангину. Ваш предварительный диагноз
 - о ревматизм
- 63. При ревматическом эндокардите чаще наблюдается поражение
 - о двухстворчатого клапана
- 64. Ребенок лечился в стационаре в течение 2

- месяцев. Активность ревматизма стихла. После выписки ему необходимо рекомендовать
- о аспирин (1/2 возрастной дозы) и бициллин-5
65. К группе нестероидных противовоспалительных препаратов не относится
- о преднизолон
66. Для гиперкоагуляции крови не характерно
- о гемоглобин 100 г/л
67. При отеке легких нецелесообразно
- о введение максимальных доз строфантина
68. Ребенка с гипертензией необязательно консультировать
- о у гинеколога
69. Для суправентрикулярной формы пароксизмальной тахикардии характерными ЭКГ-признаками являются
- о ритм более 180 в минуту, регулярный, суправентрикулярный комплекс QRS
70. При полной атриовентрикулярной (поперечной) блокаде могут наблюдаться приступы
- о потери сознания
71. При поствирусном миокардите следует назначить
- о дигоксин
72. Систолический шум с максимумом на верхушке сердца чаще всего связан с патологией
- о митрального клапана
73. В норме зубец Р у детей в III отведении не должен быть
- о изоэлектричен (отсутствует)
74. Внутритрубно отсутствует
- о отверстие в межжелудочковой перегородке
75. Амилоидоз чаще развивается
- о при ревматоидном артрите
76. Для дерматомиозита наиболее характерно
- о кальциноз
77. При тетраде Фалло не наблюдается
- о стеноз аорты
78. Для эзофагита характерно
- о боли за грудиной
79. Ахалазия сопровождается
- о рвотой непереваренной пищей
80. Наиболее информативным исследованием при гастрите является
- о эндоскопия
81. Целесообразнее использовать при холепатиях
- о щелочные минеральные воды средней и слабой минерализации
82. О наличии гепатоцитолита не свидетельствует
- о непрямая гипербилирубинемия
83. Для профилактики рецидивов заболеваний гепатобилиарной системы целесообразно назначить
- о печеночный стол постоянно
84. Основной функцией тонкой кишки является
- о всасывание
85. Формирование каловых масс в толстой кишке связано с
- о всасыванием жидкости
86. Принцип диетотерапии в группе риска по колитам заключается в назначении
- о диеты, регулирующей ритм дефекации
87. Непосредственно влияет на деятельность почечных канальцев
- о альдостерон
88. Экскреция оксалатов, уратов в моче определяется обычно
- о в суточной моче
89. Показаниями к проведению рентгеноконтрастного исследования мочевой системы являются
- о аномалия развития уrogenитальной области
90. К ведущим симптомам нефротической формы гломерулонефрита не относится
- о абдоминальный синдром
91. У больного с гломерулонефритом при анасарке и угрозе отека легкого целесообразно применять
- о лазикс
92. К признакам, подтверждающим диагноз "диабетическая кетоацидотическая кома" не относится
- о обилие хрипов в легких
93. Мальчик 8 лет потерял сознание 1 час назад. Отмечаются дыхание Куссмауля, гиперемия щек, сухость кожи. Глазные яблоки мягкие, печень - 3 см, запах ацетона. В течение 3 недель жажда, частые мочеиспускания; похудание. Ваш предварительный диагноз
- о диабетическая кетоацидотическая кома
94. К мероприятиям, обеспечивающим профилактику инфекционных заболеваний в ДДУ, относится
- о работа фильтра
95. Генерализованное увеличение лимфоузлов не характерно
- о для хронического тонзиллита
96. Микроциркуляцию не улучшает
- о гентамицин
97. При аутоиммунных гемолитических анемиях у детей не определяются
- о полные холодовые агглютинины
98. При лечении талассемии противопоказан
- о препарат железа
99. К клиническим признакам дефицита железа не относится
- о спленомегалия (у ребенка старше 1 год1)
100. Абсолютная нейтропения не связана
- о с острой кровопотерей
101. К системе амбулаторно-поликлинической помощи детям в городе не относятся
- о фельдшерско-акушерский пункт
102. Сроки беременности при которых произошло повреждение плода, если ребенок родился с признаками физиологической незрелости
- о 28-32 недели
103. Выберите средневозрастную норму частоты дыхания ребенка 3 лет
- о 25-35 в минуту
104. Критерием для отнесения ребенка ко IIB группе здоровья не является
- о наличие хронических заболеваний
105. В занятия гимнастикой с детьми раннего возраста обязательно вводятся гимнастические пособия
- о с 6 месяцев
106. Часть младенческой смертности, которая образуется за счет неонатальной смертности, составляет
- о 60-70%
107. Показателем нормального развития ребенка 1 месяца не является
- о зрительное сосредоточение (гуление)
108. Моторная плотность урока физической культуры для учащихся общеобразовательной школы, отнесенных по состоянию здоровья к

- основной медицинской группе, должна составлять
- о 60-80%
109. Исключите реакцию, не характерную для функциональных проб, у физически неподготовленных детей
- о нормостеническая
110. Процессы накопления массы тела преобладают в
- о грудном возрасте
111. Для скрининговой диагностики леворукости не обязательно
- о обследование у невропатолога
112. Кормление ребенка грудью не затруднено при наличии
- о жидкого стула
113. Показаниями для госпитализации детей с острой пневмонией являются
- о новорожденные дети
114. Объемный метод расчета питания детей в возрасте от 2 до 4 месяцев составляет
- о 1/6 от массы тела
115. Суточная потребность в белке у детей 1-4 месяцев жизни при естественном вскармливании составляет
- о 2,2 г/кг
116. К пищевым корригирующим добавкам не относится
- о овощное пюре
117. Прикорм ребенку в возрасте 4 месяцев нельзя вводить
- о при остром заболевании
 - о с 7,5-8 месяцев
118. Печень Можно давать ребенку
- о с 7,5-8 месяцев
119. Характер кулинарной обработки пищи для детей различного возраста не зависит
- о от аппетита
120. В меню с позиции профилактики пищевых отравлений Не рекомендуется включать
- о макароны по-флотски
 - о (салаты из свежих овощей)
121. В рацион питания ребенка с диабетической комой после прекращения рвоты, тошноты не включают
- о сладкое питье
122. Для адреногенитального синдрома у мальчиков на 1-м году жизни характерно
- о увеличение полового члена
123. К факторам неспецифической защиты не относятся
- о лимфоциты
124. Ягоды, не рекомендуемые при пищевой аллергии
- о клубника
125. Какие продукты реже всего способствуют развитию пищевой аллергии
- о Хлеб, овес
126. Продолжительность периода определения толерантности к пище при гипотрофии 1 степени составляет
- о 1-2 дня
127. Наиболее опасный источник вирусной инфекции в родильном доме
- о больной ОРВИ персонал
128. Желудок ребенка при искусственном вскармливании освобождается за
- о 2,5-3,5 часа
129. Чаще всего наблюдается конъюнктивит
- о при хламидиозе
130. Главная опасность заболевания беременной женщины миксовирусными инфекциями (гриппом, свинкой, корью) заключается
- о в увеличении риска самопроизвольного выкидыша и антенатальной гибели плода
131. Потребность плода в железе значительно возрастает
- о с 28 недель
132. Организм новорожденного ребенка не может вырабатывать в достаточном количестве Иммуноглобулины класса
- о IgG
133. Ведущим физиологическим механизмом очищения дыхательных путей у новорожденных является
- о чиханье
134. Самая частая причина анемии при рождении
- о кровопотеря или гемолиз
135. Развитие кожных геморрагических проявлений при сепсисе объясняется
- о развитием ангиитов и тромбоваскулитов
136. Нивелирование психоэмоционального стресса к концу первой учебной четверти свидетельствует о
- о благоприятной адаптации
137. При каком виде вскармливания наиболее рано проявляются признаки врожденного гипотиреоза
- о раннем искусственном
138. Множественный гемангиоматоз со склонностью к кровотечениям при нормальном количестве тромбоцитов в крови свидетельствует
- о о синдроме Рендю - Ослера
139. Судорожный синдром у недоношенных детей чаще других вызывает
- о обменные нарушения (гипогликемия, гипокальциемия)
140. Наиболее частая причина поражения ЦНС у недоношенных новорожденных
- о пренатальная патология
141. Среди локальных гнойных заболеваний у недоношенных детей чаще всего встречается
- о Омфалит (везикулоступулес)
142. У недоношенных детей чаще встречается пневмония
- о очаговая
143. Наиболее характерным признаком острого периода врожденного токсоплазмоза является
- о обнаружение антител против токсоплазмы в составе IgM
144. Неотложную терапию проводят при варианте адреногенитального синдрома
- о с потерей солей
145. Белково-клеточная диссоциация в ликворе больного менингоэнцефалитом чаще имеет место в случае этиологии
- о токсоплазмозной
146. Какова причина уменьшения частоты обструктивного бронхита с возрастом ребенка
- о увеличение просвета бронхов
147. Коагулопатия с одновременным удлинением времени свертывания и кровотечения имеет место
- о при афибриногенемии
148. Устранить депрессию дыхания при передозировке барбитуратов можно с помощью
- о бемегида
149. Для гемолитикоуремического синдрома не

- типично
 - о повышение конъюгированного билирубина в сыворотке
- 150. Полиурия является ведущим симптомом в раннем периоде развития
 - о несахарный диабет
- 151. Термин "экссудативно-катаральный диатез" следует использовать
 - о для констатации предрасположенности ребенка к экссудативно-катаральному типу воспаления
- 152. Доза эуфиллина должна быть уменьшена
 - о при заболеваниях печени и сердечной недостаточности
- 153. Развитие пиоторакса в первые 2-3 дня от начала заболевания типично
 - о для стафилококковой пневмонии
- 154. Для лечения пневмококковой пневмонии Нецелесообразно
 - о гентамицин
- 155. К направлениям деятельности поликлиники не относятся
 - о проведение санитарно-эпидемиологического надзора
- 156. Действие интала обусловлено
 - о нормализацией мембранного обмена тучных клеток
- 157. Эозинофильный легочный инфильтрат с эозинофилией не наблюдается при
 - о малярии
- 158. При аллергическом фаринготрахеите обосновано назначение
 - о задитена
- 159. Выделение гепарина подавляет
 - о дексаметазон
- 160. Частые пневмонии не наблюдаются при
 - о тетрады Фалло
- 161. При системной красной волчанке наибольшую диагностическую значимость имеет
 - о LE-клетки
- 162. Для диагностики ревматизма по Киселю - Джонсу - Нестерову основным критерием является
 - о полиартрит
- 163. Основной причиной формирования приобретенных пороков сердца у детей является
 - о ревматизм
- 164. За осуществление реабилитации детей, перенесших атаку ревматизма, в поликлинике отвечает
 - о участковый педиатр
- 165. Аминохинолиновые препараты не применяются в случае
 - о пузырно-мочеточникового рефлюкса
- 166. Агрегацию тромбоцитов не уменьшает
 - о строфантина
- 167. Ортостатический коллапс может вызвать
 - о анаприлин
- 168. При неотложном состоянии у ребенка наибольшее диагностическое значение имеет
 - о ЭКГ
- 169. Для желудочковой формы пароксизмальной тахикардии характерными ЭКГ-признаками являются
 - о ритм 160 в минуту, регулярный, резко деформированный комплекс QRS
- 170. В случае приступа Морганьи - Эдемса - Стокса при атриовентрикулярной блокаде к средствам неотложной терапии не относится
 - о строфантин
- 171. В диагностике поствирусного миокардита наибольшее значение имеет
 - о рентгенограмма сердца
- 172. На электрокардиограмме в большей степени отражается содержание
 - о калия
- 173. В норме у грудных детей на ЭКГ преобладают потенциалы
 - о правого желудочка
- 174. Для дифференциальной диагностики поражения коленного сустава ревматоидной и туберкулезной природы наиболее информативно
 - о рентгенологические данные
- 175. Для периодической болезни не характерно
 - о кардит
- 176. Лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, полиартрит наиболее характерны
 - о для ревматоидного артрита
- 177. Конъюнктивит часто наблюдается
 - о при синдроме Рейтера
- 178. Ребенку с рецидивирующей рвотой необходимо провести в первую очередь
 - о рентгеноскопию желудка с водно-сифонной пробой
- 179. Боли за грудиной связаны
 - о с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите
- 180. Развитие пилороспазма у детей старшего возраста возможно
 - о при дуоденогастральных рефлюксах
- 181. Для синдрома внутрипеченочного холестаза не характерен признак
 - о гипербилирубинемии
- 182. Для хронического гепатита не характерно
 - о повышение холестерина
- 183. При заболеваниях гепатобилиарной системы рекомендуется прием пищи
 - о 4-5 раз в день с обязательным присутствием желчегонных продуктов
- 184. Для лечения острого и хронического панкреатита нельзя использовать
 - о морфий
- 185. Показатели копрограммы, несвязанные с патологией толстой кишки
 - о мышечные волокна
- 186. Физиотерапевтическая профилактика утраты рефлекса на дефекацию заключается в назначении
 - о кишечного душа с минеральной водой
- 187. Интервал между введением иммуноглобулина и последующей плановой прививкой составляет
 - о 6 недель
- 188. Повышение мочевой кислоты в крови может свидетельствовать
 - о нарушении обмена пуринов
- 189. Гломерулонефрит является заболеванием
 - о иммунокомплексным
- 190. Гиперулобулинемия характерна
 - о для волчаночного нефрита
- 191. Мальчику 6 лет, у которого появились отеки век, голеней, мало мочится целесообразно назначить диету
 - о стол без соли, мяса
- 192. При врожденном нелеченном первичном

- гипотиреозе не наблюдается
- о полиурия
- 193. Для больного сахарным диабетом не характерно
 - о экзофтальм
- 194. Для больного сахарным диабетом не характерно
 - о плаксивость
- 195. Лимфоцитоз не связан
 - о с бактериальной инфекцией
- 196. Не сопровождается эозинофилией
 - о энтеробиоз
- 197. К основным причинам дефицита железа не относится
 - о гемолиз
- 198. К методам лечения парциальной красноклеточной аплазии не относится
 - о иммуностимуляторы
- 199. Новорожденные 1 группы здоровья наблюдаются на 1 месяце жизни
 - о 5 раз (3 раза)
- 200. При гемофилии наиболее информативно
 - о определение плазменных факторов свертывания
- 201. Показатель рождаемости считается низким, если он равен
 - о 11-15 на 1000 населения
- 202. Действие повреждающих факторов может обусловить постнатальную гипоксию ребенка на сроке беременности
 - о 28-32 недели
- 203. Уровень резистентности организма ребенка определяется
 - о кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру
- 204. Группа здоровья ребенка 1 года 10 месяцев с врожденным артрогриппозом
 - о пятая
- 205. В комплекс занятий гимнастикой и массажем с детьми раннего возраста обязательно вводятся упражнения под счет
 - о с 4 месяцев
- 206. Частота смертности детей на втором году жизни в сравнении с первым снижается
 - о в 9-10 раз
- 207. Показатель, не относящийся к характеристике нормального психомоторного развития ребенка 3 месяцев
 - о певучее гуление
- 208. Длительное стояние детей на "линейке" в школе и в других случаях прежде всего нецелесообразно потому, что это может быть причиной
 - о ортостатических обмороков
- 209. Классический синдром переносимости новорожденного не включает
 - о отек подкожной клетчатки
- 210. Группа здоровья ребенка, который имеет сниженную длину тела. Масса абсолютно соответствует длине
 - о вторая
- 211. Диурез это
 - о оценка соотношения выпитой и выделенной жидкости за сутки
- 212. Показанием к более позднему прикладыванию к груди со стороны ребенка не является наличие
 - о отита
- 213. В составе коровьего молока по сравнению с женским молоком содержится
 - о больше глобулинов
- 214. Суточный объем пищи для детей от 4 до 6 месяцев
 - о 1/7 от массы тела
- 215. Суточная потребность в белке у детей 1-4 месяцев жизни при искусственном вскармливании составляет
 - о 2,2 г/кг
- 216. Желток рекомендуется вводить ребенку в возрасте
 - о 6 месяцев
- 217. К правилам введения прикорма не относится утверждение
 - о не вводят одновременно 2 прикорма
- 218. Целесообразно вводить в питание мясной фарш в возрасте
 - о 7 месяцев
- 219. Коррекция дефицита белка осуществляется введением в рацион питания
 - о творога, желтка
- 220. У детей в возрасте 4-6 лет калорийность суточного рациона составляет 1970 ккал, норма жира - 68 г, углеводов - 272 г. Норма белка при этом равна
 - о 68 г
- 221. К группе хромосомных не относится
 - о болезнь Дауна
 - о синдром Альпорта и Нунан
 - о синдром Шерешевского - Тернера
 - о синдром Пату
- 222. Для вирильной формы аденогенитального синдрома у девочек не характерно
 - о увеличение клитора и половых губ
 - о костный мозг опережает паспортный
 - о в моче увеличено содержание 17-кетостероидов
 - о гепатоспленомегалия
- 223. К факторам специфической защиты относятся
 - о простагландины
- 224. При пищевой аллергии не рекомендуется
 - о репа
- 225. Понятие "пищевая аллергия" включает в себя
 - о непереносимость пищевых продуктов
- 226. Причиной поллинозов являются
 - о эпидермальные
- 227. Хранить в холодильнике непастеризованное молоко, собранное у матерей в ночные часы можно хранить
 - о не более 3 ч
- 228. Если беременная страдает сахарным диабетом, то у плода возможно развитие
 - о фетопатии
- 229. Наиболее неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие плода в первые 2 месяца беременности оказывают
 - о вирусные инфекции
- 230. Из перечисленных антибиотиков беременной женщине без риска для плода можно назначить
 - о цефалоспорины
- 231. В семье, где оба родителя больны хроническим алкоголизмом, родился доношенный мальчик массой тела 2200 г, ростом 48 см. В клинической картине: микроцефалия, лицевая дисморфия, синдром угнетения, сменившийся повышением нервно-рефлекторной возбудимости. можно

- о поставить диагноз
- о алкогольный синдром плода, микроцефалия
- 232. Потребность в белке доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании
 - о 2,2 г/кг в сутки
- 233. Нормальная частота дыхания у здорового новорожденного
 - о 40-60 в минуту
- 234. К наиболее частым причинам миокардита у новорожденных детей относятся инфекции, вызванные
 - о вирусом Коксаки
- 235. Основной дифференциально-диагностический признак сепсиса
 - о нарушения иммунитета и глубокие изменения гемостаза
- 236. При атонических запорах у новорожденных детей не показано
 - о проведение клизмы
- 237. Рино-синцициальная инфекция чаще всего вызывает
 - о бронхолит
- 238. Особенности гипотиреоза при рождении
 - о специфических симптомов при рождении нет
- 239. Клиника дыхательной недостаточности при ядерной желтухе отличается от пневмонии
 - о резким угнетением дыхательного центра (брадипноз)
- 240. Суточная потребность в жидкости у недоношенных детей после 10-го дня жизни, включая питание составляет
 - о 130-160 мл/кг
- 241. Для недоношенных новорожденных с внутриутробной гипотрофией характерна
 - о гипогликемия
- 242. Входными воротами инфекции при сепсисе у недоношенных детей чаще всего является
 - о пупочная ранка
- 243. На внутриутробную инфекцию у ребенка 1-го дня жизни может с большей достоверностью указывать
 - о увеличение IgM
- 244. Диагноз муковисцидоза подтверждает
 - о определение электролитов пота
- 245. У ребенка в возрасте 2 дней обнаружен четко выраженный краниотабес. необходимо
 - о ограничиться наблюдением
- 246. Из перечисленных клинических признаков при экссудативном плеврите отсутствуют
 - о бронхиальный тип дыхания
- 247. Из перечисленных признаков для муковисцидоза не характерна
 - о гипернатриемия
- 248. Сдвигу КОС в сторону ацидоза способствует
 - о циркуляторная гипоксия
- 249. для синдрома внезапной смерти у детей характерно
 - о семейная предрасположенность к внезапной смерти
- 250. Концентрационную функцию почек лучше оценивать пробой
 - о по Зимницкому
- 251. Основным механизм псевдоаллергической реакции связан
 - о с повышенной возбудимостью тучных клеток и выделением гистамина
- 252. Основным органом, участвующим в метаболизме лекарств, является
 - о печень
- 253. Пневмоторакс без развития плеврита типичен
 - о для пневмоцистной пневмонии
- 254. Показанием к проведению инфузионной терапии является
 - о олигурия
- 255. На втором году жизни педиатр наблюдает здорового ребенка
 - о 4 раза в год
- 256. Перед проведением гипосенсибилизации не показано
 - о бронхоскопия
- 257. Для выявления уровня жидкости в полости плевры необходимо в первую очередь провести
 - о рентгеновский снимок легких в вертикальном положении
- 258. Причиной экспираторной одышки при бронхиальной астме является
 - о бронхоспазм
- 259. У мальчика 5 лет утомляемость, усиление пульсации левого желудочка, дрожание во 2-м межреберье слева, на ЭКГ перегрузка левого желудочка, на рентгенограмме - гиперволемию левого желудочка. можно думать о диагнозе
 - о открытый артериальный проток
- 260. При тетраде Фалло наиболее частым осложнением является
 - о тромбозы сосудов
- 261. При гранулематозе Вегенера редко наблюдаются
 - о изменения со стороны нервной системы
- 262. Из перечисленных признаков в основные диагностические критерии ревматизма входит
 - о хорея
- 263. При резко выраженной недостаточности аортального клапана артериальное давление обычно
 - о систолическое - нормальное или повышено, диастолическое - снижено
- 264. Ребенку 10 лет. Диагноз: ревматизм, 1 атака, активная фаза, активность III степени, миокардит, полиартрит. Этому ребенку можно назначить ЛФК лежа
 - о через 2 недели от начала атаки
- 265. Осложнения со стороны крови могут возникнуть при использовании
 - о вольтарена
- 266. При тромбоцитопении не следует назначать
 - о ацетилсалициловую кислоты
- 267. При острой сердечно-сосудистой недостаточности не показано применение
 - о анаприлина
- 268. Тонус мышц у новорожденных проверяется
 - о пробой на "тракцию"
- 269. Препаратом, с которого целесообразно начать выведение из приступа пароксизмальной тахикардии ребенка в возрасте 8 месяцев (ЭКГ не записывалась, артериальное давление измерить не удалось), является
 - о кокарбоксилаза или витамин B1 внутривенно, АТФ внутримышечно
- 270. Для вегетодистонии по симпатикотоническому типу не характерны
 - о мраморность кожи, акроцианоз
- 271. Инфекционно-токсическую кардиопатию (дистрофию миокарда) при пневмонии характеризует
 - о снижение зубца Т

272. Исследование, обязательно показанное грудному ребенку перед назначением плавания
- о ЭКГ
273. Зубец Т в отведениях II, V5, V6 регистрируется
- о положительный
274. К препаратам, уменьшающим агрегацию тромбоцитов, не относятся
- о фенилин
275. Для выявления амилоидоза наиболее информативно
- о биопсия пораженного органа
276. Поражение глаз характерно
- о для ревматоидного артрита
277. Уретритом сопровождается
- о синдром Рейтера
278. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови при рецидивирующей рвоте необходимо провести в первую очередь анализ на
- о КОС
279. Недостаточность привратника не отражает
- о рвота без примеси желчи
280. При дискинезии 12-перстной кишки не наблюдаются
- о боли по ходу толстой кишки
281. Развитие внутрипеченочного холестаза не наблюдается
- о при дискинезии желчевыводящих путей
282. Возможным прогнозом токсического гепатита не является
- о абсцедирование
283. Не усиливает непрямую гипербилирубинемия
- о верошпирон
284. Основными в лечении хронического энтерита являются
- о полиферментные препараты
285. К основному копрологическому признаку неспецифического язвенного колита относится
- о выделение слизи с кровью
286. Медикаментозная профилактика при неспецифическом язвенном колите заключается в назначении
- о средств, нормализующих состав флоры толстой кишки
287. Количество ретикулоцитов (%) у детей, кроме периода новорожденности, составляет
- о 5-10
288. По анализу мочи по Нечипоренко можно судить
- о о лейкоцитурии
289. Гломерулонефрит чаще развивается
- о после 2-3 лет
290. Ограничение соли не показано при
- о микропротеинурии
291. Тубулоинтерстициальный нефрит является
- о абактериальным воспалением
292. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) не отмечаются признаки
- о повышения артериального давления
293. Для первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна) не характерно
- о повышение сахара в крови
294. Ребенка с эутиреоидным увеличением щитовидной железы III степени, вегетососудистой дистонией следует лечить
- о у эндокринолога
295. При гемофилии А следует назначить
- о концентрат VIII фактора
296. Функциональную способность тромбоцитов не характеризует
- о подсчет тромбоцитов
297. При наличии у ребенка тромбоцитопатии и спленомегалии необходимо произвести
- о стерильную пункцию
298. При гемофилической пурпуре можно назначать
- о эписилон-аминокапроновую кислоту
299. Нехарактерным серологическим изменением при лимфогранулематозах является
- о снижение железа
300. Для детского возраста характерны
- о моноцитарный лейкоз
301. Основным разделом работы в области профилактики участкового педиатра с детьми дошкольного возраста является
- о динамическое наблюдение за здоровьем детей в возрасте от рождения до 7 лет
302. График работ кабинета по воспитанию здорового ребенка в поликлинике для обеспечения качественного профилактического наблюдения необходимо организовать
- о в зависимости от мощности поликлиники
303. Ребенок 1 года 7 месяцев. Детское учреждение не посещает, анамнез благополучный; физическое и нервно-психическое развитие соответствует возрастной норме; 3 раза за последний год болел ОРЗ; уровень основных функций органов и систем не изменен. ребенка относят к группе здоровья
- о первой
304. Часто болеющему ребенку 1 года 3 месяцев с дефицитом массы тела следует назначить комплекс гимнастики
- о возрастной + лечебный
305. Здоровым детям в возрасте 6 месяцев нужно проводить массаж
- о массаж спины, живота и стоп
306. Показатель младенческой смертности можно рассчитывать При числе родившихся детей
- о 1000
307. При заключении о состоянии здоровья ребенка 5 месяцев педиатр не оценивает из числа линий развития
- о понимание речи
308. Перед назначением плавания грудному ребенку обязательным исследованием является
- о рентгенография грудной клетки
309. Данные скринингового исследования физического развития: длина - 50-й центиль; масса - 75-й центиль. физическое развитие Оценивается как
- о среднее
310. Биологический возраст ребенка в возрасте 6 лет с нормальной массой тела, прибавкой длины за год на 5 см, одним постоянным зубом оценивается как
- о отставание от возраста
311. Укажите основные причины леворукости детей
- о индивидуально-психологические особенности развития ребенка
312. Противопоказаниями со стороны матери к кормлению грудью не являются

- о грипп
- 313. Характеристикой, отличающей Женское молоко от коровьего молока не является
 - о преобладание казеиногена
- 314. Число кормлений детей возрасте от 1 до 3 месяцев составляет
 - о 6 раз в сутки
- 315. Суточная потребность в белке у детей после введения прикорма при естественном вскармливании составляет
 - о 2,2 г/кг
- 316. Сроки введения кефира ребенку, находящемуся на грудном вскармливании
 - о 8 месяцев
- 317. Приготовление овощного пюре считается неправильным, если
 - о разваривать овощи в большом количестве воды без крышки
- 318. К особенностям оценки достаточности питания детей 1-го года жизни не относят оценку
 - о наследственности
- 319. Дефицит жира в рационе питания детей не может быть восполнен за счет употребления
 - о яичного белка
- 320. На фоне лечения нестероидными противовоспалительными препаратами необходима диетическая коррекция
 - о продуктами, обладающими защитными свойствами по отношению к слизистой желудочно-кишечного тракта
- 321. Для синдрома "кошачьего крика" характерно
 - о делеция плечика 5-й пары хромосом
- 322. К антителам относится
 - о иммуноглобулин А
- 323. К иммунодефицитным состояниям относятся
 - о синдром Луи - Бар (атаксия-телеангиоэктазия)
- 324. При пищевой аллергии детям не рекомендуют употреблять в пищу
 - о абрикосы
- 325. Реже всего лекарственную аллергию вызывают
 - о антигистаминные препараты
- 326. К основным клиническим формам поллинозов нельзя отнести
 - о аллергический альвеолит
- 327. Дальнейшее снижение перинатальной смертности при низком ее уровне От качества в основном зависит от работы
 - о женской консультации
- 328. Обработка рук персонала в отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей производится
 - о туалетным мылом в проточной воде (дважды)
- 329. Влияние различных вредностей в первые 2 месяца беременности чаще всего приводит
 - о к формированию пороков развития
- 330. Основной путь инфицирования плода при активном туберкулезе у матери
 - о трансплацентарный
- 331. Росту бифидобактерий способствует
 - о бета-лактоза
- 332. У доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании, потребность в углеводах составляет
 - о 13 г/кг в сутки
- 333. Расширение венозной сети на передней брюшной стенке появляется при
 - о портальной гипертензии
- 334. Показанием к назначению гидрокортизона у новорожденных с сепсисом является
 - о развитие септического шока
- 335. Для грам-отрицательной флоры наиболее характерна локализация очага остеомиелита в
 - о метафизах трубчатых костей
- 336. Для адреногенитального синдрома у новорожденной девочки патогномичным является
 - о вирильные наружные гениталии с пигментацией
- 337. Частым осложнением энтеровирусной инфекции являются
 - о серозный менингит и миокардит
- 338. Антибактериальная терапия новорожденному с ограниченной формой везикулопустулеза
 - о не показана
- 339. Метод вскармливания недоношенного ребенка определяет
 - о функциональная зрелость и общее состояние ребенка
- 340. В раннем неонатальном периоде наиболее часто вызывают гибель недоношенных детей
 - о асфиксия и синдром дыхательных расстройств
- 341. У недоношенных детей с массой тела менее 1500 г в первые три недели жизни наиболее часто встречается
 - о витамин Е-дефицитная анемия
- 342. Длительная ингаляция 100% кислорода может вызвать у недоношенного ребенка
 - о развитие ретролентальной фиброплазии
- 343. Уровень непрямого билирубина сыворотки крови уменьшает
 - о люминал (фенобарбитал)
- 344. Признаки мужского пола ребенка можно трактовать как фенкопию При
 - о адреногенитальном синдроме
- 345. Карпепедальный спазм характерен
 - о для гипокальциемии
- 346. Полное расправление легких у новорожденных происходит
 - о в течение нескольких дней
- 347. "Мойнингамовский" ритм болей при заболеваниях желудка у детей
 - о боль после приема пищи уменьшается, а затем вновь усиливается
- 348. Гематокрит остается нормальным
 - о при изотоническом эксикозе
- 349. Ригидности затылочных мышц не наблюдают
 - о при вазомоторном коллапсе
- 350. Для почечно-тубулярного ацидоза не характерно
 - о гипергликемия
- 351. Пищевым продуктом, обладающим выраженным либераторным эффектом, считают
 - о цитрусовые
- 352. При проведении антибиотикотерапии необходимо придерживаться следующей рекомендации
 - о создавать достаточные концентрации антибиотиков
- 353. Утолщение кожной складки над пораженным участком типично
 - о для гнойного плеврита
- 354. Округлые инфильтраты в легких заставляют исключать

- о новообразования
- 355. Для бронхиальной астмы не характерно
 - о повышение хлоридов поте и моче
- 356. При atopической бронхиальной астме не рекомендуется назначать
 - о обзидан
- 357. При гиперсекреторных нарушениях в приступный период бронхиальной астмы показаны
 - о отхаркивающие средства, эуфиллин, ингаляции с муколитиками, обильное щелочное питье
 - о (ингаляционные глюкокортикостероиды в сочетании с отхаркивающими средствами и дренажной терапией)
- 358. Синдром бронхиальной астмы с эозинофилией иногда наблюдается
 - о при узелковом периартериите
- 359. У больного с открытым артериальным протоком не наблюдается
 - о полицитемия
- 360. При тетраде Фалло не бывает
 - о бессимптомного течения
- 361. При склеродермии наиболее часто наблюдается
 - о поражение кожи
- 362. Одним из основных диагностических критериев ревматизма является
 - о кардит
- 363. Набухание вен на шее не может свидетельствовать
 - о о недостаточности клапанов аорты
- 364. Недостаточность кровообращения у ребенка в возрасте 3 месяцев обычно не является следствием
 - о ревматического кардита
- 365. У ребенка с анемией не рекомендуется применять
 - о левомицетин
- 366. Ребенок 8 лет перенес 2 атаки ревматизма. Сформировалась митральная недостаточность. В этой ситуации проводить профилактику бициллином необходимо в течение
 - о 5 лет
- 367. Из перечисленных препаратов при коллапсе не показан
 - о пипольфен
- 368. Из перечисленных препаратов к β -адреноблокаторам относится
 - о анаприлин
- 369. Выведение ребенка в возрасте 6 месяцев из приступа суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии целесообразно начать с введения
 - о мезатона, затем изоптина внутривенно
- 370. Для ваготонического типа вегетодистонии не характерны
 - о тахикардия
- 371. Амилоидоз чаще осложняет
 - о ревматоидный артрит
- 372. Метод электрокардиографии отражает меньше всего
 - о сократимость
- 373. Снижение зубца Т на ЭКГ не вызывает
 - о гиперкалиемию
- 374. Нестероидные противовоспалительные препараты не обладают действием
 - о повышающим активность ферментов
- 375. Для системной красной волчанки характерно повышение иммуноглобулинов крови класса
 - о IgG
- 376. Критерии Киселя – Джонса - Нестерова используются в диагностике
 - о ревматоидного артрита
- 377. Инсоляция провоцирует развитие
 - о системной красной волчанки
- 378. При склонности к рецидивирующей рвоте из перечисленных препаратов предпочтителен
 - о реглан (церукал)
- 379. Дуоденогастральные рефлюксы могут способствовать развитию
 - о антрального гастрита
- 380. Для заболевания желчного пузыря не патогномичен
 - о Пастернацкого
- 381. Показателем гепатоцитолита является
 - о гипертрансаминаземия
- 382. Желтуха Жильбера чаще выявляется
 - о в школьном возрасте
- 383. При гепатоцитолите целесообразнее
 - о лактулоза
- 384. Основной причиной угнетения иммунологической реактивности при гипотрофии является
 - о нарушение обмена белков
- 385. Показанием для проведения ирригоскопии являются
 - о выделение слизи, крови с калом
- 386. Фитопрофилактика раздраженной толстой кишки заключается в назначении
 - о ромашки, зверобоя, пустырника
- 387. Почка экскретирует
 - о ренин
- 388. Значительное повышение IgG в крови наблюдается
 - о при системной красной волчанке
- 389. Гематурическая форма гломерулонефрита чаще развивается в возрасте
 - о после 6-7 лет
- 390. Разгрузочная диета показана
 - о при острых проявлениях гломерулонефрита
- 391. Анаболическим действием обладает
 - о оротат калия
- 392. Больному с кетоацидотической прекомой сахарного диабета следует назначить
 - о срочную госпитализацию в эндокринологическое отделение
- 393. У больных с врожденным первичным гипотиреозом не наблюдается
 - о высокого уровня гормона роста
- 394. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) наблюдается
 - о желтушность кожи
- 395. Парапротеинемический гемабластоз, встречающийся у детей
 - о болезнь тяжелых цепей
- 396. Для верификации диагноза хронического миелолейкоза необходимо проведение
 - о пункции селезенки
- 397. При остром лейкозе не характерен
 - о ретикулоцитоз
- 398. Для анемий не характерно
 - о относительная лимфопения
- 399. Верификации диагноза апластической анемии не способствует
 - о определение СОЭ

400. Основная причина микросфероцитарных гемолитических анемий
- о врожденный дефект структуры мембранного белка эритроцита
401. Высоким показателем рождаемости является
- о 26-30 на 1000 населения
402. Ребенок первого года жизни должен посетить кабинет по воспитанию здорового ребенка
- о по рекомендации педиатра
403. Ребенок 2 лет 7 месяцев 3 раза за последний год болел ОРЗ. его резистентность оценивается как
- о нормальная
404. Ребенку 3 месяцев можно назначить возрастную комплекс гимнастики и массажа при наличии рефлекса
- о Ландау
405. При проведении специальных закалывающих процедур является нежелательной стадия сосудисто-двигательной реакции
- о паретическое состояние
406. О нормальном развитии зрительных функций ребенка в возрасте 1 месяца свидетельствует показатель
- о плавное слежение за движущимся предметом
407. Ведущим в воспитании двигательной сферы ребенка 7 месяцев является
- о ползание
408. Витамин Д содержится в
- о желтке
409. Ребенку 11 месяцев. При очередном посещении врача выявлена дисгармония физического развития в виде избытка массы тела I степени. ребенку рекомендовано
- о консультация эндокринолога
410. У ребенка 1 года 1 месяца выявлена нейросенсорная глухота. Физическое развитие нормальное; нервно-психическое развитие соответствует возрасту по всем параметрам, кроме характеризующих речь. ребенка следует отнести
- о к пятой группе здоровья
411. К медицинским критериям готовности ребенка к поступлению в школу не относят
- о уровень школьной зрелости
412. Причинами возникновения вторичной гипогалактии являются все, кроме
- о сцеживания молока после каждого прикладывания к груди
413. Приближение по составу коровьего молока к женскому молоку не достигается способом
- о увеличения концентрации белка, углеводов, солей
414. Продолжительность диспансерного наблюдения в поликлинике за детьми с хроническим колитом составляет
- о до перевода во взрослую сеть
415. Суточная потребность в белке у детей после введения прикорма при искусственном вскармливании адаптированной смесью составляет
- о 3-4 г/кг
416. Правила проведения искусственного вскармливания адаптированными смесями
- о сроки введения пищевых добавок, как при естественном вскармливании
417. Прикорм овощным пюре вводят ребенку, находящемуся на естественном вскармливании, в возрасте
- о 5 месяцев
418. Эффективность питания детей в возрасте до 1 года нельзя оценить
- о генетическому анамнезу
419. Коррекция дефицита углеводов в рационе питания осуществляется
- о сахарным сиропом
420. На фоне лечения антибиотиками необходима диетическая коррекция путем
- о введения кисломолочных продуктов
421. С помощью пробы Феллинга диагностируют
- о фенилкетонурию
422. Плазматические клетки, непосредственно вырабатывающие антитела, образуются
- о из В-лимфоцитов
423. На внутриутробную инфекцию у новорожденных 5-ти дней указывает
- о увеличение IgM
424. Базисными препаратами в лечении пищевой аллергии являются
- о интал, задитен, налкром
425. На развитие лекарственной аллергии не влияет
- о пол ребенка
426. В приступном периоде бронхиальной астмы не назначается
- о супрастин
427. При возникновении в роддоме группового инфекционного заболевания больных новорожденных необходимо
- о немедленно перевести в соответствующий стационар
428. В течение первого года жизни недоношенный ребенок должен осматриваться невропатологом
- о в возрасте 1 месяца, затем не реже 2 раз в год
429. Клиническую картину при внутриутробных инфекциях в большей степени определяет
- о токсичность возбудителя
430. Наиболее характерными симптомами врожденного туберкулеза являются
- о врожденная катаракта, эритематозная сыпь, жидкий стул
431. У доношенных новорожденных, перенесших асфиксию в родах, самым частым вариантом поражения ЦНС является
- о отек мозга
432. Здорового недоношенного ребенка можно начинать купать
- о через 7 дней после рождения
433. В желудочно-кишечном тракте новорожденного ребенка железо всасывается на уровне
- о верхних отделов тонкой кишки
434. Большое количество нейтрального жира и его преобладание над жирными кислотами обнаруживается
- о при муковисцидозе
435. Остеомиелиту грам-отрицательной этиологии свойственно
- о вялотекущее, без отчетливо выраженного артрита и с неяркими рентгенологическими признаками
436. Наиболее частый вид гнойного поражения кожи у новорожденных детей
- о везикулопустулез
437. Причиной вторичного рецидивирующего омфалита является
- о неполный инфицированный свищ пупка
438. При дисахаридазной недостаточности

- о характер стула
 - о водянистый, кислый, трескучий
- 439. Недоношенному ребенку с внутриутробной гипотрофией, если толерантность его к пище неизвестна, следует рассчитывать питание
 - о на фактический вес
- 440. У недоношенных детей чаще встречаются пневмонии
 - о ранние бактериальные
- 441. По раннему развитию железодефицитной анемии наиболее угрожаемы недоношенные дети
 - о перенесшие после рождения тяжелые инфекции
- 442. Противозидемическую работу в домашнем очаге проводит
 - о участковый педиатр
- 443. К реактивным состояниям новорожденных не относят
 - о мелены
- 444. Супруги гетерозиготны по D(резус)-фактору. в случае рождения однойцевой двойни
 - о оба ребенка могут быть резус-положительны и гомозиготны по резус-фактору
- 445. При длительном применении инактивирует витамин D и способствует развитию рахита
 - о фенобарбитал
- 446. При острой пневмонии основным фактором возникновения гипоксемии является
 - о поверхностное дыхание
- 447. Целиакия
 - о сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника
- 448. Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует
 - о алкалоз
- 449. У детей раннего возраста фебрильные судороги
 - о наблюдают чаще в возрасте от 3 месяцев до 3 лет
- 450. Олигурия не встречается при
 - о сахарного диабета
- 451. К атопическому поражению кожи относится
 - о нейродерматит
- 452. В этиологии пневмонии в первом полугодии жизни меньшее значение имеет флора
 - о пневмококк
- 453. Диагностировать гнойный плеврит позволяет
 - о укорочение перкуторного звука и смещение органов средостения в здоровую сторону
- 454. Причиной экспираторной одышки является
 - о бронхоспазм
- 455. Для атопической бронхиальной астмы не характерно
 - о лейкоцитоз с выраженным палочкоядерным сдвигом
- 456. При "аспириновой" бронхиальной астме противопоказан
 - о кверсалин
- 457. При легком приступе бронхиальной астмы рекомендуется назначение
 - о обильного щелочного питья, эуфиллина, щелочных ингаляций
- 458. Обычно нет необходимости производить рентгенограмму грудной клетки для выявления увеличенных торакальных лимфоузлов
 - о 3) при инфекционном мононуклеозе
- 459. У больного с широким открытым артериальным протоком вряд ли может наблюдаться
 - о цианоз и "барабанные пальцы"
- 460. Одышечно-цианотические приступы наблюдаются
 - о при тетраде Фалло
- 461. При дерматомиозите наиболее часто наблюдается
 - о генерализованное поражение мышц
- 462. При ревматическом поражении суставов наблюдается
 - о доброкачественное течение полиартрита
- 463. При митральной недостаточности систолический шум бывает
 - о протяжный, дующий, связанный с I тоном, стойкий в динамике и при перемене положения, с максимумом на верхушке сердца
- 464. Нестероидные противовоспалительные препараты не рекомендуются
 - о при тромбоцитопенической пурпуре
- 465. Гипертензию может вызвать
 - о преднизолон
- 466. Укажите интервал между реакцией Манту и последующей прививкой СОСТАВЛЯЕТ
 - о 72 часа
- 467. Соотношение артериального давления правильно, когда
 - о АД на ногах выше, чем на руках на 20-30 мм рт. ст.
- 468. Ребенка с впервые выявленной частой экстрасистолой следует
 - о госпитализировать для обследования
- 469. Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при АД 90/60 мм рт. ст. целесообразнее с применения
 - о изоптина и кокарбоксилазы внутривенно
- 470. Тяжелый изолированный миокардит чаще наблюдается
 - о при поствирусном кардите
- 471. При инфекционно-токсической кардиопатии (дистрофии миокарда) наиболее целесообразно назначить
 - о оротат калия
- 472. Для гипертрофической кардиомиопатии при ультразвуковом исследовании сердца характерно
 - о гипертрофия межжелудочковой перегородки
- 473. Диспансерное наблюдение у кардиоревматолога не требуется детям
 - о с неполной блокадой правой ножки пучка Гисса
- 474. К нестероидным противовоспалительным препаратам не относится
 - о дисферал
- 475. Дрожание во 2-м межреберье слева чаще определяется
 - о при открытом артериальном протоке
- 476. Амилоидоз обычно не осложняет
 - о болезнь Шенлейна - Геноха
- 477. Эуфиллин не может вызывать
 - о атриовентрикулярной блокады
- 478. Наличие изжоги свидетельствует
 - о о забросе желудочного содержимого в пищевод
- 479. Не считается вибрационным симптом
 - о Образцова
- 480. О наличии рефлюкса из тонкой кишки в 12-перстную при исследовании осадка дуоденального содержимого свидетельствует

- о лямблии
- 481. Для гепаторенального синдрома характерно
 - о сочетание печеночной и почечной недостаточности
- 482. Для желтухи Жильбера характерно
 - о непрямая гипербилирубинемия
- 483. При печеночно-клеточной недостаточности не показано применение
 - о сульфаниламидов
- 484. Ведущим клиническим синдромом при хроническом энтерите является
 - о синдром нарушенного всасывания
- 485. Показанием для проведения колоноскопии являются
 - о повторные кровотечения из прямой кишки
- 486. Рвотой с кровью не сопровождается
 - о дискинезия желчевыводящих путей
 - о (хеликобактерны гастрит)
- 487. Не характеризует концентрационную функцию почек
 - о белок и белковые фракции
- 488. К иммунокомплексным болезням относят
 - о гломерулонефрит
- 489. Нефротическая форма гломерулонефрита чаще развивается в возрасте
 - о с 1 года до 7 лет
- 490. Антибактериальная терапия больному с гломерулонефритом не назначается
 - о при поддерживающем, прерывистом курсе преднизолона
- 491. Остеопороз чаще возникает При назначении
 - о преднизолона
- 492. При гипотиреозе педиатр должен
 - о направить больного на консультацию к эндокринологу
- 493. При врожденном первичном гипотиреозе не наблюдается
 - о полиурия
- 494. Применение мерказолила, пропранолола и преднизолона показано
 - о при диффузно-токсическом зобе III степени тяжелой формы
- 495. Наиболее эффективное лечение микросфероцитарной анемии
 - о спленэктомия
- 496. При гемолизе не наблюдается
 - о нейтропения
- 497. Гематологический признак, не характерный для талассемии
 - о снижение осмотической устойчивости эритроцитов
- 498. Правильная тактика применения препаратов железа
 - о до нормализации гемоглобина и еще 3-4 недели
- 499. 0499. Не является гематологическим признаком железодефицитной анемии
 - о 3) нормобластоз
- 500. Нетипичные изменения состава периферической крови при хроническом миелолейкозе
 - о лимфобласты в периферической крови
- 501. Полноту и качество диспансерного наблюдения за здоровьем детей отражают
 - о динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года
- 502. Перинатальная смертность это
 - о число мертворожденных (со сроком гестации > 28 недель) + число детей, умерших на первой неделе жизни, на 1000 родившихся живыми и мертвыми
- 503. Созревание функциональных систем идет наиболее активно
 - о в зависимости от системы
- 504. Резистентность пятилетнего Ребенка, который за последний год 5 раз болел ОРЗ
 - о сниженная
- 505. К целям второго дородового патронажа не относится
 - о назначение антибиотиков для профилактики гнойно-септических заболеваний ребенка
- 506. Основной принцип закаливания при выборе закаливающей процедуры
 - о учет возрастных и индивидуальных особенностей
- 507. При нормальном развитии слуховых функций ребенок в возрасте 1 месяца
 - о прислушивается к голосу взрослого
- 508. Ребенка 2 месяцев с нормальным нервно-психическим развитием нецелесообразно
 - о учить брать игрушку из рук взрослого
- 509. Методикой специального закаливания часто болеющего ребенка 3 лет, в генеалогическом анамнезе у которого три родственника с гипертонической болезнью и один с сахарным диабетом является
 - о постепенное снижение температуры
- 510. Ребенка 3 лет с перинатальной энцефалопатией в анамнезе впервые выявлен низкий рост (до 3-го центиля), Масса тела соответствует длине необходимо направить
 - о к эндокринологу
- 511. Для новорожденных, родившихся от матерей с сахарным диабетом, характерна
 - о большая масса тела
- 512. В задачи кабинета здорового ребенка не входит
 - о пропаганда знаний по кулинарно-технологической обработке блюд для детей 1 года жизни
- 513. При гипогалактии не рекомендуется
 - о употребление жидкости в малом количестве
- 514. Расчет суточного объема пищи для новорожденных при массе тела при рождении 3000 г по формуле Тура
 - о 70 мл · число дней, при массе тела при рождении менее 3200 г
- 515. Сколько раз в день следует кормить ребенка в возрасте 4 месяцев до введения прикорма?
 - о 6-5 раз
- 516. Суточная потребность в белке у детей после введения прикорма при смешанном вскармливании составляет
 - о 2,5 г/кг
- 517. На искусственное вскармливание ребенка переводят, если
 - о грудное молоко отсутствует или составляет менее 1/5 суточного объема
- 518. Прикормом не является
 - о творог
- 519. Критерием оценки Эффективности питания у детей в возрасте от 1 года до 14 лет не является
 - о наследственность
- 520. При сниженной биологической ценности пищи на массу тела ребенка сильнее влияет

- о избыток углеводов и жира
- 521. Детей 1-го года жизни при фенилкетонурии не рекомендуется кормить
 - о молочными смесями
- 522. К наследственным нарушениям обмена билирубина не относится
 - о прегановая желтуха
- 523. При аллергических процессах чаще всего изменяется уровень иммуноглобулинов
 - о Е
- 524. Показания для введения докорма
 - о стойкая гипогалактия
- 525. В комплексную оценку физического развития у детей старшего возраста не входит
 - о психомоторное развитие
- 526. На развитие лекарственной аллергии не влияет
 - о пол ребенка
- 527. Базисным препаратом в лечении респираторных аллергозов является
 - о антил, задитен
- 528. В палатах для новорожденных физиологического отделения родильного дома поддерживается температура воздуха
 - о не ниже 22-24°С
- 529. Доношенность или недоношенность определяются
 - о признаками, характеризующими зрелость ребенка
- 530. Заболевание сахарным диабетом матери на состояние инсулярного аппарата у плода
 - о активизирует клетки инсулярного аппарата
- 531. Наличие симптомов гиперфункции щитовидной железы в раннем неонатальном периоде у детей от матерей с тиреотоксикозом связано
 - о с трансплацентарной передачей плоду тиреостимулирующих иммуноглобулинов
- 532. Острое воспаление среднего уха сопровождается болезненностью при надавливании на козелок у детей в возрасте
 - о грудном
- 533. Оптимальное интеллектуальное развитие ребенка обеспечивает
 - о грудное вскармливание
- 534. Папула, везикула или пустула в месте инъекции после введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ может появиться
 - о через 4-6 недель
- 535. Препаратом выбора при лечении муковисцидоза является
 - о панкреатин
- 536. Изменения в лейкоцитарной формуле крови наиболее выражены при сепсисе
 - о грам-положительной этиологии
- 537. Для криза надпочечниковой недостаточности при адреногенитальном синдроме характерен
 - о метаболический ацидоз
- 538. Наиболее частая локализация гнойного очага при пупочном сепсисе
 - о пупочные сосуды
- 539. Полная транспозиция магистральных сосудов характеризуется
 - о диффузным цианозом
- 540. У новорожденного ребенка при охлаждении до 32°С может наблюдаться
 - о метаболический ацидоз
- 541. Самым частым осложнением пневмонии у недоношенных детей является
 - о сердечная недостаточность
- 542. Заместительная гемотрансфузия недоношенным детям с железодефицитной анемией показана при уровне гемоглобина
 - о 70 г/л
- 543. Наиболее существенным параметром, подтверждающим гемолитическую болезнь новорожденных по АВО-системе, следует считать
 - о обнаружение иммунных антител анти-А и анти-В в крови матери
- 544. Множественные истинные пороки развития характерны
 - о для эмбриопатии
- 545. Наиболее важным показателем для генетической консультации женщины 36 лет, родившей ребенка с типичной болезнью Дауна является
 - о возраст матери
- 546. Витамин D
 - о способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта
- 547. Бронхиолит у детей раннего возраста
 - о приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких
- 548. Начало диареи в первые недели жизни не характерно
 - о для целиакии
- 549. К метаболическому алкалозу приводит
 - о пилоростеноз
- 550. При гипертермическом синдроме со спазмом сосудов начинать терапию следует с
 - о введения фенотиазиновых препаратов
- 551. При УЗИ разная величина почек может определяться
 - о при хроническом пиелонефрите
- 552. Преимущественную локализацию на коже лица в первый год жизни имеет
 - о экзема (атопический дерматит)
- 553. В этиологии пневмонии у редко болеющих детей после года ведущее значение имеет
 - о пневмококк
- 554. Гиперлейкоцитоз с резким нейтрофильным и юным сдвигом типичен
 - о для стафилококковой пневмонии
- 555. Экзогенный аллергический альвеолит обусловлен чаще аллергией
 - о на органическую пыль
- 556. Для атопической бронхиальной астмы характерен
 - о I тип аллергической реакции
- 557. Из перечисленных препаратов пролонгированным является
 - о теопек
- 558. Подростка, страдающего хроническим гломерулонефритом, следует ориентировать на специальность
 - о библиотекарь
- 559. В установлении нервно-артритического типа конституции помогают все перечисленные данные генеалогического анамнеза, кроме
 - о наличия у родственников тугоухости
- 560. При открытом артериальном протоке обычно не развивается
 - о одышечно-цианотические приступы
- 561. При тетраде Фалло применяют
 - о анаприлин
- 562. Ребенок, перенесший в течении года 2 орви и обострение хронического тонзиллита, можно

- отнести в группу здоровья
- третью
- 563. При ревматизме наибольшее диагностическое значение имеет
 - иммуноглобулины G
- 564. Ребенку с предварительным диагнозом "ревматизм" необходимо назначить
 - госпитализацию
- 565. При проведении профосмотра детей при переходе к предметному обучению проводят
 - оценку нервно-психического развития
- 566. Гипертензию может вызвать прием
 - индоцида
- 567. К острой сердечно-сосудистой недостаточности не относится
 - пароксизмальная тахикардия
- 568. Гипертония чаще всего наблюдается
 - при узелковом периартериите
- 569. Высокую гипертензию чаще обуславливает
 - порок развития сосудов почки
- 570. Лучшим препаратом для профилактики суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у ребенка в возрасте 3 месяцев является
 - дигоксин
- 571. При поствирусном миокардите наиболее часто отмечается
 - мягкий, короткий систолический шум, глухие тоны
- 572. Наиболее точным методом определения сердечных границ является
 - рентгенография
- 573. Для дилатационной кардиомиопатии характерно
 - увеличение полостей желудочков
- 574. Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению
 - пароксизмальной тахикардии
- 575. К нестероидным противовоспалительным препаратам относится
 - пироксикам
- 576. Акцент II тона на легочной артерии наблюдается
 - при легочной гипертензии
- 577. В диагностические критерии системной красной волчанки не входит
 - утренняя скованность суставов
- 578. Риск развития патологии пищевода выше
 - при недостаточности эзофагокардиального отдела
- 579. Конституциональный кетоацидоз реже всего дифференцируют
 - с гелиминтозом
- 580. При повторном исследовании, если первоначально определена секреторная недостаточность, в качестве стимулятора целесообразно использовать
 - гистамин
- 581. Для холецистита не характерно
 - наличие лейкоцитов при микроскопии осадка желчи
- 582. Для хронического гепатита наиболее характерно
 - повышение трансаминаз в 1,5-2 раза по сравнению с нормой
- 583. Определяющим клиническим признаком при циррозе печени является
 - увеличение и значительное уплотнение печени и селезенки
- 584. Поражение поджелудочной железы обязательно
 - при муковисцидозе
- 585. В период обострения хронического энтерита не рекомендуется
 - капуста
- 586. Прицельная биопсия обязательна
 - при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона
- 587. Объем мочевого пузыря у ребенка 3 месяцев составляет
 - 20-30 мл
- 588. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) характерно для
 - гломерулонефрита
- 589. Внутривенную урографию можно проводить
 - с 10-дневного возраста
- 590. Для нефротического синдрома характерно
 - значительная протеинурия, гипоальбуминемия
- 591. Антибактериальная терапия при гломерулонефрите не включает
 - гентамицин
- 592. Для врожденного первичного гипотиреоза не характерна
 - диарея
- 593. Кормление грудью новорожденного ребенка должно проводиться в течение
 - 40-45 мин
- 594. При сахарном диабете I типа, диабетической гипогликемической коме не следует
 - вводить инсулин
- 595. У девочки 14 лет высокорослость, булимия, жажда, ожирение III степени, розовые стрии на коже молочных желез, бедер, плеч, живота. Артериальное давление - 140/ 80 мм рт. ст. Ваш предварительный диагноз:
 - гипоталамический синдром с нарушением жирового обмена
- 596. Наиболее редко постгеморрагическую анемию вызывают
 - легочные кровотечения
- 597. Основная причина наследственных несфероцитарных гемолитических анемий
 - нарушение активности ферментов эритроцитов
- 598. При дефекте глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы провокатором гемолиза не является
 - алкалоз
- 599. При сфероцитарной гемолитической анемии не назначают
 - препараты железа
- 600. В финале гемобластоза отсутствует
 - гирсутизм
- 601. Наиболее перспективной формой взаимодействия акушерской, педиатрической и терапевтической служб является
 - работа акушерско-терапевтически-педиатрического комплекса (АТПК)
- 602. Критерием школьной зрелости при подготовке детей к поступлению в школу, является
 - биологический возраст
- 603. Отражает гетерохронность развития и развивается ускоренными темпами на третьем году жизни ребенка
 - психика ребенка
- 604. Часто болеющим можно считать ребенка в возрасте 2 лет если

- острые заболевания в течение года отмечались 7 раз
- 605. Массаж является неотъемлемой частью воспитания здорового ребенка
 - до 14 месяцев
- 606. Детям 2-го и 3-го года жизни предпочтительнее проводить закаливание солнцем в виде
 - малоподвижных кратковременных игр на освещенном солнцем участке
- 607. Специальные занятия гимнастикой и массажем со здоровым ребенком необходимы
 - с полутора месяцев
- 608. Оценка нервно-психического развития ребенка 12 месяцев проводится по следующим линиям развития
 - движения общие, понимаемая речь, активная речь, действия с предметами, навыки
- 609. О необходимости перевода ребенка на режим более старшего возраста не свидетельствуют
 - раннее пробуждение после ночного сна и дневного сна
- 610. Ребенок в возрасте 1 месяца посещает бассейн, ни разу не болел, развитие соответствует возрасту, относится к группе здоровья
 - первой
- 611. Неблагоприятный прогноз состояния здоровья при значении индекса отягощенности генеалогического анамнеза
 - 0,7 и выше
- 612. К основной документации кабинета здорового ребенка не относится
 - сводный порционник
- 613. При гипогалактии не используют
 - неробол
- 614. Здоровых новорожденных можно прикладывать к груди матери при отсутствии противопоказаний с ее стороны
 - в первые 30 мин после рождения
- 615. Режим питания детей от 4 до 6 месяцев после введения прикорма
 - 5 раз в сутки
- 616. Суточная потребность в жире у детей первых 4 месяцев жизни при любом виде вскармливания составляет
 - 6,5 г/кг
- 617. Ночное кормление грудью матери
 - показано всем детям
- 618. Для первого прикорма не рекомендуют
 - пшеничную кашу
- 619. В меньшей степени к критериям эффективности питания детей 1 года жизни относится
 - одышка
- 620. Суточная доза аскорбиновой кислоты для витаминизации питания детей в возрасте 6-12 лет составляет
 - 50 мг
- 621. При фенилкетонурии у детей в диете не допускается
 - избыток жира
- 622. Опасность брака между родственниками заключается
 - в повышенной вероятности встречи двух рецессивных генов
- 623. К показателям гуморального иммунитета относятся
 - иммуноглобулины А, М, G
- 624. В развитии воспаления меньшее значение имеет
 - ренин
- 625. При пищевой аллергии не рекомендуется
 - морковный сок
- 626. На развитие лекарственной аллергии не влияет
 - пол ребенка
- 627. Для атопической формы бронхиальной астмы характерны следующие изменения показателей в сыворотке крови
 - повышение уровня общего IgE и специфических IgE
- 628. Если нет возможности создать всю систему специализированной помощи новорожденным, в первую очередь следует организовать
 - отделение патологии новорожденных
- 629. К инактивированным вакцинам относится
 - клещевая
- 630. Активный иммунитет вызывают
 - вакцины
- 631. Действие на новорожденного переданных ему трансплацентарно от матери с тиреотоксикозом тиреостимулирующих иммуноглобулинов может сохраняться в течение
 - 1 года
- 632. Центральные органы иммунной системы
 - тимус и костный мозг
- 633. В углеводах грудного молока преобладает
 - β-лактоза
- 634. Наиболее часто судорожный синдром у новорожденных от матерей с сахарным диабетом вызывают
 - гипогликемия и гипокальциемия
- 635. Для возникновения кишечных инфекций у доношенных новорожденных наиболее значимы
 - госпитальные штаммы
- 636. Электролитные нарушения наиболее выражены
 - при энтероколите
- 637. При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективным является
 - комбинация перечисленных методов
- 638. Показано ли введение консервированной крови с целью стимуляции иммунитета
 - нет
- 639. Тугое пеленание может вызвать у новорожденного ребенка
 - гиповентиляцию
- 640. Из гнойно-воспалительных заболеваний у недоношенных новорожденных чаще встречается
 - остеомиелит
- 641. Недоношенным детям предпочтительнее рассчитывать объем питания
 - калорийным методом
- 642. Самым частым метастатическим очагом при септикопиемической форме сепсиса у недоношенных детей является
 - менингит
- 643. У родившегося в срок ребенка в первую неделю жизни нарастала желтуха, которая стабильно сохраняется в течение 4 недель, появились запоры, брадикардия. Это свидетельствует
 - о гипотиреозе

644. Достоверным признаком врожденной цитомегалии является
- о обнаружение характерных клеток в осадке мочи, слюне, ликворе
645. Легкий вариант гемолитической болезни по резус-фактору можно ожидать когда
- о бабушка ребенка со стороны матери резус-положительна
646. Гипокальциемические судороги у недоношенных детей могут быть обусловлены
- о недостаточной функцией паращитовидных желез
647. Цианоз слизистых и кожных покровов не нарастает при беспокойстве у детей при
- о метгемоглобинемии
648. Отдаленный прогноз при целиакии
- о хороший на фоне постоянного диетического лечения
649. Для гипотонической дегидратации характерно
- о низкие АД и ЦВД
650. При обструктивных уropатиях пиелонефрит
- о встречается очень часто
651. При остром пиелонефрите у детей грудного возраста ведущим признаком является
- о общая интоксикация организма
652. Специфическая гипосенсибилизирующая терапия пищевой аллергии включает
- о дробное введение "виновного" антигена
653. Ведущим клиническим синдромом в диагностике пневмонии является
- о крепитация локальная
654. Отсутствие адекватной одышки в первые часы заболевания типично
- о для сегментарной пневмонии
655. Для подтверждения экссудативного плеврита прежде всего показана
- о латерограмма
656. Для ребенка школьного возраста в приступный период atopической бронхиальной астмы не характерно
- о наличие воспалительных очаговых изменений
657. При лечении астматического статуса не показаны
- о эфедрин и его производные
658. Перепись детского населения в поликлинике проводится
- о 2 раза в год
659. В группу риска по кардиальной патологии не относятся дети
- о с синдромом Альпорта
660. Для планирования профилактических прививок в детской поликлинике оформляют учетные формы
- о ф.№063/у и ф.№112/у
661. При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно ввести строфантин
662. При ревматоидном артрите не отмечается
- о "летучесть" болей
663. При активном воспалительном процессе при ревматизме не характерен
- о лимфоцитоз
664. Ребенку с предварительным диагнозом "ревматизм" целесообразно назначить дома до госпитализации
- о аспирин + супрастин
665. Преднизолон не оказывает
- о антикоагулянтного действия
666. Гематологические осложнения могут иметь место при назначении
- о брүфена
667. При отеке легких не наблюдается
- о учащенное мочеиспускание
668. Для выявления вазоренальной гипертензии наиболее информативным исследованием является
- о ренальная ангиография
669. Наиболее частой причиной возникновения желудочковой формы пароксизмальной тахикардии является
- о органическая патология сердца
670. Для профилактики частых приступов суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии ребенку 10 лет с синдромом предвозбуждения желудочков более эффективен
- о кордарон внутрь
671. Для постинфекционного миокардита характерно
- о СОЭ - 25 мм/ч
672. Увеличение границ сердца в наибольшей степени зависит от состояния
- о миокарда
673. Для выявления гипертрофической кардиомиопатии наиболее информативно
- о ЭхоКГ
674. Для неполной атриовентрикулярной блокады I степени у ребенка 5 лет не характерно
- о PQ=0,12
675. К гормональным противовоспалительным препаратам относятся
- о метипред
676. Снижение диастолического давления характерно
- о для открытого артериального протока
677. Ингибитором простангландинов является
- о аспирин
678. При подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы необходимо провести
- о рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием с проведением водно-сифонной пробы
679. Для рвоты при кетоацидозе наиболее характерно
- о ацетонурия
680. Показаниями для определения кислотности желудочного содержимого у детей являются
- о голодные боли в эпигастриальной области
681. О задержке выброса желчи из желчного пузыря может свидетельствовать
- о холестерин
682. Для диагностики хронического гепатита не информативным является
- о увеличение печени без ее уплотнения
683. Наименее информативно Для диагностики цирроза печени
- о эзофагогастродуоденоскопия
684. Реже осложняются панкреатитом
- о кишечные инфекции
685. Пассаж по тонкой кишке замедляет
- о имодиум
686. Парапроктиты характерны
- о для болезни Крона
687. Концентрация мочи у ребенка достигает уровня взрослого в возрасте
- о 5 лет
688. Преобладание нейтрофилов в мочевом осадке свидетельствует

- о о пиелонефрите
- 689. Экстренное извещение заполняет врач
 - о заподозривший инфекционную болезнь
- 690. Для начала гломерулонефрита наиболее характерно
 - о олигурия
- 691. Преднизолон часто применяется
 - о при гломерулонефрите, нефротической форме
- 692. Для подтверждения диагноза сахарного диабета у ребенка особой важности не имеет наличие
 - о гипербилирубинемии
- 693. Девочки 10 лет. Ожирение II степени без признаков гиперкортицизма. Невропатолог патологии не выявил. Родители с избыточной массой. ваш диагноз
 - о конституционально-экзогенное ожирение
- 694. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) не бывает
 - о желтушности кожи
- 695. У девочки 14 лет диффузное увеличение щитовидной железы III степени. Кожа влажная, горячая, Экзофтальмия. Положительные симптомы Грефе и Мебиуса. Тахикардия. Артериальное давление - 140/60 мм рт. ст. Установлен диагноз - «диффузный токсический зоб».
 - о диагноз верен
- 696. Самая долгоживущая клетка
 - о эозинофил
- 697. Увеличение эозинофилов и базофилов имеет место
 - о при хроническом миелолейкозе
- 698. Не повышает СОЭ Повышенное содержание
 - о альбумина
- 699. Повышенное содержание каких сывороточных белков может повысить СОЭ?
 - о альбумина
- 700. К гематологическим признакам микросфероцитарной анемии не относится
 - о положительная проба Кумбса
- 701. Чтобы засвидетельствовать отказ пациента от профилактической прививки необходимо
 - о не менее 2-х медработников
- 702. Коэффициент рождаемости определяется как
 - о отношение числа родившихся за год к общей численности населения (в промиллях)
- 703. Основой для развития функциональной патологии ребенка не является
 - о акцелерация синхронная
- 704. При хроническом заболевании показателем компенсации функционального состояния организма нельзя считать
 - о уровень физического развития
- 705. Главная задача специальных занятий гимнастикой с детьми раннего возраста
 - о обеспечение созревания правильного качества движений
- 706. Показатель нервно-психического развития Ребенка в возрасте 2 года 6 месяцев: «подбирает к образцу предметы 4 цветов» не свидетельствует
 - о об умении рисовать
- 707. Определите основную задачу утренней гимнастики для детей раннего возраста
 - о воспитание потребности в движении после сна
- 708. У ребенка 2 месяцев: эмоциональные реакции - в ответ на общение быстро отвечает
 - о улыбкой; движения общие – длительно. нервно-психическое развитие
- о опережение
- 709. Процесс доминантности руки завершается
 - о к 5 годам
- 710. Основным преимуществом применения лекарственных растений перед синтетическими стимуляторами при коррекции ранних отклонений в состоянии здоровья является
 - о отсутствие привыкания
- 711. Для прогноза частой заболеваемости ребенка раннего возраста менее значимыми сведениями из анамнеза является
 - о перинатальные осложнения
- 712. Организационная работа роддома по вопросам питания детей не включает
 - о контроля за массой тела ребенка
- 713. К правилам естественного вскармливания не относится
 - о режим питания до введения прикорма - 7 раз в сутки, после введения прикорма - 6 раз в сутки
- 714. Кратность питания здорового новорожденного с 10-го до 29-го дня жизни при достаточной лактации составляет
 - о 6 раз
- 715. Суточная потребность в жидкости для детей первого года
 - о 150-100 мл/кг
- 716. У детей в возрасте 4-6 месяцев при любом виде вскармливания суточная потребность в жире равна
 - о 6 г/кг
- 717. К консервам, используемым в питании детей грудного возраста не относится
 - о сгущенное молоко с сахаром
- 718. Проведение на дому профилактических прививок против туберкулеза
 - о недопустимо
- 719. Клинико-биологические критерии эффективности питания детей 1-го года жизни нельзя оценить по данным
 - о лейкоцитов мочи
- 720. Особенно сильно изменяет иммунореактивность детей недостаток
 - о полиненасыщенных жирных кислот
- 721. На фоне лечения лакиском необходима диетическая коррекция
 - о калийсодержащими продуктами
- 722. Достоверное определение пола при вирильной форме аденогенитального синдрома возможно путем
 - о определения кариотипа
- 723. Количество Т-лимфоцитов в периферической крови в норме колеблется в пределах
 - о 60-80% общего числа лимфоцитов
- 724. Механизм истинной аллергической реакции не определяет
 - о увеличенное выделение гистамина без выработки антител
- 725. Редко встречающейся кожной формой пищевой аллергии является
 - о себорейный дерматит
- 726. Профилактическая вакцинация ребенка при обострении хронического заболевания
 - о проводится после окончания обострения, и после нормализации температуры и клинических показателей

727. Исследованием подтверждающим эозинофилию, обусловленную атопией является
- о определение уровня общего IgE
728. Основные пути передачи внутрибольничной инфекции
- о через руки персонала
729. Плод способен вырабатывать антитела при встрече с антигеном
- о с 5-6 месяцев внутриутробного развития
730. При врожденном сифилисе у плода поражаются в первую очередь
- о печень
731. При развитии сильной реакции или осложнения на предыдущую дозу вакцины дальнейшую иммунизацию проводят
- о другим препаратом
732. Противопоказанием к иммунизации является наличие у ребенка
- о сильной реакции или осложнения введения предыдущей дозы вакцины
733. Показания для АДС-М вакцинации
- о дети, имеющие противопоказания к АКДС; подростки и взрослые
734. Возможность развития флегмоны новорожденных только в неонатальном периоде обусловлена
- о особенностями строения сосудистой сети кожи и подкожной клетчатки
735. Наиболее тяжелые формы кишечных инфекций у новорожденных вызывают
- о грам-отрицательные бактерии
736. Клинические симптомы сепсиса у новорожденных детей
- о нарушение терморегуляции, диспепсические расстройства, неврологические симптомы, нарушение свертываемости крови и ОЦК
737. Наиболее часто у новорожденных, перенесших асфиксию в родах встречается
- о некротизирующий энтероколит
738. Успех в лечении сепсиса у новорожденных детей определяет
- о ранняя диагностика, идентификация возбудителя и его чувствительности к антибиотикам
739. Период полового созревания характеризуется
- о ускорением темпов роста и прибавки массы
740. Для недоношенного ребенка с развернутой картиной внутриутробного сепсиса в периферической крови наиболее характерны
- о лейкоцитоз со сдвигом формулы влево
741. Соотношение сладких и кислых молочных смесей в суточном рационе ребенка при искусственном вскармливании должно составлять
- о 2:1
742. Гнойный менингит у недоношенных новорожденных чаще всего развивается на фоне
- о незрелости
743. Гемолитическую болезнь новорожденных по АВО-системе антигенов наблюдают
- о чаще у детей с группой крови A(II) от матерей с O(I) группой крови
744. Основная причина физиологической желтухи новорожденного
- о недостаточная глюкуронизация
745. Среди всех заболеваний у детей преобладают
- о болезни с наследственным
- предрасположением
746. Краниотабес отсутствует
- о при остеопорозе
747. Практически не встречается в раннем детском возрасте
- о лобарная пневмония
748. Для приготовления пищи при глютеининдуцированной целиакии рекомендуют использовать
- о кукурузную муку
749. Вододефицитному экзикозу соответствует
- о полидипсия
750. Наиболее частой причиной пиелонефрита является
- о пузырно-мочеточниковый рефлюкс
751. При остром пиелонефрите у детей грудного возраста ведущим признаком будет
- о общая интоксикация организма
752. Антигистаминные препараты наиболее эффективны
- о при псевдоаллергических реакциях
753. Гипертермия с ознобом в первые часы заболевания типична
- о для пневмококковой пневмонии
754. Соотношение пульса и дыхания 1:1 типично
- о для пневмоцистной пневмонии
755. Для выявления междолевого выпота показана
- о рентгенограмма в боковой проекции
756. Для постановки диагноза атопической бронхиальной астмы диагностически значимо
- о определение IgE
757. При бронхиальной астме применение антигистаминных препаратов возможно только в сочетании
- о с комплексом перечисленных средств
758. Школьник, перенесший пневмонию, может приступить к занятиям по физкультуре
- о через 2-4 нед после выздоровления
759. Заболевания суставов чаще развиваются у детей
- о с нервно-артритической конституцией
760. Выраженный общий цианоз наблюдается
- о при атрезии трехстворчатого клапана
761. К врожденным порокам сердца, которые лечат оперативно в первые годы жизни ребенка не относится
- о открытое овальное окно
762. Ревматоидный артрит характеризуется
- о наличием остаточных деформаций
763. При тяжелой атаке ревматизма чаще отмечается
- о эндомиокардит
764. В начальный период ревматической атаки показано применение
- о пенициллина
765. При лечении больного цитостатическими иммуносупрессантами необходимо назначать регулярно
- о полный анализ крови
766. Более быстрое диуретическое действие оказывает
- о лазикс
767. К проявлениям острой сердечно-сосудистой недостаточности не относится
- о гиперемия кожи
768. Из перечисленных пороков с артериальной гипертензией протекает
- о коарктация аорты

769. Для диагностики пароксизмальной тахикардии срочным исследованием является
- о ЭКГ
770. Ребенок, страдающий пароксизмальной тахикардией нейровегетативного генеза, может заниматься физкультурой в школе в общей группе
- о через 5 лет после приступа
771. Острый воспалительный процесс в меньшей степени характеризует
- о мочевины
772. Для правильной оценки звуков сердечной деятельности аускультацию ребенка необходимо проводить в положении
- о лежа и стоя
773. PQ при синдроме преждевременного возбуждения желудочков (синдроме Вольфа - Паркинсона - Уайта) составляет
- о 0,10 с
774. Для неполной атриовентрикулярной блокады I степени у ребенка 14 лет характерно
- о PQ=0,22
775. Наибольшим кумулятивным действием обладает
- о дигитоксин
776. Низкий рост, грубые черты лица, деформация позвоночника, увеличение печени и селезенки, патологии глаз характерны
- о для мукополисахаридоза
777. Форма сердца на рентгенограмме в виде "деревянного голландского башмачка" характерна
- о для тетрады Фалло
778. Для выявления варикозного расширения вен пищевода наиболее информативным исследованием является
- о гастрофибродуоденоскопия
779. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови при кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на
- о сахар
780. При синдроме "раздраженного желудка" не характерна
- о кровь в кале
781. Необязательны для лечения дисхолии
- о антимикробные препараты
782. Наиболее информативно в отношении хронического гепатита
- о радиоизотопное исследование печени в динамике или (морфологическое исследование гепатобиоптатов).
783. При циррозе печени предпочтительнее употреблять пищу
- о отварную
784. Для приступа панкреатита не характерны
- о боли в гипогастрии
785. Для стеатореи II типа характерно наличие в кале
- о жирных кислот
786. Для абдоминального синдрома, связанного с заболеванием толстой кишки не характерны боли
- о в эпигастрии
787. В понятие нефрон входит
- о клубочек и система канальцев
788. Морфологическую характеристику можно уточнить При количестве в моче лейкоцитов
- о 30 и более в поле зрения
789. Продолжительность диспансерного наблюдения за детьми с дискинезией желчевыводящих путей после обострения составляет
- о 3 года
790. Гломерулонефрит чаще развивается
- о через 7-14 дней после респираторного заболевания
791. Артериальное давление путем изменения водно-электролитного баланса снижает
- о дихлотиазид
792. Для первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна) не характерно
- о повышение сахара в крови
793. Для болезни Иценко - Кушинга не характерно
- о артериальная гипотензия
794. У девочки 3 лет полиурия, дефицит веса 10%, кожа и язык сухие, гиперемия щек, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, печень +3 см. Гликемия натощак - 12.8 ммоль/л. В моче 6% сахара при суточном диурезе 2.5 литра. Предварительный диагноз:
- о инсулинозависимый сахарный диабет
795. Оссалгии при гемобластозах у детей не дифференцируют с
- о подагрой
796. Наиболее достоверно для верификации диагноза острого лейкоза
- о производство миелограммы
797. Клиническим признаком лимфогранулематоза не является
- о пурпура
798. Основной диагностический симптом при ксантоматозе Хенда - Шюллера - Крисчена
- о специфические клетки в пунктате костного мозга
799. Спленомегалия не характерна для
- о лямблиоза
800. Затянувшийся паротит следует дифференцировать
- о с синдромом Микулича при лейкозе
801. Зная число обследованных детей и общее количество всех заболеваний, можно вычислить
- о интенсивный показатель частоты заболеваний
802. Эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий, проведенных в дошкольных учреждениях не оценивается по
- о полноте охвата медицинскими осмотрами
803. Предельное число малых аномалий развития, которое может встречаться у здоровых людей
- о 5-7
804. Если ребенок 8 месяцев не выполняет упражнения "присаживание из положения на спине, держась за кольца", то у него имеет место слабость
- о мышц рук
805. Ребенку 9 месяцев. Четыре раза переболел острыми респираторными инфекциями; физкультурой никогда не занимался. ему показан комплекс упражнений
- о пограничный
806. Для игры ребенка в возрасте 1 года 6 месяцев характерно
- о отображает в игре отдельные действия
807. К расслабляющему массажу относят прием
- о поглаживание
808. Ребенку 12 месяцев (обратился впервые). при проверке НПР выяснилось, что у него: речь

- активная соответствует 12 мес, понимание речи - 12 мес, движения общие - 7 мес, навыки - 8 мес. правильная тактика врача заключается в
- о назначении рекомендаций дифференцированно, в соответствии с уровнем развития по каждому показателю
809. Особенности поведения для леворуких детей
- о повышенная эмоциональность, высокий уровень тревожности, затруднения в планировании своего поведения
810. Свойства лекарственных растений лучше сохраняются в виде
- о экстракта
811. Линии развития, по которым нельзя сделать заключение о нервно-психическом развитии ребенка в возрасте 1 месяца
- о понимание речи
812. К преимуществам Естественного вскармливания перед другими видами вскармливания не относится утверждение
- о легче кормить ребенка
813. В молозиве по сравнению с переходным женским молоком больше содержится
- о белка
814. Питание недоношенных I степени назначается из расчета
- о белков и углеводов на должествующую массу тела
815. Число кормлений детей в возрасте от 7 до 12 месяцев составляет
- о 5-4 раз в сутки
816. Суточная потребность в жирах при любом виде вскармливания у детей в возрасте 7-12 месяцев составляет
- о 5,5 г/кг
817. Адаптированной молочной смесью является
- о "Детолакт"
818. К характерным осложнениям после введения ацдс относятся
- о пронзительный крик, судороги
819. Чаще всего осложнения на прививку ацдс проявляются
- о в первые три дня
820. К энергозатратам не относятся
- о поступление энергии с пищей
821. Во время лечения верошпироном необходима диетическая коррекция в виде
- о назначения диеты в соответствии с заболеванием
822. Не характерно для гипотиреоза
- о преждевременное закрытие родничка
823. Количество В-лимфоцитов в периферической крови в норме составляет
- о 15-23% от общего числа лимфоцитов
824. Механизм псевдоаллергической реакции заключается в
- о усиленной выработке (либерации) гистамина без выработки антител
825. Тип аллергической реакции наиболее характерный для пищевой аллергии
- о 1 тип - реактивный
826. К наиболее характерным симптомам крапивницы у детей не относится
- о наличие экзематозного и лихеноидного синдромов
827. Психоэмоциональные факторы могут вызывать астму напряжения посредством
- о гипервентиляции и раздражения ирритантных рецепторов
828. Перинатальный период длится
- о с 28-й недели внутриутробного развития до 7 дня жизни
829. Характерным осложнением для врожденной краснухи является
- о катаракта
830. К клиническими формам внутриутробной бактериальной инфекции не относится
- о миокардит
831. Специфическая иммунопрофилактика детей из группы диспансерного наблюдения проводится
- о по индивидуальному календарю
832. Систему гемостаза у новорожденных детей не характеризует
- о высокая активность факторов свертывания крови
833. Из факторов неспецифического иммунитета в защите слизистых оболочек от патогенной микрофлоры ведущую роль играет
- о лизоцим
834. Для новорожденных от матерей с сахарным диабетом не характерна
- о гиперкальциемия
835. Основным признак кишечной инфекции при проведении дифференциального диагноза с неинфекционной диареей
- о острое начало, инфекционный токсикоз, симптомы энтероколита
836. У новорожденного ребенка в возрасте 5-6 суток при развитии судорожного синдрома следует исключить в первую очередь
- о гнойный менингит
837. Изменением системы крови у новорожденных, перенесших асфиксию в родах, является
- о полицитемия
838. Снижение гемоглобина при гемолитической болезни новорожденных происходит
- о до 2 месяцев
839. Частота наблюдений педиатром детей с холециститом, холецистохолангитом после обострения составляет
- о 1 раз в два года
840. Продолжительность диспансерного наблюдения за детьми с язвенной болезнью желудка и двп составляет
- о до перевода во взрослую сеть
841. Для недоношенных детей оптимальным между кормлениями является промежуток в
- о 3 часа
842. Самой частой причиной развития некротизирующего энтероколита у недоношенных детей является
- о асфиксия в родах
843. Прямая гипербилирубинемия у новорожденного характерна
- о для атрезии желчных путей
844. Ретролентальная фиброплазия недоношенных является следствием
- о чрезмерной кислородотерапии
845. Синдром расщепления губы и мягкого неба специфичен для
- о трисомии D (синдром Патау)
846. Ателектазы легких характерны для
- о муковисцидоза
847. Главным при напряженном пневмотораксе является
- о плевральная пункция и дренаж

848. Слизистые - интенсивно розового цвета
 о при гистотоксической гипоксии
849. Гипертонической дегидратации соответствует
 о сухость слизистых
850. Постоянная щелочная реакция мочи имеет место
 о при почечном канальцевом ацидозе
851. Колебания относительной плотности мочи у ребенка 10-месячного возраста составляют
 о от 1,002 до 1,008
852. Бронхоспазм усиливают
 о β-адреноблокаторы
853. К типичной пневмонии для иммунодефицитного состояния относится
 о пневмоцистная
854. Максимально нарушается диффузия газов
 о при интерстициальной пневмонии
855. Для подтверждения врожденного порока бронхов показана
 о бронхография
856. К типичным рентгенологическим изменениям при бронхиальной астме в приступный период не относятся
 о увеличения лимфоузлов средостения
857. При бронхиальной астме не рекомендуются
 о препараты, подавляющие кашлевой рефлекс
858. Для аллергического риносинусита не характерно
 о одышка экспираторная
859. Сердечные изменения чаще встречаются
 о при синдроме Марфана
860. Легочная гипертензия не наблюдается
 о при изолированном стенозе легочной артерии
861. При системной красной волчанке сыпь локализуется
 о на спинке носа и щеках
862. Развитию ревматизма может способствовать наличие у ребенка
 о хронического тонзиллита
863. Для диагностики ревматизма наибольшее значение имеет наличие
 о эндомиокардита
864. Бициллинопрофилактику ревматизма следует начать
 о в стационаре уже в активной фазе болезни
865. В случае аллергии к пенициллину следует назначить
 о цефопин
866. У детей раннего возраста для быстрой дигитализации предпочтительнее использовать
 о дигоксин в таблетках
867. При отеке легких обычно не наблюдается
 о брадикардия
868. Для дифференциальной диагностики гипертензии при коарктации аорты наиболее информативным является
 о артериальное давление на ногах ниже, чем на руках
869. Прогноз наиболее серьезен
 о при желудочковой форме пароксизмальной тахикардии
870. У детей в активной фазе ревматизма нередко наблюдается
 о ортоградная неполная АВ-блокада I степени
871. При инфекционном эндокардите чаще всего поражается эндокард
 о аортального клапана
872. У ребенка во 2-м межреберье слева в норме
 о II тон громче I тона
873. PQ на ЭКГ школьника равно
 о 0,18 с
874. Наиболее информативным исследованием для диагностики пролапса митрального клапана является
 о ультразвуковое исследование
875. Для диагностики вегетодистонии целесообразно провести
 о клиноортостатическую пробу
876. Ревматоидный фактор представляет
 о иммуглобулины
877. Форма сердца на рентгенограмме, напоминающая цифру "8", наблюдается
 о при тотальном аномальном впадении легочных вен
878. При подозрении на аномалию развития пищевода необходимо провести
 о рентгеноконтрастное исследование желудочно-кишечного тракта
879. Из перечисленных продуктов при кетоацидозе нежелательны
 о жиры
880. Причиной антрального гастрита не является
 о травма слизистой оболочки желудка
881. При холецистите целесообразнее использовать
 о фурановые
882. Хронический гепатит легче дифференцировать с
 о гепатозом (вне обострения)
883. При печеночной патологии нежелательны
 о кислые фрукты или белковые продукты.
884. Наиболее информативно при панкреатите
 о ультразвуковое исследование
885. К основной флоре толстой кишки не относятся
 о клостридии
886. Группой риска заболеваний желудка является
 о гиперацидность
887. Клубочек выполняет функцию
 о фильтрационную
888. Гиперлипидемия наиболее характерна
 о для гломерулонефрита нефротической формы
889. Показанием к биопсии почек не является
 о подозрения на поликистоз
890. Лабораторными показателями активности при гематурической форме гломерулонефрита не является
 о микрогематурия
891. Ингибитором синтеза ангиотензина-II является
 о каптоприл
892. У девочки 12 лет задержка роста, множественные малые аномалии, короткая шея с крыловидными складками, отсутствие вторичных половых признаков. Диагноз
 о синдром Шерешевского - Тернера
893. При хронической первичной надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) не характерно
 о сниженный уровень АКТГ в крови
894. При лечении конституционально-экзогенного ожирения можно не использовать назначение
 о хлоридов
895. Реже всего вызывает ДВС-синдром бактериальная инфекция
 о стрептококковая
896. Тромбоцитопатию не характеризует
 о определение времени свертывания
897. Для гемофилии А наиболее характерно

- кровоизлияние
- о в суставы
- 898. Принципы лечения аутоиммунных гемолитических анемий следующие, кроме
 - о иммунодепрессантных препаратов
- 899. К основным провокатором гемолитического криза при несфероцитарных гемолитических анемиях не относится
 - о иммунных процессов
- 900. Биохимическим серологическим критерием гемолиза не является
 - о гиперпротеинемия
- 901. К системе амбулаторно-поликлинической помощи детям в сельской местности не относится
 - о медсанчасть
- 902. На рождение ребенка с врожденными уродствами повлияли повреждающие факторы на сроках беременности
 - о 14-16 недель
- 903. Частота пульса 110-115 ударов в минуту характерна в норме для ребенка в возрасте
 - о 2 года
- 904. Критерии, обуславливающие состояние здоровья ребенка
 - о наличие или отсутствие отклонений в раннем оттогенезе
- 905. Основная физиологическая задача комплекса гимнастики и массажа № 1
 - о ослабление тонуса сгибателей
- 906. Наиболее чувствительный и информативный показатель в диагностике нервно-психического развития ребенка 2 лет
 - о активная речь соответствует 1 году 3 месяцам
- 907. Абсолютное показание к назначению возрастного физиологического комплекса гимнастики и массажа ребенку 6 месяцев
 - о угасание безусловных рефлексов
- 908. Детей-реконвалесцентов после перенесенных ОРЗ и гриппа
 - о допускают к физкультурным занятиям с ограничением физической нагрузки
- 909. Неправильным утверждением в отношении переучивания леворукого ребенка на праворукие является
 - о до 6 лет можно переучивать, а в 7 лет попытки прекратить
- 910. Растение, улучшающее вкус любого травяного сбора
 - о мята
- 911. Какие факторы не оказывают преимущественного влияния на исход адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению
 - о отсутствие отрицательных привычек
- 912. По технике естественного вскармливания не рекомендуют
 - о каждое кормление кормить обеими грудями
- 913. Дети перенесшие гломерулонефрит наблюдаются
 - о до перевода во взрослую поликлинику
- 914. Масса тела недоношенных детей, при которой их можно перевести на 6-разовое кормление, составляет
 - о 3,5-4 кг
- 915. Суточная потребность в углеводах у детей первого года жизни при всех видах вскармливания составляет
 - о 12-14 в г/кг
- 916. Сроки введения соков
 - о с 4 месяца
- 917. Вводят творог ребенку в возрасте
 - о 5 месяцев
- 918. Способом приготовления каши не является
 - о смешивание молока с водой и варки до готовности
- 919. Питание, обеспечивающее формирование и поддержание иммунитета
 - о продуктами естественной среды
- 920. На рост ребенка в меньшей степени влияет
 - о недостаток углеводов и жиров
- 921. В рационе питания детей с сахарным диабетом в возрасте старше 7 лет процент белка животного происхождения должен составлять
 - о 33%
- 922. При фенилкетонурии доминирует
 - о неврологическая симптоматика
- 923. Непосредственно формируют гуморальный иммунитет
 - о В-лимфоциты
- 924. В диагностике аллергической реакции I типа наиболее значимо
 - о высокая концентрация иммуноглобулина Е в сыворотке крови
- 925. Первый клинический анализ крови здоровому ребенку проводится в возрасте
 - о 6 месяцев
- 926. К наиболее тяжелым клиническим формам аллергодерматозов не относятся
 - о дерматит Дюринга
- 927. К факторам риска развития бронхиальной астмы НЕ относятся
 - о гиперхолестеринемии
- 928. Основная причина смертности в перинатальном периоде
 - о асфиксия
- 929. энтеровирусная инфекция, вызванная вирусом Коксаки В, осложняется
 - о миокардитой
- 930. Анемия у беременных чаще всего является
 - о железодефицитной
- 931. Кратковременная тяжелая внутриутробная гипоксия вызывает у плода
 - о брадикардию и артериальную гипертензию
- 932. Первый "перекрест крови" у недоношенных детей происходит
 - о после 7-10 дня жизни
- 933. Падение гемоглобина на 1-м месяце жизни у здорового доношенного новорожденного ребенка связано
 - о с естественным гемолизом эритроцитов
- 934. Прививать ребенка прибывшего без сведений о прививках против полиомиелита следует
 - о трехкратно иммунизировать
- 935. Ревакцинация против полиомиелита проводится
 - о 18 мес., 20 мес., 14 лет
- 936. Основное отличие поражения ЦНС при наследственных нарушениях обмена от поражений ЦНС гипоксического генеза
 - о симптомы поражения с возрастом нарастают
- 937. Частота осмотров участковым педиатром детей с хроническим гепатитом и начальной стадией цирроза печени в неактивной фазе составляет
 - о 1 раз в квартал в течение 2 лет
- 938. В каких случаях синдром обезвоживания может сопровождаться шоком

- о при быстром развитии обезвоживания
- 939. Внутривенное кровоизлияние у недоношенного ребенка позволяет заподозрить
 - о апноэ
- 940. Удваивают массу тела при рождении дети с 3-й степенью недоношенности к возрасту
 - о 2,5-3 месяца
- 941. Желток недоношенному ребенку можно начинать давать
 - о в возрасте 3 месяцев
- 942. Проведение фототерапии недоношенным детям может осложняться
 - о появлением жидкого стула с примесью зелени
- 943. Из перечня заболеваний, сопровождающихся судорогами у новорожденных, следует исключить
 - о D-дефицитный рахит
- 944. Гипербилирубинемия, не обусловленная иммунопатологическими причинами, чаще встречается
 - о недоношенного
- 945. При портальной гипертензии наблюдают
 - о расширение вен пищевода
- 946. Парадоксальное дыхание наиболее часто наблюдают
 - о при эмфиземе
- 947. Голосовое дрожание усилено
 - о при пневмотораксе
- 948. Из перечисленных клинических признаков для клеточной дегидратации наиболее характерен
 - о судороги
- 949. Для характеристики микроциркуляции наиболее информативно
 - о диурез
- 950. К эмбриопатии не относится
 - о синдром Альпорта
- 951. Объем мочевого пузыря у новорожденного ребенка
 - о от 30 до 50 мл
- 952. Расширению бронхов способствуют
 - о симпатикотония
- 953. Отсутствие эффекта от жаропонижающих препаратов центрального действия типично
 - о для грам-отрицательной пневмонии
- 954. Для пневмоцистной пневмонии типично
 - о укороченный тимпанит при резком вздутии грудной клетки спереди
- 955. Для выявления бронхоэктазов показана
 - о бронхография
- 956. Из перечисленных исследований при бронхиальной астме в межприступном периоде показано
 - о постановка кожных проб
- 957. Астматический статус II-III степени требует немедленного применения
 - о кортикостероидов
- 958. Бронхиальную астму у детей до 3 лет чаще вызывают
 - о пищевые аллергены
- 959. Гепарин и гистамин выделяют
 - о тучные клетки (мастоциты)
- 960. При большом дефекте межжелудочковой перегородки у ребенка в возрасте 3 месяцев не наблюдаются
 - о судорог
- 961. При системной красной волчанке чаще наблюдается
 - о наличие LE-клеток

- 962. Ревматической атаке наиболее часто предшествует
 - о стрептококковая инфекция
- 963. Эндомиокардит чаще наблюдается
 - о при ревматизме
- 964. Ребенок госпитализирован на 2-й день от начала артрита. Температура 37,8°C, боль и припухлость суставов сохраняется. Систолический шум на верхушке продолжительный, СОЭ - 45 мм/ч. в план лечения не входит назначение
 - о левомецитина
- 965. Наиболее целесообразной комбинацией антибиотиков при перикардите, обусловленном стафилококком, является
 - о ампициллин и оксациллин
- 966. На сократительную способность миокардита в большой степени влияет
 - о кальций
- 967. Задержку роста, обусловленную церебрально-гипофизарным нанизмом, начинают замечать
 - о в 2-4 года
- 968. Узур ребер характерны
 - о для коарктации аорты
- 969. При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом является
 - о частота сердечных сокращений более 160-180 в минуту
- 970. При полной атриовентрикулярной блокаде (атриовентрикулярная блокада III степени) наблюдается
 - о ритм 50-60 ударов в минуту
- 971. Функциональная проба для оценки состояния сердечно-сосудистой системы
 - о Шалкова
- 972. Соотношение тонов на верхушке сердца в норме
 - о I тон громче II тона
- 973. QRS на ЭКГ школьника равен
 - о 0,08 с
- 974. Для дифференциальной диагностики недостаточности митрального клапана от пролапса митрального клапана наиболее достоверным является следующий метод исследования
 - о эхокардиография
- 975. При системной красной волчанке не наблюдается
 - о поликистоза печени
- 976. Учительница обратила внимание родителей на то, что девочка 10 лет стала обидчивой, плаксивой, у нее испортился почерк, плохо выполняет задания на уроках труда. В этой ситуации следует подумать
 - о о хоре
- 977. Для какого врожденного порока у грудного ребенка характерна на ЭКГ картина инфаркта (глубокий зубец Q, смещение ST, отрицательный T в отведениях I, V5, V6)
 - о для аномального отхождения левой коронарной артерии
- 978. Больному с эзофагитом назначают
 - о нерастворимые антациды
- 979. Для халазии характерен следующий симптом
 - о рецидивирующая рвота
- 980. Диагноз пилорического хеликобактериоза наиболее точен
 - о при выделении чистой культуры пилорического хеликобактера из биоптата
- 981. При наличии гипомоторной дискинезии

- желчевыводящих путей из-за слабого сокращения мышц стенок желчного пузыря из продуктов питания предпочтительны
- о яйца
982. При хроническом гепатите не отмечается
- о увеличение печени без увеличения селезенки
983. Детям с гепатобилиарной патологией не рекомендуется употреблять
- о жареное мясо
984. Для внутривенных вливаний при приступе панкреатита необязательно использовать
- о наркотики
985. Двигательную функцию толстой кишки можно определить
- о ирригоскопией
986. Непрерывная диетическая профилактика колитов, сопровождающихся запорами, заключается в назначении
- о шлакогонной диеты с механической обработкой клетчатки
987. Низкую осморегуляторную функцию почек у детей грудного возраста не определяет
- о характер питания
988. Выраженная фибриногенемия наблюдается
- о при гломерулонефрите нефротической формы
989. Наиболее тяжелым морфологическим вариантом гломерулонефрита является
- о экстракапиллярный гломерулонефрит с полулуниями
990. Для смешанной формы гломерулонефрита наиболее характерна
- о гематурия с протеинурией
991. К глюкокортикоидным препаратам не относится
- о метандростенолон
992. Для дифференциального диагноза острого аппендицита и абдоминального синдрома у больного с кетоацидотической прекомой сахарного диабета не следует учитывать
- о лейкоцитоз
993. При диабетической кетоацидотической коме обычно не наблюдаются
- о судороги
994. Для диагноза сахарного диабета у ребенка важно наличие
- о гипергликемии
995. Острый гемолиз обычно не осложняется
- о кровотечением
996. Аутоиммунная гемолитическая анемия не является симптоматической
- о при ревматизме
997. При остром лейкозе не характерно
- о увеличение зрелых сегментоядерных нейтрофилов
998. Правильная тактика назначения преднизолона, программного лечения
- о после данных миелограммы
999. При лимфогранулематозе отсутствуют жалобы на
- о кровоточивость
1000. Спленомегалия не характерна
- о для несфероцитарной гемолитической анемии
1001. Принцип диетотерапии при язвенном колите
- не требуется.
1002. При функциональном запоре – осмотические слабительные, не показаны клизмы, питание должно быть – с большим количеством клетчатки.
1003. При переводе на искусств вскармливание реб из гр риска
- по разв аллерг заб назначают - гипоаллергенные смеси.
1004. Избыточная масса – 85-95 центель.
1005. Для гастроинтестин формы аллергии к белкам кор молока не характ – задержка физ разв.
1006. Синдром Жильбера – в школьном возрасте.
1007. При синдроме раздр кишечника не применяют – стимулир слабительные
1008. У ребенка 11 мес на искусств вскармл выявлен избыток массы. Ребенку рекоменд – консультация эндокринолога.
1009. Симптомами стадии продромы НЭК являются все, кроме: прибавка в массе 40 г/сут.
1010. Основное патогенетическое средство терапии нефротич формы ГН – преднизолон.
1011. Основной клинический признак нефротического синдрома – отеки.
1012. При подозрении на феномен гипертонии белого халата показано проведение – суточного мониторингирования АД.
1013. Синдром раздраженной кишки у детей диагностируется – по совокупности клинических симптомов.
1014. Сахарный диабет у матери влияет на инсул аппарат плода – активизирует клетки инс аппарата.
1015. Ребенку с сахарным диабетом 1 типа при гипогликемич коме не следует – вводить инсулин.
1016. У ребенка 3 лет впервые выявлен низкий рост (до 3 центиля) – тактика педиатра – направить к эндокринологу.
1017. Основной симптом хронического аллергического воспаления – заложенность носа.
1018. С помощью метода ФГДС возможно диагностировать – пептическую язву.
1019. Витамин Д – способствует всасыванию Са из ЖКТ.

1020. Повышение уровня непрямого билирубина характерно для – **наследственного сфероцитоза в период криза**.
1021. При кетоацидозе наиболее характерно – **ацетонурия**.
1022. При острой ревматической лихорадке не характерен – **лимфоцитоз**.
1023. Преднизолон часто применяется – **при ГН, нефротической форме**.
1024. При ревматоидном артрите не отмечается – **летучесть болей**.
1025. Гипербилирубинемия, обусловленная повышением преимущественно уровня непрямого билирубина у новорожденных, характерна для – **гемолитической болезни**.
1026. В развитии воспаления меньшее значение имеет – **ренин**.
1027. О синдроме холестаза может свидетельствовать – **щелочная фосфатаза**.
1028. Чаще всего при лимфогранулематозе поражаются – **периферические лимфоузлы**.
1029. Оценка нервно-психического развития ребенка 12 месяцев проводится по следующим линиям – **движения общие, понимаемая речь, активная речь, действия с предметами, навыки**.
1030. Гистологические данные, позволяющие дифференцировать болезнь Крона от язвенного колита – **саркоидные гранулемы в подслизистом слое**.
1031. Для начала ГН наиболее характерно – **олигоурия**.
1032. Не информативно для диагностики цирроза печени – **эзофагогастродуоденоскопия**.
1033. При обнаружении лимфаденопатии – **показана биопсия лимфоузла**.
1034. Девочке 10 лет. Ожирение II степени без признаков гиперкортицизма. Невролог патологии не выявил. Родители с избыточной массой. Ваш диагноз – **конституционально – экзогенное ожирение**.
1035. Абдоминальные боли при забрюшинной опухоли – **в любых отделах брюшной полости**.
1036. Для панкреатита не характерны – **изжога**.
1037. Наиболее частой причиной пиелонефрита является – **ПМР**.
1038. Ребенок 2 месяцев: эмоциональная реакция – в ответ на общение быстро отвечает улыбкой; движения общие – длительно. Нервно-психическое развитие – **опережение**.
1039. Ребенок с пароксизмальной тахикардией может заниматься в школе физкультурой в общей группе – **через 5 лет после приступа**.
1040. При циррозе печени предпочтительнее употреблять пищу – **низкобелковую**.
1041. При функциональной диспепсии не характерна – **кровь в кале (диарея)**.
1042. Рентгенологические признаки обструкции тонкой кишки – **отсутствие газов в толстой кишке**.
1043. Наиболее информативно при хроническом гепатите – **морфологическое исследование гепатобиоптатов**.
1044. Золотой стандарт диагностики инфекций мочевыводящих путей – **бактериологическое исследование мочи**.
1045. Для заболеваний гастроинтестинальной зоны характерны все диспептические расстройства, кроме – **чередование поносов и запоров**.
1046. Для диагностики целиакии обязательно – **исследование антител к трансглутаминазе**.
1047. Оценка толерантности к физической нагрузке у ребенка 1 года жизни проводится – **по прерывистому (с отдыхом) сосанию**.
1048. У детей наиболее распространен хронический гепатит – **вирусный гепатит**.
1049. У детей с острой ревматической лихорадкой нередко наблюдается – **ортоградная неполная АВ-блокада I степени**.
1050. У ребенка 12 месяцев нервно-психическое развитие: – **назначение рекомендаций дифференцированно, в соответствии с уровнем развития по каждому показателю**.
1051. Для подтверждения диагноза функциональной диспепсии у детей желательно выполнить – **манометрию желудка**.
1052. При лечении алиментарного ожирения не используется – **метформин**.
1053. К клиническим формам внутриутробной бактериальной инфекции не относится – **миокардит**.
1054. При функциональном запоре питание должно быть – **с большим количеством клетчатки**.

1055. При синдроме раздраженной кишки с запором рекомендуется питание – **щадящее, пищевые волокна по переносимости.**
1056. Больному с эзофагитом назначают – **ИПП.**
1057. Ребенка, прибывшего без сведений о прививках против полиомиелита, следует – **трехкратно привить.**
1058. Дети, перенесшие гломерулонефрит, наблюдаются – **до перевода во взрослую поликлинику.**
1059. Экстренная эзофагогастродуоденоскопия показана для – **определения источника кровотечения.**
1060. При экстренном обследовании больных с толстокишечным кровотечением могут быть использованы все перечисленные методы, кроме – **ректороманоскопии.**
1061. При хроническом гепатите наиболее типичная жалоба – **астения.**
1062. Для внутрисосудистого гемолиза характерно – **гемоглобинурия.**
1063. Началу заболевания лимфогранулематозом соответствует гистологический вариант – **лимфоидное набухание.**
1064. Детям с хроническими заболеваниями печени рекомендуется питание – **с ограничением белков.**
1065. Эндоскопическая картина шигеллеза похожа – **на язвенный колит.**
1066. Золотой стандарт диагностики хеликобактериоза – **гистологическое обнаружение НР в 5 желудочных биоптатах.**
1067. Лечение легкой гипергликемии и др. – **глюкозы перорально.**
1068. Детей с сахарным диабетом 1 типа вакцинируют – **при достижении компенсации показателей углеводного обмена.**
1069. Наиболее правильный метод необходимого объема питания – **калорийный метод.**
1070. Критерии системного дебюта ревматоидного артрита исключают только – **абдоминального синдрома.**
1071. Для диабетической фетопатии не характерно – **длительная желтуха.**
1072. Пульс-терапия метипредом проводится у детей – **с аутоиммунными заболеваниями высокой активности.**
1073. Максимальное значение артериального давления обуславливает – **катехоламиновый криз на фоне феохромоцитомы.**
1074. При болезни Крона эксклюзивное энтеральное питание – **позволяет достигнуть ремиссии, сопоставимой со стероидами.**
1075. У здорового ребенка любого возраста зубец Т в отведениях I, aVL, V5, V6 всегда должен быть – **положительный.**
1076. К особенностям диеты при сольтеряющей форме адреногенитального синдрома у детей раннего возраста относится – **дополнительное введение поваренной соли.**
1077. Для диагностики жизнеугрожающих причин синкопе у ребенка наиболее информативен метод – **суточного мониторингирования ЭКГ по Холтеру.**
1078. Ведущим клиническим синдромом при врожденных пороках сердца с дуктус-зависимым легочным кровообращением (например – атрезия легочной артерии) является – **артериальная гипоксемия.**
1079. Причиной внутрипеченочного холестаза не является – **желчнокаменная болезнь.**
1080. При рождении ребенка с дуктус – зависимым ВПС следует в родовом зале начать: - **инфузию вазопростана.**
1081. Критерии полного контроля бронхиальной астмы не включают: - **использование короткодействующего бета – 2 агониста не более 2 раз в неделю.**
1082. Препаратом выбора для плановой заместительной терапии при хронической надпочечниковой недостаточности (при врожденной дисфункции коры надпочечников) у детей является: - **гидрокортизон.**
1083. Наличие крови в кале у ребенка до 1 года характерно: **для аллергического энтероколита.**
1084. При развитии гипогликемической комы у пациента с сахарным диабетом 1 типа для внутривенного введения нужно использовать: - **20% раствор глюкозы.**
1085. Вирусный миокардит подтверждает: - **значительное увеличение уровня внутриклеточных ферментов в крови – КФК, ЛДГ.**
1086. Неотложную терапию проводят при варианте адреногенитального синдрома: - **с потерей солей.**
1087. Боли за грудиной связаны: - **с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс – эзофагите.**

1088. Мукорегулятором не является: - **пульмозин**.
1089. Расчет суточного объема пищи для новорожденного: - **калорийный метод**.
1090. Парапроктиты характерны: - **для болезни Крона**.
1091. Антигипертензионные препараты, не разрешенные в педиатрической практике: - **препараты центрального действия**.
1092. Для вирусной формы дефицита 21 – гидроксилазы (ВДКН) не характерно: - **рвота**.
1093. Синдром неправильного пубертата это – **нарушенная последовательность в появлении признаков полового созревания**.
1094. Главное преимущество комбинации ингаляционного ГКС и бета – 2 агониста длительного действия: - **более быстрый бронхорасширяющий и пролонгированный противовоспалительный эффекты, предотвращающие ремоделирование стенки бронхов**.
1095. К типичным рентгенологическим изменениям при бронхиальной астме в приступный период не относятся: - **увеличение лимфоузлов средостения**.
1096. Для смешанной формы гломерулонефрита наиболее характерна: - **гематурия с протеинурией**.
1097. При остром лейкозе не характерно: - **увеличение зрелых сегментоядерных нейтрофилов**.
1098. Задержка роста не характерна для: - **энтеробиоза**.
1099. Для хронического вирусного гепатита наиболее характерно – **повышение трансаминаз в 1,5 – 3 раза по сравнению с нормой. Нормальные значения трансаминаз**
1100. Суточная потребность в белке у детей после введения прикорма при смешанном вскармливании составляет – **3 (или 2,5 г/кг.)**
1101. Расчет суточного объема пищи для новорожденного при массе тела при рождении 3000 по формуле Тура – **70 мл умножить число дней, при массе менее 3200**.
1102. Ребенку с предварительным диагнозом «острая ревматическая лихорадка» целесообразно назначить дома до госпитализации – **аспирин + супрастин**.
1103. Для оценки функционального класса сердечной недостаточности у детей применяется – **тест 6-минутной ходьбы**.
1104. второй функциональный класс сердечной недостаточности у ребенка 3 месяцев характеризуется – **нарушением переносимости значительной физической нагрузки (сосание)**.
1105. При появлении пигментации кожи у ребенка а первую очередь следует исключить патологию – **надпочечников**
1106. Клиническую картину при внутриутробных инфекциях в большей степени определяет – **токсичность возбудителя (сроки внутриутробного поражения)**
1107. Амилоидоз обычно не осложняет – **болезнь Шенлейна-Геноха**.
1108. Расчет суточного объема пищи для новорожденных – **калорийный метод**.
1109. Для гипопаратиреоза характерно – **гипокальциемия и гиперфосфатемия**.
1110. Аномальное отхождение одной из коронарных артерий от легочной артерии проявляется – **клиникой ишемии/инфаркта миокарда**.
1111. Для солтеряющей формы дефицита 21-гидроксилазы (ВДКН) не характерно – **позднее отхождения мекония, (гипокалиемия)**
1112. индекс массы тела – **масса/рост в квадрате**.
1113. низкорослость – **ниже 3 перцентили**
1114. О задержке полового развития у девочек свидетельствует отсутствие менструаций в возрасте – **15 лет**
1115. для поражения суставов при ювенильном ревматоидном артрите **характерна – отечность с воспалительной деструкцией костной ткани**.
1116. объем мочевого пузыря у новорожденного ребенка к концу раннего неонатального периода – **30-50 мл**
1117. при ювенильном спондилоартрите не отмечается – **летучесть болей**
1118. типичная локализация болезни Крона – **илеоцекальный угол**.
1119. показанием к парентеральному питанию является – **анорексия**.

1120. системная склеродермия включает все симптомы, кроме – **геморрагической сыпи**
1121. начальная доза инсулина при лечении диабетического кетоацидоза – **0,1ед/кг в час.**
1122. к группе биологических агентов не относится – **циклоспорин А.**
1123. при аллергическом рините обосновано назначение – **кортикостероидов.**
1124. суточное мониторирование артериального давления позволяет – **установить суточный профиль артериального давления и нагрузку гипертонией в течение суток.**
1125. наиболее ранним проявлением диабетической нефропатии является – **микроальбуминурия.**
1126. физиологическая потребность в йоде у детей от 7 до 12 лет – **120 мкг/сутки.**
1127. для лечения больного с бронхообструктивным синдромом противопоказаны – **бета-адреноблокаторы.**
1128. у доношенного новорожденного ребенка нормальным считается уровень артериального давления – **70/35 мм рт. Ст.**
1129. при хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) наблюдается – **гиперпигментация кожи.**
1130. для новорожденных от матерей с сахарным диабетом не характерна – **гиперкальциемия.**
1131. «Золотым стандартом» диагностики остеопороза является – **остеоденситометрия.**
1132. Метотрексат является препаратом выбора у детей с ювенильным ревматоидным артритом из-за – **точки приложения терапевтического эффекта – костной ткани.**
1133. при гранулематозе Вегенера редко наблюдается – **поражение центральной нервной системы.**
1134. при закрытии овального окна внутриутробно – **происходит гибель плода.**
1135. метод контрацепции, рекомендованный для девочек-подростков – **это – механический (барьерный) метод + оральные контрацептивы.**
1136. диагноз «ювенильный хронический артрит» выставляется при условии – **наличия синовита в течение 6 недель.**
1137. причиной врожденного гипотиреоза не является – **аутоиммунный тиреоидит.**
1138. при лечении диффузного токсического зоба у детей не используют – **препараты йода.**
1139. в рационе питания детей с сахарным диабетом в возрасте 7 лет процент белка должен составлять – **20%.**
1140. о преждевременном половом созревании у мальчиков свидетельствует появление вторичных половых признаков – **до 10 лет.**
1141. электрокардиограмма отражает все функции сердца, кроме – **диастолического расслабления.**
1142. при фенилкетонурии из питания детей первого года жизни не исключают – **сливочное масло.**
1143. развитие пилоростеноза у детей старшего возраста возможно – **при рецидивирующих язвах привратника.**
1144. в линиумдиагностике вирусного миокардита наиболее информативен и безопасен метод – **MPT сердца с контрастированием гадолинием**
1145. для лечения ребенка с легкой бронхиальной астмой в межприступном периоде основным методом является – **аллерген-специфическая терапия.**
1146. клиника болезни Кавасаки не включает – **АВ-блокаду I степени.**
1147. какой симптом не характерен для гипопаратиреоза – **симптом Грефе.**
1148. избыток веса при ожирении 1 степени у детей (по классификации Ю.А.Князева) составляет – **10 -29%.**
1149. к типичным симптомам сахарного диабета не относится – **полифекалия.**
1150. в лечении ребенка с тяжелой сердечной недостаточностью не используется – **индометацин.**
1151. для проведения стандартного орального глюкозо-толерантного теста используют глюкозу из расчета – **1,75 г/кг.**
1152. лечение тяжелой гипогликемии у пациента с сахарным диабетом 1 типа начинают с введения – **глюкагона внутримышечно.**
1153. к пограничным состояниям новорожденных не относят – **кишечное кровотечение.**
1154. препарат первого выбора в ряду базисных средств для лечения ребенка с ювенильным ревматоидным артритом – **метотрексат.**

1155. неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз у доношенных детей предполагает оценку уровня ТТГ – на 3-4 сутки.
1156. к клиническим симптомам первичной хронической надпочечниковой недостаточности не относится – остеопения.
1157. диабетическая фетопатия – это – клинико-метаболический симптомокомплекс у новорожденных, от матерей с сахарным диабетом.
1158. для уточнения диагноза острого панкреатита необходимо получить данные – уровне амилазы и липазы в сыворотке крови.
1159. пищевым продуктом, обладающим выраженным либераторным эффектом, считают – цитрусовые.
1160. суточный объем пищи для детей от 4 до 6 месяцев – $1/7$ массы тела.
1161. физиологическая потребность в йоде у беременных женщин – 250 мкг/сутки.
1162. продукты, не рекомендуемые при пищевой аллергии – молоко
1163. кардиомегалию при миокардите не отражает – мягкий систолический шум на основании сердца
1164. диагноз функциональной диспепсии у детей устанавливается на основании – клинических критериев.
1165. при системной красной волчанке в периферической крови не бывает – полицитемии.
1166. астматический статус II-III степени требует немедленного применения – кортикостероидов.
1167. для дифференциальной диагностики гипертензии при коарктации аорты наиболее информативным является – артериальное давление на ногах ниже, чем на руках.
1168. для купирования тахикардии при вирусном миокардите следует назначить – дигоксин.
1169. синдром слабости синусового узла не следует исключать у ребенка – с адекватным приростом частоты сердечных сокращений на нагрузку.
1170. у здорового ребенка через 2 часа после приема пищи уровень глюкозы в капиллярной крови должен быть – меньше или равен 7,8 ммоль/л.
1171. при мембранозном дефекте межжелудочковой перегородки максимум шума определяется – в 3-4 межреберье слева от грудины (слева от грудины).
1172. поражение сосудистого тракта глаз (увеит) характерно – для ювенильного ревматоидного артрита.
1173. для ребенка с открытым артериальным протоком не характерно – развитие тяжелой сердечной недостаточности.
1174. пропранолол используют для купирования тахикардии – у детей с обструктивными пороками сердца (стенозы крупных сосудов).
1175. для клиники галактоземии не характерно – почечная недостаточность
1176. пульсация сосудов шеи – чаще свидетельство – повышения давления в правых отделах сердца при перикардите.
1177. физическое развитие ребенка считается высоким, если рост выше – 97 перценталя.
1178. при легкой гипогликемии у пациента с сахарным диабетом 1 типа начинают с введения – глюкозы перорально
1179. первый «перекрест крови» у недоношенных детей происходит – после 7-10 дня жизни.
1180. контроль артериального давления необходим больному, получающему – преднизолон.
1181. при дисахаридазной недостаточности характер стула – водянистый, кислый, пенистый.
1182. критерии острого миокардита не включают – повышение артериального давления.
1183. для гемофилии А наиболее характерно кровоизлияние – в суставы.
1184. коэффициент пропорциональности – это – соотношение верхнего сегмента тела и нижнего сегмента тела.
1185. 1 степень увеличения щитовидной железы по классификации ВОЗ – это – зоб не виден, но пальпируется при этой размеры его долей больше дистальной фаланги большого пальца руки обследуемого.
1186. в каких случаях синдром обезвоживания может сопровождаться шоком – при быстром развитии обезвоживания.
1187. предуктальная коарктация аорты опасна развитием – гипоперфузии внутренних органов с развитием полиорганной недостаточности.

1188. для назначения генно-инженерных базисных препаратов необходимо – **исключить инфицирование туберкулезом.**
1189. препараты выбора при среднетяжелой форме бронхиальной астмы: **комбинация ингаляционных кортикостероидов и длительно действующих бронхолитиков.**
1190. продолжительность диспансерного наблюдения за детьми с язвенной болезнью желудка и ДПК составляет – **до перевода во взрослую сеть.**
1191. самой частой причиной вторичной легочной артериальной гипертензии у детей является – **врожденные пороки сердца с обогащением малого круга, не коррегированные вовремя.**
1192. олигоурия не встречается при – **сахарном диабете.**
1193. основное лечение фенилкетонурии – **диета.**
1194. снижение зубца Т на ЭКГ не вызывает – **гиперкалиемию.**
1195. высокий риск неблагоприятного исхода характерен для – **желудочковой пароксизмальной тахикардии.**
1196. при гемофилии наиболее информативно – **определение плазменных факторов свертывания.**
1197. долгосрочный эффект каптоприла – это – **подавление негативного влияния ренин-ангиотензиновой системы.**
1198. для болезни Грейвса не характерно – **сухость кожи (запоры).**
1199. для остеопороза у детей не характерно – **деформации трубчатых костей**
1200. лечение острой ревматической лихорадки с поражением сердца предполагает – **профилактику рецидива бициллином-5 (1 раз в месяц).**
1201. ожирение у детей диагностируется если индекс массы тела (ИМТ) соответствует – **выше 95 центеля.**
1202. для ребенка школьного возраста в приступный период атопической бронхиальной астмы не характерно – **наличие воспалительных очаговых изменений.**
1203. причиной дефицита инсулина при сахарном диабете 1 типа является – **деструкция бета клеток поджелудочной железы**
1204. о наличии рефлюкса из 12-перстной кишки в желудок свидетельствует – **тошнота.**
1205. главное преимущество комбинации ингаляционного глюкокортикостероида и бета-2 агониста длительного действия - **более быстрый бронхорасширяющий и пролонгированный противовоспалительный эффекты предотвращают ремоделирование стенки бронхов.**
1206. профилактика йодного дефицита препаратами йодида калия у детей должна проводиться – **постоянно.**
1207. при интеркуррентных заболеваниях с лихорадкой у детей с адреногенитальным синдромом суточную дозу пероральных глюкокортикостероидов – **увеличивают в 2-3 раза**
1208. при дерматомиозите прогноз больного определяет – **поражение мышечной ткани органов желудочно-кишечного тракта.**
1209. ребенку с предварительным диагнозом «острая ревматическая лихорадка» целесообразно назначить дома до госпитализации – **аспирин+супрастин.**
1210. ребенку с артериальной гипертензией показана консультация – **офтальмолога.**
1211. профилактика инфекционного эндокардита у детей с корригированными пороками сердца не включает – **постоянную антибактериальную терапию.**
1212. о наличии цитолиза гепатоцитов не свидетельствует – **непрямая гипербилирубинемия.**
1213. количество Т-лимфоцитов в периферической крови в норме колеблется в пределах – **60-80% общего числа лимфоцитов.**
1214. врожденный порок сердца, лишний в группе с дуктус-зависимыми пороками – **двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка.**
1215. телархе – это – **увеличение молочных желез у девочек.**
1216. физическая нагрузка субмаксимальной мощности предполагает прирост пульса в пределах – **70-80% от исходного.**
1217. у недоношенных детей с массой тела менее 1500 г в первые три недели жизни наиболее часто встречается – **витамин Е-дефицитная анемия. (функциональная недостаточность костного мозга)**
1218. кормление недоношенного ребенка через соску возможно – **32 недели гестации.**

1219. этиология реактивного артрита включает – **кишечные инфекции и атипичные инфекции (мочеполового тракта).**
1220. для диабетического кетоацидоза не характерно – **гипертермия..**
1221. хроническая сердечная недостаточность у детей вызывает все, кроме – **миопатического синдрома.**
1222. физиологическая потребность в йоде у детей от 0 до 6 лет – **90 мкг/сут.**
1223. нестероидный противовоспалительный препарат с селективной ингибцией ЦОГ-2 и минимумом нежелательных побочных действий – **мелоксикам.**
1224. объем тестикул, свидетельствующий о начале физиологического пубертата у мальчиков – **4 мл.**
1225. неотложная помощь ребенку с одышно-цианотическим приступом не включает – **дигоксин.**
1226. здорового новорожденного ребенка можно начинать купать – **через 7 дней после рождения.**
1227. при гипертрофической кардиомиопатии высок риск – **внезапной смерти**
1228. к клиническим проявлениям диабетического кетоацидоза не относится – **влажность кожных покровов.**
1229. неотложная помощь ребенку с суправентрикулярной пароксизмальной тахикардией начинается с введения – **мезатона 1% 0,1-0,5 мл, затем верапамила 1 мг/кг.**
1230. геморрагический васкулит не включает – **менингоэнцефалит.**
1232. перед назначением плавания грудному ребенку необязательным исследованием является – **рентгенография грудной клетки.**
1233. тип аллергической реакции наиболее характерный для пищевой аллергии – **1 тип – реактивный.**
1234. верхняя граница нормы систолического давления в легочной артерии – **30 мм.рт.ст.**
1235. синдром Эйзенменгера – **это – равновесие давления между левыми и правыми отделами сердца при развитии легочной гипертензии на фоне септальных дефектов.**
1236. у здоровых детей интервал QT не должен превышать – **440 мсек.**
1237. при тетраде Фалло тяжесть состояния определяет – **степень стеноза легочной артерии**
1238. синдром бронхиальной астмы с эозинофилией наблюдается – **при васкулите Чарга-Стросса.**
1239. при фиброэластозе отмечается – **диффузный фиброз миокарда левого желудочка с нарушением диастолы и систолы**
1240. подтверждением диагноза «ортостатическая гипотония» является – **разница значений систолического артериального давления в положении лежа и стоя 20 мм.рт.ст. и более.**
1241. у ребенка 10 лет мигрирующий артрит крупных суставов, температура 38 С, приглушенность тонов сердца после перенесенного тонзиллита предполагает – **острую ревматическую лихорадку.**
1242. низкорослость не характерна для – **синдрома Клайнфелтера.**
1243. для первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна) не характерно – **повышение сахара в крови.**
1244. для гипогликемии при сахарном диабете 1 типа не характерно – **запах ацетона.**
1245. брадикардия – **это – урежение частоты сердечных сокращений на 25% от должного по возрасту значения.**
1246. при функциональных запорах у детей раннего возраста не показано – **проведение клизмы**
1247. для детского возраста характерны – **лимфобластный лейкоз.**
1248. синдром удлиненного интервала QT не следует исключать у – **ребенка с дефектом межжелудочковой перегородки.**
1249. одышно-цианотический криз характеризуется – **развитием одышки, головокружения, цианоза вследствие спазма легочной артерии при нагрузках.**
1250. симптом «накрахмаленных пеленок» у новорожденных характерен для – **неонатального сахарного диабета.**
1251. о преждевременном половом созревании у девочек свидетельствует появления вторичных половых признаков – **до 8 лет**
1252. наиболее информативным исследованием для диагностики опухолей сердца является – **эхокардиография**
1253. при хроническом заболевании показателем компенсации функционального состояния организма нельзя

считать – уровень физического развития

1254. для аутовоспалительных заболеваний у детей характерно все, кроме – поражения сердца

1255. дилатационную кардиомиопатию характеризует – увеличение полости и снижение сократимости левого желудочка

1265. округлые инфильтраты в легких заставляют исключать – новообразования

1266. оперативное лечение крипторхизма проводят – в возрасте 1,5 – 2 года.

1267. для фенилкетонурии не характерно – запах ацетона

1268. для лечения детей с легочной гипертензией не используют – анаприлин

1269. для дифференциальной диагностики ревматоидного и туберкулезного поражения коленного сустава из неинвазивных признаков информативен – секвестр эпифиз одной из берцовых костей

1270. к клиническим признакам дефицита железа относится – дистрофические изменения кожи, волос, ногтей, зубов.

1271. гипертрофическая кардиомиопатия проявляется – локальным или тотальным утолщением стенок левого желудочка с нарушением диастолы.

1272. высокая вероятность развития бактериального шока типично – для двусторонней пневмококковой пневмонии.

1273. гипоплазия левого желудочка – это – врожденное уменьшение камеры с невозможностью обеспечить большой круг (летальный порок)

1274. назначение нестероидных противовоспалительных препаратов у детей с суставным синдромом направлено на достижение – купирования боли и уменьшения боли

1275. систоло-диастолический шум не определяется при – дефекте межжелудочковой перегородки

1276. физиологический пубертат у девочек начинается – увеличения молочных желез

1277. окончательное созревание функциональных систем идет наиболее активно – в постнатальном периоде

1278. при митральном стенозе не характерно – удовлетворительная адаптация к нагрузкам.

1279. для синдрома Жильбера характерно – непрямая гипербилирубинемия

1280. нормальная продолжительность менструального цикла составляет – 25-35 дней.

1281. гинекомастия – это – увеличение грудных желез у мальчиков.

1282. при отеке легких основой терапии является – диуретический препарат быстрого действия (петлевой).

1283. оценить сократительную способность миокарда позволяют все показатели, кроме – градиент давления на митральном клапане.

1284. критерии системной красной волчанки включают все, кроме – приобретенного порока сердца.

1285. при системной красной волчанке патогенетической терапией является – преднизолон.

1286. терапия тироксином при врожденном гипотиреозе продолжается – пожизненно.

1287. при дерматомиозите поражение мышц не включает – паразитарное поражение скелетной мускулатуры.

1288. самой частой группой врожденных пороков сердца является – группа с обогащением малого круга кровообращения

1289. ребенок госпитализирован на 2-й день от начала артрита. Температура 37,8, боль и припухлость сохраняется. Систолический шум на верхушке продолжительный, СОЭ – 45 мм/ час. В план лечения не входит назначение – левомицетина

1290. прогностически неблагоприятный симптом легочной артериальной гипертензии – обмороки как результат десатурации при физической нагрузке.

1291. лечение врожденного гипотиреоза левотироксином следует начинать – на первом месяце жизни

1292. гипергаммаглобулинемия характерна – для волчаночного нефрита

1293. входными воротами инфекции при сепсисе у недоношенных детей чаще всего является – кишечник.

1294. гипербилирубинемия, обусловленная ABO – конфликтом реже встречается – у недоношенного.

1295. повторные респираторные эпизоды не характерны для – тетрады Фалло.

1296. наименее информативно для диагностики цирроза печени – ФГДС

1297. наиболее информативно в отношении хронического гепатита – радионуклидное исследование печени в динамике.